

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Cilazil Plus 5 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete

cilazapril, hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, обратите se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

- 1. Što su Cilazil Plus tablete i za što se koriste**
- 2. Što morata znati prije nego počnete uzimati Cilazil Plus tablete**
- 3. Kako uzimati Cilazil Plus tablete**
- 4. Moguće nuspojave**
- 5. Kako čuvati Cilazil Plus tablete**
- 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

1. Što su Cilazil Plus tablete i za što se koriste

Cilazil Plus tablete sastoje se od dvije djelatne tvari, cilazaprila i hidroklorotiazida.

Cilazapril pripada grupi lijekova poznatih kao ACE-inhibitori.

Hidroklorotiazid pripada grupi lijekova poznatih kao tiazidski diuretici.

Cilazapril i hidroklorotiazid koriste se za liječenje povišenog krvnog tlaka. Kada se ova dva lijeka koriste u kombinaciji, učinkovitiji su nego kad se koriste pojedinačno.

Cilazapril inhibira (blokira) kemijske spojeve koji se nalaze u organizmu i koji su odgovorni za povećanje krvnog tlaka. Takva inhibicija dovodi do sniženja tlaka. Kada se cilazapril daje zajedno s diuretikom (lijekovi za mokrenje) učinak je veći, odnosno krvni tlak se još više smanji.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Cilazil Plus tablete

Nemojte uzimati Cilazil Plus tablete:

- ako ste alergični na cilazapril, hidroklorotiazid, lijekove koji spadaju u skupinu ACE-inhibitora ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste trudni ili dojite
- ako ste imali angioedem (oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla), koji se javio kao posljedica uzimanja ACE inhibitora
- ako imate poteškoća s mokrenjem – premalo mokrite (anurija)
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Ako niste sigurni trebate li uzimati Cilazil Plus, savjetujte se s Vašim liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Cilazil Plus tablete :

- ako ste trudni ili namjeravate zatrudnjeti (trudnice ne bi smjele uzimati ovaj lijek).
- ako dojite ili namjeravate dojiti (dojilje ne bi smjele uzimati ovaj lijek).
- ako idete na hemodijalizu.
- ako uzimate preparate koji sadrže kalij.
- ako idete na operacijski zahvat.
- ako imate drugih zdravstvenih problema kao što su:
 - bolesti jetre
 - bolesti bubrega
 - srčane bolesti
 - bolesti krvnih žila
 - šećerna bolest (dijabetes)
 - giht (ulozi)
 - bolest pod nazivom porfirija.
- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:

- blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
- aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Cilazil Plus tablete“

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili u nešto niste sigurni, javite se svom liječniku.

Djeca i adolescenti

Sigurnost primjene i učinkovitost kod djece još nisu utvrđene, stoga se Cilazil Plus tablete ne preporučuju primjenjivati kod djece.

Drugi lijekovi i Cilazil Plus tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove..

Cilazil Plus tablete mogu stupiti u interakcije (međudjelovanje) sa sljedećim lijekovima:

- Nesteroidni protuupalni lijekovi – lijekovi koji se koriste u liječenju boli, temperature i upale (acetilsalicilatna kiselina, ibuprofen, diklofenak).
- Diuretici – lijekovi koji se koriste za mokrenje.
- Preparati koji sadrže kalij.
- Antidijabetici - lijekovi koji se koriste u liječenju dijabetesa.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima “Nemojte uzimati Cilazil Plus tablete“ i „Upozorenja i mjere opreza“).

Trudnoća i dojenje

- Tijekom trudnoće ne smijete koristiti Cilazil Plus tablete.
- Morate odmah obavijestiti Vašeg liječnika ako planirate trudnoću ili zatrudnite za vrijeme uzimanja Cilazil Plus tableta, .

Upravljanje vozilima i strojevima

Cilazil Plus tablete mogu uzrokovati smanjenu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Cilazil Plus tablete sadrže laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Cilazil Plus tablete

Doza Cilazil Plus je jedna tableta jedanput na dan. S obzirom na to da uzimanje hrane ne utječe na apsorpciju, Cilazil Plus tablete mogu se uzimati prije ili nakon jela. Lijek treba uzimati u vijek u isto doba dana.

Ne prekidajte liječenje Cilazil Plus tabletama sve dok Vam to ne kaže Vaš liječnik.

Ako uzmete više Cilazil Plus tableta nego što ste trebali

Ako greškom uzmete preveliku dozu Cilazil Plus tableta, odmah obavijestite liječnika ili se javite u najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti Cilazil Plus tablete

Ako ste zaboravili uzeti dozu Cilazil Plus tableta, možete je uzeti kasnije istog dana. Ako se sjetite propuštene doze sljedeći dan, ne uzimajte je. Dvije doze se ne smiju uzimati isti dan.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne i zahtijevati hitnu liječničku pomoć

Odmah se obratite liječniku ako osjetite neki od sljedećih simptoma:

- Oticanje lica, usana, jezika, grla.
- Stalna bol u želucu.
- Simptomi zatajenja bubrega: nemogućnost mokrenja ili jako smanjeno mokrenje, pospanost, mučnina, povraćanje, otežano disanje.

- Bol u prsima, ubrzan rad ili lupanje srca.
- Otežano disanje ili jaki kašalj.

Ozbiljne nuspojave javljaju se rijetko.

Obavijestite svojeg liječnika ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

- Glavobolja
- Omaglica
- Lupanje srca
- Umor
- Kašalj
- Slabija probava
- Kožni mjehuri ili osip na koži
- Žutica (žutilo kože)
- Anoreksija
- Pojačana osjetljivost na svijetlo
- Upala gušterače
- Smanjeni broj bijelih krvnih stanica (leukocita) i krvnih pločica (trombocita)
- Slabokrvnost (anemija)
- Povećane razine jetrenih enzima
- Upala pluća i plućni edem (nakupljanje tekućine u plućima).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljinjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Cilazil Plus tablete

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati pri temperaturi do 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cilazil Plus tablete sadrže

- Jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg cilazaprila u obliku cilazaprilhidrata i 12,5 mg hidroklorotiazida.
- *Pomoćne tvari:* laktosa hidrat; kukuruzni škrob; krospovidon; talk; natrijev stearilfumarat; djelomično hidroliziran poli(vinilni alkohol); makrogol 3350, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid, (E172); crveni željezov oksid, (E172)

Kako Cilazil Plus tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Cilazil Plus 5 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete dostupne su u pakovanu od 30 filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač



PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2015.