

UPUTA O LIJEKU

Klavocin bid 1 g tablete

amoksicilin trihidrat, klavulanska kiselina

Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu.

Uputu sačuvajte jer će te ju vjerojatno željeti ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne informacije o lijeku **Klavocin bid 1 g tablete**. Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više, obratite se liječniku ili ljekarniku. Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugim osobama. Može im naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši. Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

SADRŽAJ UPUTE:

- 1. Što su Klavocin bid tablete i za što se koriste**
- 2. Prije nego počnete uzimati Klavocin bid tablete**
- 3. Kako uzimati Klavocin bid tablete**
- 4. Moguće nuspojave**
- 5. Kako čuvati Klavocin bid tablete**
- 6. Dodatne informacije**

1. ŠTO SU KLAVOCIN BID TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE

Klavocin bid tablete spadaju u skupinu antibiotika koji se nazivaju penicilinima. Antibiotici se koriste za uništavanje bakterija, koje uzrokuju infekcije.

Klavocin bid tablete se koriste u liječenju slijedećih bakterijskih infekcija:

- upala sinusa, ponovljene upale krajnika, upala srednja uha;
- infekcije donjih dišnih putova (akutno pogoršanje kroničnog bronhitisa, upala pluća);
- infekcije mokraćnih i spolnih organa te trbuha (upala mjehura, septički abortus, sepsa u maloj zdjelici i trbuhu te postporođajna sepsa);
- infekcije kože i mekih tkiva (celulitis, ugrizi životinja, teške infekcija zuba i desni);
- miješanih infekcija.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI KLAVOCIN BID TABLETE

Nemojte uzimati Klavocin bid tablete:

- ako ste ikada imali alergijsku reakciju na Klavocin bid tablete ili neki drugi antibiotik (penicilinski antibiotici, cefalosporini)
- ako ste osjetljivi ili alergični na bilo koji sastojak lijeka (vidjeti točku 6. Dodatne informacije)
- ako ste ranije imali žuticu ili poremećaj jetrene funkcije uzrokovan kombinacijom amoksicilina i klavulanske kiseline ili penicilinima.

Budite oprezni s Klavocin bid tabletama:

- ako se liječite radi problema s jetrom ili bubrezima
- ako bolujete od infektivne mononukleoze
- ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni
- ako dojite.

Uzimanje drugih lijekova s Klavocin bid tabletama

Molimo kažete liječniku ako uzimate neki od navedenih lijekova:

- lijekove protiv zgrušavanja krvi
- oralne kontraceptive („pilule“)
- alopurinol ili probenecid (lijekove za liječenje gihta)
- metotreksat (lijek za liječenje karcinoma ili reumatoidnog artritisa)

Molimo kažete liječniku ili ljekarniku ako uzimate, ili ste nedavno uzimali, bilo koji drugi lijek, uključujući one nabavljene bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Ako ste trudni ili ako mislite da biste mogli biti trudni ili ako dojite, prije uzimanja Klavocin bid tableta savjetujte se sa svojim liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Klavocin bid tablete ne utječu na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. KAKO UZIMATI KLAVOCIN BID TABLETE

Liječnik će Vam reći kako uzimati lijek. Ukoliko u nešto niste sigurni, provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Klavocin bid tablete namijenjene su odraslima i djeci starijoj od 12 godina.

Uobičajena doza je jedna Klavocin bid tableta dva puta na dan.

Najbolji se rezultati postižu ako tabletu uzmete neposredno prije obroka. Pokušajte rasporediti doze ravnomjerno tijekom dana, otprilike svakih 12 sati. Tablet u progutajte cijelu, a nemojte ju žvakati. Ako je potrebno, tablete se mogu prepoloviti i progutati bez žvakanja.

Važno je da uzmete cijelu količinu Klavocin bid tableta koju Vam je liječnik propisao. Nemojte ih prestati uzimati čak i ako se osjećate bolje, jer lijek možda još nije uništio sve bakterije i stanje Vam se može ponovno pogoršati.

Ako se ne osjećate dobro i nakon što ste popili cijelu količinu lijeka, obratite se liječniku. Ne smijete uzimati ovaj lijek dulje od 14 dana bez ponovnog liječničkog pregleda.

Ako ste zaboravili uzeti Klavocin bid tablete

Ukoliko zaboravite uzeti lijek na vrijeme, uzmite ga što je prije moguće, a zatim ga nastavite uzimati po uobičajenom rasporedu uzimanja (u razmacima od 12 sati). Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili onu dozu, koju ste zaboravili popiti. Nikada nemojte uzeti dvije doze u razmaku kraćem od 4 sata.

Ako uzmete više Klavocin tableta nego što ste trebali

Ukoliko slučajno uzmete više Klavocin bid tableta od onoga što Vam je liječnik preporučio, odmah se obratite svom liječniku ili otidite u najbližu hitnu službu. Ponesite sa sobom ambalažu lijeka i sav preostali lijek.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Klavocin bid tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi Klavocin bid tablete mogu izazvati nuspojave.

Ako primijetite osip ili svrbež ubrzo nakon uzimanja Klavocin bid tableta, obustavite uzimanje lijeka i ODMAH se javite liječniku.

Kao i pri primjeni sličnih antibiotika, vrlo rijetko su prijavljeni slučajevi oticanja lica, ustiju i jezika te otežanog disanja. Takve reakcije zahtijevaju hitno liječenje. Stoga osjetite li probleme s disanjem ili počnete li oticati ubrzo nakon uzimanja Klavocin bid tableta, obustavite uzimanje lijeka i ODMAH se javite liječniku.

Odmah se javite liječniku i ako:

- dobijete jaki proljev praćen krvarenjem
- primijetite da Vam je stolica svjetlija, a urin tamniji
- primijetite da Vam koža i bjeloočnice postaju žućkaste.

Prijavljene nuspojave i njihova približna učestalost navedene su niže:

Vrlo česte (javljaju se u više od jedne na 10 osoba)

- Proljev

Česte (javljaju se u manje od jedne na 10, no u više od jedne na 100 osoba)

- Gljivična infekcija kože i sluznice
- Mučnina, povraćanje

Manje česte (javljaju se u manje od jedne na 100, no u više od jedne na 1000 osoba)

- Vrtoglavica
- Glavobolja
- Žgaravica
- Umjereni porast enzima jetre
- Kožni osip, svrbež, koprivnjača (urtikarija)

Rijetke (javljaju se u manje od jedne na 1000, no u više od jedne na 10000 osoba)

- Upalne promjene kože (eritema multiforme)
- Smanjenje broja bijelih krvnih stanica (leukocita) i krvnih pločica (trombocita)

Vrlo rijetke (javljaju se u manje od jedne na 10000 osoba)

- Upala bubrega
- Stvaranje kristala u mokraći (tijekom liječenja trebate piti puno tekućine)
- Teške kožne reakcije
- Upala jetre (hepatitis), žutica
- Upala crijeva (kolitis)

- Tamna boja jezika i zubiju (promjena boje zubiju obično se povlači ubrzo nakon liječenja ako se zubi redovito peru)
- Konvulzije (iznenadna pojava grčeva mišića ruku, nogu ili cijelog tijela)
- Oticanje lica, ustiju ili jezika, otežano disanje, hripanje, uz kožni osip (reakcija preosjetljivosti)
- Smanjenje broja nekih krvnih stanica (agranulocitoza, hemolitička anemija); produljeno vrijeme krvarenja.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI KLAVOCIN BID TABLETE

KLAVOCIN BID TABLETE MORATE ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE.

Čuvati pri temperaturi do 25 °C, zaštićeno od vlage.

Klavocin bid tablete ne smijete upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što Klavocin bid 1 g tablete sadrže

Jedna Klavocin bid tableta sadrži 875 mg amoksicilina u obliku amoksicilin trihidrata i 125 mg klavulanske kiseline u obliku kalijevog klavulanata.

Pomoćne tvari: koloidni, bezvodni silicijev dioksid; krosповidon; umrežena karmelozanatrij; magnezijev stearat; mikrokristalična celuloza; hidroksipropilceluloza; etilceluloza; polisorbitat 80; trietilcitrat; titanijev dioksid (E171); talk.

Kako Klavocin bid 1 g tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

Klavocin bid tablete su bijele do skoro bijele, filmom obložene tablete s razdjelnom crtom i utisnutom znakom 875/125 s jedne strane i utisnutom oznakom AMC s druge strane.

Klavocin bid 1 g tablete dostupne su u pakovanju od: 10 (2 x 5), 14 (2 x 7) i 20 (4 x 5) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka



PLIVA HRVATSKA, d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Proizvođač lijeka



PLIVA HRVATSKA, d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Datum revizije upute

Travanj, 2012.