

## Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

### Rinolan 1 mg/ml sirup

loratadin

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

**Sadržaj ove upute:**

- 1. Što je Rinolan sirup i za što se koristi**
- 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rinolan sirup**
- 3. Kako uzimati Rinolan sirup**
- 4. Moguće nuspojave**
- 5. Kako čuvati Rinolan sirup**
- 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

#### **1. Što je Rinolan sirup i za što se koristi**

Rinolan je lijek iz skupine lijekova koji se zovu antihistaminici. Antihistaminici pomažu u ublažavanju simptoma alergije sprječavajući djelovanje histamina, tvari koja se stvara u organizmu.

Sirup ublažava simptome povezane s alergijskim rinitisom (primjerice peludne hunjavice) poput kihanja, curenja iz nosa ili svrbeža nosa te peckanja i nadraženosti očiju.

Sirup se može primjenjivati i za ublažavanje simptoma urtikarije (svrbeži i crvenila), koja je često poznata i pod nazivom koprivnjača.

#### **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rinolan sirup**

**Ne uzimajte Rinolan sirup ako ste:**

- alergični (preosjetljivi) na loratadin ili neki drugi sastojak lijeka
- trudni ili dojite.

Lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 2 godine.

#### **Budite posebno oprezni tijekom uzimanja Rinolan sirupa**

Prije nego što počnete uzimati sirup obavijestite liječnika ako imate bolest jetre.

#### **Drugi lijekovi i Rinolan sirup**

Ako uzimate neke druge lijekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez recepta, upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

#### **Laboratorijske pretrage**

Ako Vam je liječnik rekao da morate raditi alergijske kožne testove, Rinolan sirup ne smijete uzimati dva dana prije tih testova.

#### **Rinolan sirup s hranom i pićem**

Sirup možete uzimati uz obrok ili neovisno od obroka. Alkohol ne pojačava djelovanje Rinolan sirupa.

#### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Primjena loratadina se tijekom trudnoće ne preporučuje.

Loratadin se izlučuje u majčino mlijeko te se ne preporuča primjena lijeka tijekom dojenja.

### **Upravljanje vozilima i rad na strojevima**

Ako se uzima u preporučenoj dozi, sirup ne bi trebao uzrokovati pospanost ili smanjiti koncentraciju. Međutim, vrlo rijetko neki ljudi osjete pospanost što može utjecati na njihovu sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

### **Važne informacije o sastojcima sirupa**

Rinolan sirup sadrži saharozu. Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

### **3. Kako uzimati Rinolan sirup**

Rinolan sirup uzimajte prema uputama liječnika.

Niže je navedeno uobičajeno doziranje:

Dob	Količina primijenjenog lijeka
Odrasli i djeca starija od 12 godina	2 žličice od 5 ml jednom dnevno (10 ml sirupa )
Djeca u dobi od 2 do 12 godina i tjelesne težine iznad 30 kg	2 žličice od 5 ml jednom dnevno (10 ml sirupa )
Djeca u dobi od 2 do 12 godina i lakša od 30 kg	1 žličica od 5 ml jednom dnevno

Ako imate tešku bolest jetre, liječnik ili ljekarnik može Vam savjetovati da preporučenu dozu uzimate svaki drugi dan. U tom slučaju morate slijediti njihove upute.

### **Primjena lijeka u djece:**

Važno je znati tjelesnu težinu djeteta kako bi se osigurala primjena ispravne količine lijeka. Primjerice, devetogodišnje dijete teško je oko 30 kg. Ako niste sigurni, izvažite dijete i slijedite upute iz gornje tablice.

Lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 2 godine ili tjelesne težine manje od 30 kg.

### **Ako ste uzeli više sirupa nego što ste trebali**

Ako ste uzeli dozu veću od preporučene, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

### **Ako ste zaboravili uzeti sirup**

Ako ste zaboravili uzeti dozu sirupa na vrijeme, uzmite je čim se sjetite i nastavite s redovnim uzimanjem lijeka. Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu koju ste propustili.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

### **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah se obratite Vašem liječniku:

Vrlo rijetko nakon primjene ovog lijeka mogu se javiti ozbiljne reakcije preosjetljivosti poput teškoća s disanjem i naticanja lica, vrata, jezika ili grla (angioedem, anafilaksija). Ako primijetite neku od tih nuspojava, prestanite uzimati lijek i odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Najčešće nuspojave u djece u dobi od 2 do 12 godina su glavobolja, nervoza i umor.

Najčešće nuspojave u odraslih bolesnika i adolescenata su pospanost, glavobolja, pojačani apetit i nesnica.

Ostale nuspojave koje se mogu javiti pri primjeni lijeka:

- omaglica, grčevi mišića (konvulzije)
- ubrzani srčani ritam (tahikardija), osjećaj lupanja srca (palpitacije)
- mučnina, suha usta, problemi s želucom (gastritis)
- problemi s jetrom
- osip, gubitak kose
- umor

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati Rinolan sirup**

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Nema posebnih uvjeta čuvanja.

Upotrijebiti u roku od 30 dana nakon otvaranja bočice.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Rinolan sirup sadrži**

Djelatna tvar Rinolan sirupa je loratadin

1 ml sirupa sadrži 1 mg loratadina.

1 žličica (5 ml) sirupa sadrži 5 mg loratadina.

U Rinolan sirupu su sadržane i slijedeće pomoćne tvari: natrijev benzoat (E211); propilenglikol; glicerol; saharoza.

### **Kako Rinolan sirup izgleda i sadržaj pakiranja**

Rinolan sirup je dostupan u pakiranju od jedne staklene bočice (koja sadrži 100 ml sirupa) i plastične žlice zapremine 5 ml, u kutiji. Bočica je smeđe boje i ima aluminijski zavor.

### **Nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač:**

PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Na recept, u ljekarni.

Ova uputa zadnji je put revidirana u rujnu 2015.