

## UPUTA O LIJEKU

### **Synopen 20 mg/2 ml otopina za injekciju**

*kloropiramin*

#### **Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu.**

Uputu sačuvajte jer će te ju vjerojatno željeti ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne informacije o lijeku Synopen otopina za injekciju. Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više, obratite se liječniku ili ljekarniku. Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugim osobama. Može im naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši. Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

#### **Sadržaj upute:**

- 1. Što je Synopen otopina za injekciju i za što se koristi**
- 2. Prije nego što počnete uzimati Synopen otopinu za injekciju**
- 3. Kako uzimati Synopen otopinu za injekciju**
- 4. Moguće nuspojave**
- 5. Kako čuvati Synopen otopinu za injekciju**
- 6. Dodatne informacije**

#### **1. Što je Synopen otopina za injekciju i za što se koristi**

Djelatna tvar u Synopen otopini za injekciju je kloropiramin, antihistaminik jakog djelovanja. Antihistaminici sprječavaju učinke histamina, tvari koja se stvara u tijelu, a koja sudjeluje u nastanku alergijskih reakcija.

Onemogućavajući djelovanje histamina, antihistaminici pomažu u olakšanju alergijskih simptoma.

Synopen otopina za injekciju se koristi u liječenju akutnih alergijskih reakcija kao što su: koprivnjača (urtikarija), angioedem (akutni edem kože ili sluznica), preosjetljivost uzrokovana lijekovima, ubodi insekata, serumska bolest, polenoza (alergijska bolest koju uzrokuju peludi).

Synopen otopina za injekciju također se koristi u kombinaciji s ostalim lijekovima za liječenje anafilaktičkog šoka.

## **2. Prije nego što počnete uzimati Synopen otopinu za injekciju**

Synopen otopina za injekciju se ne smije davati:

- Osobama alergičnima na kloropiramin (djelatni sastojak Synopen otopine za injekciju),
- novorođenčadi i nedonoščadi,
- dojiljama,
- osobama koji su uzimala inhibitore monoaminooksidaze (MAO) u liječenju depresije unutar zadnjih 14 dana.

### **Budite oprezni sa Synopen otopinom za injekciju**

Obavijeste Vašeg liječnika ako:

- bolujete od epilepsije,
- ste teži srčani bolesnik,
- imate povišeni očni tlak (glaukom),
- imate problema s mokrenjem,
- imate povećanu prostatu,
- imate vrlo povišen krvni tlak (hipertenziju),
- imate oštećenje jetre ili pluća (bronha),
- imate astmu,
- imate povećanu aktivnost štitnjače,
- imate suženje na prijelazu iz želuca u dvanaestopalačno crijevo (dvanaesnik),
- pijete alkohol ili koristite lijekove za smirenje (sedative),
- trebate učiniti kožne testove dok primate Synopen otopinu za injekciju, jer može uzrokovati lažno-negativne rezultate kožnih testova,
- ako ste trudni ili dojite.

U djece se primjena Synopen otopina za injekciju ne preporučuje, osim u slučaju po život opasnih alergijskih reakcija.

### **Uzimanje drugih lijekova sa Synopen otopinom za injekciju**

Molimo obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ili ste nedavno uzimali, bilo koji drugi lijek, uključujući one nabavljenе bez recepta.

Synopen može pojačati djelovanje slijedećih lijekova:

- lijekovi za smirenje (sedativi) i spavanje (hipnotici)
- alkohol
- lijekovi koji mijenjaju ponašanje i percepciju (psihotropni lijekovi)
- atropin
- fenitoin, za liječenje epilepsije

Antidepresivi, inhibitori monoaminoooksidaze (MAO) se NE SMIJU uzimati zajedno s Synopenom.

### **Trudnoća i dojenje**

Synopen otopina za injekciju tijekom trudnoće primjenjuje se samo ako je to nužno.

Ako dojite ne smijete primati Synopen otopinu za injekciju.

### **Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima**

Zbog sedativnog učinka Synopen otopina za injekciju može smanjiti psihofizičke sposobnosti. Osjetite li pospanost, umor, vrtoglavicu, manjak koordinacije ili zamagljen vid nemojte upravljati vozilima ili strojevima.

### **3. Kako uzimati Synopen otopinu za injekciju**

Synopen otopinu za injekcije smiju primjenjivati samo kvalificirani zdravstveni djelatnici.

Synopen otopina za injekciju se primjenjuju polagano u venu (intravenski) ili duboko u mišić (intramuskularno).

*Odrasli:* 1 ampula polagano intravenski ili intramuskularno do tri puta na dan

*Djeca:* 1/2 - 1 ampula polagano intravenski ili intramuskularno. Doza je 0,20 mg/kg tj. mase.

### **Ako ste primili više Synopen otopine za injekciju nego što ste trebali**

Kako će lijek primjenjivati samo kvalificirani zdravstveni djelatnici, mala je vjerojatnost da ćete primiti veću dozu od potrebne. Ipak, ako se osjećate loše, odmah se javite svom liječniku.

## **Ako ste zaboravili primijeniti Synopen otopinu za injekciju**

Kako će lijek primjenjivati samo kvalificirani zdravstveni djelatnici, nije izgledno da nećete primiti dozu prema propisanom režimu doziranja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Synopen otopine za injekciju obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi drugi lijekovi i Synopen otopina za injekciju može uzrokovati nuspojave.

Na temelju dostupnih podataka ne može se odrediti njihova učestalost.

Moguće nuspojave su:

- Smanjeni broj bijelih krvnih stanica (leukociti, granulociti), crvenih krvnih stanica (eritrociti) i krvnih pločica (trombociti);
- pojačana osjetljivost kože na svjetlo, osip i reakcije preosjetljivosti (alergijske reakcije);
- pospanost, osjećaj iscrpljenosti, omaglica i poremećaji koordinacije. Kod djece se mogu javiti simptomi poput; nesanice, uzbudjenja i nemira;
- zamućen vid;
- smanjeni krvni tlak;
- mučnina, povraćanje, proljev, zatvor, suha usta;
- mišićna slabost.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

## **5. Kako čuvati Synopen otopinu za injekciju**

Synopen otopinu za injekciju morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Synopen otopinu za injekciju trebate čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti označenog na pakovanju.

## **6. Dodatne informacije**

### **Što sadrži Synopen otopina za injekciju**

Djelatna tvar Synopen otopine za injekciju je kloropiramin.

Jedna ampula (2 ml) Synopen otopine za injekciju sadrži 20 mg kloropiraminklorida.  
Pomoćne tvari: voda za injekcije.

#### **Kako Synopen otopina za injekciju izgleda i sadržaj pakovanja**

Synopen otopina za injekciju je bistra, bezbojna, sterilna otopina.

Synopen otopina za injekciju dostupna je u pakovanju od 10 ampula. Ampule su bezbojne, samolomljive, zapremine 2 ml.

#### **Ime i adresa proizvođača i nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:**

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet je:



PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Flipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođači lijeka:



PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Flipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Mađarska

#### **Način i mjesto izdavanja**

Na recept, samo u ljekarnama.

#### **Datum revizije upute :**

Prosinc, 2014.