

UPUTA O LIJEKU

Ventolin 100 mikrograma aerosol za inhaliranje

salbutamol

Molimo Vas pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

- Sačuvajte ovu uputu jer ćete je možda trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima, čak i ako imaju simptome jednake vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

- 1. Što je Ventolin aerosol za inhaliranje i za što se koristi**
- 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ventolin aerosol za inhaliranje**
- 3. Kako uzimati Ventolin aerosol za inhaliranje**
- 4. Moguće nuspojave**
- 5. Kako čuvati Ventolin aerosol za inhaliranje**
- 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

1. ŠTO JE VENTOLIN AEROSOL ZA INHALIRANJE I ZA ŠTO SE KORISTI

Ventolin aerosol za inhaliranje je lijek u obliku stlačenog inhalata, suspenzije kojeg udišete kroz usta izravno u Vaša pluća, gdje lijek treba djelovati. Svakim udahom uzimate 100 mikrograma salbutamola, djelatne tvari Ventolin aerosola za inhaliranje. Svako pakiranje dostatno je za 200 udaha.

Ventolin aerosol za inhaliranje također sadrži i potisni plin, norfluran.

Salbutamol, djelatna tvar Ventolin aerosola za inhaliranje, je jedan od lijekova iz skupine bronhodilatatora. On opušta mišiće u stjenkama malih dišnih putova u plućima. To dovodi do otvaranja dišnih putova i pomaže otklanjanju pritiska u prsnom košu, šumnog disanja i kašlja te stoga možete lakše disati.

Ventolin aerosol za inhaliranje se koristi za prevenciju i liječenje simptoma astme. Također se koristi za ublažavanje i sprječavanje astme izazvane tjelesnim naporom ili alergenima (npr. kućna prašina, pelud, dlakaživotinja kao što su psi i mačke, dim cigareta) ili liječenje drugih problema s disanjem uzrokovanih plućnim bolestima.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI VENTOLIN AEROSOL ZA INHALIRANJE

Nemojte uzimati Ventolin aerosol za inhaliranje:

- ako ste ikada imali alergijsku reakciju na Ventolin aerosol za inhaliranje.
- ako imate prijevremene trudove ili u slučajevima prijetećeg pobačaja.

Budite oprezni pri uzimanju Ventolin aerosola za inhaliranje:

- ako imate prekomjerno aktivnu štitnjaču,
- ako imate povišeni krvni tlak,
- ako ste ikada imali srčanu bolest, nepravilan srčani ritam ili anginu pectoris.

Ako tijekom uzimanja Ventolin aerosola za inhaliranje osjetite bol u prsima, poteškoće u disanju ili pogoršanje od prije postojeće srčane bolesti, odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Uzimanje drugih lijekova:

Postoje lijekovi koji mogu stupiti u interakcije (međudjelovanje) s Ventolin aerosolom za inhaliranje, stoga morate obavijestiti svog liječnika ako uzimate ili ste uzimali bilo koje lijekove, uključujući i one nabavljene bez recepta.

Posebno je važno da kažete svom liječniku ako uzimate:

- lijekove za pomoć kod nepravilnih ili brzih otkucaja srca
- druge lijekove za astmu

Uzimanje hrane i pića s Ventolin aerosolom za inhaliranje

Ventolin možete uzeti u bilo koje doba dana, uz hranu ili bez nje.

Trudnoća i dojenje

Vaš će liječnik odlučiti o primjeni Ventolin aerosola za inhaliranje tijekom trudnoće i dojenja.

Stoga, ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite upitajte svog liječnika za savjet.

Upravljanje motornim vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Ventolin aerosol za inhaliranje utjecati na vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3. KAKO UZIMATI VENTOLIN AEROSOL ZA INHALIRANJE

Ventolin aerosol za inhaliranje stvara finu maglicu koju kroz usta morate udahnuti u pluća. Provjerite znate li kako se na ispravan način služiti inhalatorom. Upute za uporabu se nalaze na kraju ove upute. Budete li imali pitanja ili nejasnoća, zatražite pomoć od svog liječnika ili ljekarnika.

Provjerite znate li **kako, kada i koliko puta** morate inhalirati. Vaš liječnik Vam je to vjerojatno rekao. Ako niste sigurni, upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Odrasli, adolescenti stariji od 12 godina

- za ublažavanje astme – 1 do 2 inhalata ili potiska.
- za sprječavanje astme – 2 inhalata ili potiska 10-15 minuta prije izlaganja tjelesnom naporu ili alergenima.
- za kroničnu upotrebu – 2 inhalata ili potiska do četiri puta dnevno.
- maksimalna doza je 8 inhalata ili potiska unutar 24 sata.

Djeca u dobi od 4 do 11 godina

- za ublažavanje astme – 1 inhalat ili potisak. Po potrebi 2 inhalata ili potiska.
- za sprječavanje astme – 1 inhalat ili potisak 10-15 minuta prije izlaganja tjelesnom naporu ili alergenima. Po potrebi 2 inhalata ili potiska.
- za kroničnu upotrebu - 2 inhalata ili potiska do četiri puta dnevno.
- maksimalna doza je 8 inhalata ili potiska unutar 24 sata.

Uvijek imajte na umu niže navedeno.

- Kako se uz visoke doze veže veća mogućnost pojave nuspojava, doza se može povisiti isključivo na savjet liječnika. Stoga NE SMIJETE UZETI više udaha ni inhalator uporabiti više puta nego što Vam je liječnik odredio.

- Liječnik Vam je možda rekao da u hitnom slučaju uzmete više udaha, bude li disanje jako otežano. **VRLO JE VAŽNO** da se pridržavate uputa liječnika o tome koliko udaha uzeti i kako često ih uzimati.

Ako ste propustili dozu Ventolin aerosola za inhaliranje

Ako ste propustili primijeniti dozu Ventolin aerosola za inhaliranje, uzmite je kad se sjetite. Međutim, ako je već vrijeme za sljedeću dozu prema uobičajenom rasporedu, preskočite dozu koju ste propustili. Nemojte uzimati dvostruku dozu.

Ako ste uzeli više Ventolin aerosola za inhaliranje nego što ste trebali

Ako ste uzeli dozu veću od preporučene, možda će Vam srce kucati brže nego inače i možda ćete osjetiti slabost. Ti učinci obično nestaju za nekoliko sati.

O tome morate što prije obavijestiti svog liječnika.

Ako prestanete uzimati Ventolin aerosol za inhaliranje

Nemojte prestati uzimati lijek bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Ventolin aerosola za inhaliranje obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Ako Vam se disanje neposredno nakon inhaliranja još više pogorša, lijek odmah prestanite uzimati i odmah obavijestite liječnika.

Kao i svi drugi lijekovi Ventolin aerosol za inhaliranje može u nekih bolesnika uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Alergijske reakcije (javljaju se kod manje od jedne na 10 000 osoba)

Ako dođe do alergijske reakcije, prestanite s primjenom lijeka i odmah se obratite liječniku.

Neki od znakova alergijskih reakcija su: otjecanje lica, usana, jezika ili grla, što može uzrokovati

teškoće pri guranju ili disanju, osip popraćen svrbežom, osjećaj slabosti i vrtoglavice, te nesvjestica.

Nuspojave koje se mogu javiti često (javljaju se kod manje od jedne od deset osoba)

- tremor,
- glavobolja, omaglica,
- ubrzani otkucaji srca.

Nuspojave koje se mogu javiti manje često (javljaju se kod manje od jedne od 100 osoba)

- osjećaj "lupanja" srca,
- iritacija grla,
- iritacija usne šupljine,
- grčevi mišića.

Nuspojave koje se mogu javiti rijetko (javljaju se kod manje od jedne od 1000 osoba)

- niska razina kalija u krvi,
- pojačan protok krvi u ekstremitetima (periferna dilatacija).

Nuspojave koje se mogu javiti vrlo rijetko (javljaju se kod manje od jedne od 10 000 osoba)

- promjene u ciklusu spavanja i promjene u ponašanju poput nespokoja i razdražljivosti,
- alergijske reakcije (vidjeti iznad).

Nepoznata učestalost (na temelju dostupnih podataka ne može se procijeniti učestalost)

- nedostatak kisika u srčanom mišiću (ishemija miokarda).

Osim navedenih nuspojava kod djece se može rijetko (u 1 od 10000 do 1 od 1000 djece) javiti i hiperaktivnost.

Ako mislite da učinak lijeka nije zadovoljavajući

Ako se učinak po primjeni lijeka razlikuje od uobičajenog, odmah se obratite svom liječniku.

Moguće je da se pogoršavaju Vaši problemi s plućima te vam je potreban drugačiji lijek.

Nemojte uzimati dodatne doze Ventolina ako vam liječnik to nije preporučio.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI VENTOLIN AEROSOL ZA INHALIRANJE

Ventolin aerosol za inhaliranje morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Ventolin aerosol za inhaliranje čuvajte na temperaturi ispod 30 °C.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti označenog na pakiranju.

6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što sadrži Ventolin aerosol za inhaliranje

Jedna doza inhalata (jedan potisak) sadrži 100 mikrograma salbutamola u obliku salbutamolsulfata.

Pomoćna tvar u Ventolin aerosolu za inhaliranje je potisni plin norfluran.

Kako izgleda Ventolin aerosol za inhaliranje i sadržaj pakiranja

Ventolin aerosol za inhaliranje je stlačeni inhalat u obliku suspenzije.

Ventolin aerosol za inhaliranje dostupan je u pakiranju od 200 doza u metalnom spremniku pod tlakom s odmjernim ventilom, uloženo u plastični raspršivač, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:



PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač lijeka:



PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Datum revizije upute:

Listopad, 2013.

UPUTA ZA UPORABU

Prije uporabe Ventolin aerosola za inhaliranje treba pažljivo pročitati ovu uputu.



Ventolin aerosol za inhaliranje koristi se na sljedeći način:

1. Okrenite spremnik kako je prikazano na slici tako da dno bočice bude okrenuto prema gore, a nastavak za usta prema dolje.
2. Skinite poklopac s nastavka za usta i promućkajte sadržaj u bočici.
3. Izdahnite što je moguće potpunije.
4. Spremnik držite kao što je prikazano na slici. Nastavak za usta obuhvatite čvrsto usnicama.
5. Duboko udahnite kroz nastavak za usta, a u isto vrijeme pritisnite kažiprstom metalni spremnik prema dolje; pri tome iz spremnika izlazi određena količina lijeka, tj. jedna inhalacija.
6. Olabavite pritisak na spremnik. Izvadite nastavak iz usta i zadržite dah što je moguće dulje.
7. Pričekajte barem jednu minutu, prije nego što eventualno drugi put inhalirate.
8. Nastavak za usta zatvorite čepom.



NAPOMENE

Ventolin aerosol za inhaliranje se primjenjuje prema uputama liječnika.

Propisanu dozu ne smijete prekoračiti - prekomjerna inhalacija lijeka može biti opasna za bolesnika.

Ventolin aerosolom za inhaliranje smiju rukovati samo odrasle i potpuno odgovorne osobe pa ga npr. djeca smiju primjenjivati samo u prisutnosti i pod kontrolom odraslih. Stariji bolesnici i

rastresene osobe smiju upotrebljavati Ventolin aerosol za inhaliranje samo pod kontrolom drugih osoba ili liječnika.

ČIŠĆENJE

Sa spremnika treba skinuti plastični nastavak za inhaliranje, uroniti ga u toplu vodu, osušiti i kad je potpuno suh, treba ga ponovno staviti (nataknuti) na spremnik.

UPOZORENJE

Spremnik je pod tlakom. Ne smije se nasilno otvarati, niti bušiti ili izlagati visokim temperaturama te spaljivati, čak ni kad je prazan.