

## UPUTA O LIJEKU

### **Hepan 500 i.j./g + 5 mg/g gel** (heparinnatrij, dekspantenol)

*Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete koristiti ovaj lijek.*

- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.
- Ako imate još pitanja, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
- Ovaj lijek dostupan je bez recepta za liječenje blažih bolesti za koje nije potrebna liječnička pomoć. Svejedno je potrebno pažljivo koristiti **Hepan gel**.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, molimo Vas da obavijestite liječnika ili ljekarnika

Uputa sadrži:

1. Što je Hepan gel i za što se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Hepan gel
3. Kako koristiti Hepan gel
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Hepan gel
6. Dodatne informacije

#### **1. Što je Hepan gel i za što se koristi**

Hepan gel spada u skupinu antivarikozne terapije. U sastavu sadrži heparinnatrij i dekspantenol.

Hepan gel koristi se za lokalno liječenje površnog tromboflebitisa (lokalizirana upala površinskih vena i stanja nastalih kao posljedica tromboze površinskih vena).

#### **2. Prije nego počnete koristiti Hepan gel**

Hepan gel ne smijete koristiti:

- ako ste alergični na bilo koji sastojak lijeka (molim Vas pogledajte sastav lijeka naveden u dijelu 6).

Zbog veće propusnosti kože Hepan gel se ne primjenjuje u novorođenčadi i dojenčadi.

Budite oprezni s Hepan gelom

*Informirajte liječnika ako bolujete od neke kronične bolesti, metaboličkog poremećaja, ako ste preosjetljivi ili uzimate još neke lijekove.*

Za vrijeme korištenja Hepan gela treba paziti da gel ne dospije u oči, na sluznicu ili otvorene rane, kao i na kožu zahvaćenu infekcijom.

Uzimanje drugih lijekova istovremeno s Hepan gelom

*Prije početka korištenja Hepan gela, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika ako koristite neke druge lijekove. Također i one lijekove koji Vam nije propisao liječnik.*

Uz Hepan gel lokalno se ne koriste drugi lijekovi pa interakcije nisu zabilježene.

Trudnoća i dojenje

Nema podataka o štetnim učincima na majku i dijete nakon lokalne primjene heparinnatrija i dekspantenola. Trudnice i dojilje mogu primjenjivati Hegan gel prema predloženoj uputi o uzimanju.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima  
Gel ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Ostala upozorenja

Hegan gel sadrži propilenglikol koji može nadražiti kožu.

Hegan gel sadrži metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat koji mogu uzrokovati alergijske reakcije (moguće i odgođene reakcije preosjetljivosti).

### **3. Kako koristiti Hegan gel**

*Slijedite navedene upute, osim ako Vam liječnik nije dao druge upute.*

*Liječnik će Vas uputiti koliko dugo trebate koristiti gel.*

Hegan gel nanosi se na bolno, upaljeno područje vena 2-4 puta dnevno u tankom sloju, bez utrljavanja u kožu, a upalno područje prekrije se gazom i povije.

Liječenje najčešće traje 1-2 tjedna, a u kroničnim slučajevima i tjednima. Dulja primjena treba biti pod liječničkim nadzorom.

Ako uzmete više gela nego što ste trebali

Koristi li se gel prema preporukama, nema opasnosti od predoziranja.

### **4. Moguće nuspojave**

Nuspojave su rijetke.

Heparinnatrij i dekspantenol mogu tijekom dugotrajne lokalne primjene uzrokovati preosjetljivost kože.

*O svakoj nuspojavi treba obavijestiti liječnika ili ljekarnika.*

### **5. Kako čuvati Hegan gel**

Lijek čuvati na temperaturi ispod 25°C, izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti otisnutog na pakovanju.

### **6. Dodatne informacije**

Što Hegan gel sadrži

1 g gela sadrži: 500 i.j. heparinnatrija i 5 mg dekspantenola.

Pomoćne tvari: glicerol; karbomer; etanol; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; propilenglikol; trolamin; voda, pročišćena.

Kako Hegan gel izgleda i sadržaj pakovanja

HEPAN 500 i.j/g + 5 mg/g gel je bezbojan, bistar gel.

Aluminijska tuba s 50 g gela, u kutiji.

### **Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka**

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

### **Ime i adresa proizvođača lijeka**

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima.

**Datum revizije upute**

Siječanj, 2014.