

UPUTA O LIJEKU

Hepan 500 i.j./g + 5 mg/g krema (heparinnatrij, dekspantenol)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete koristiti ovaj lijek.

- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.
- Ako imate još pitanja, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
- Ovaj lijek dostupan je bez recepta za liječenje blažih bolesti za koje nije potrebna liječnička pomoć. Svejedno je potrebno pažljivo koristiti **Hepan kremu**.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, molimo Vas da obavijestite liječnika ili ljekarnika

Uputa sadrži:

1. Što je Hepan krema i za što se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Hepan kremu
3. Kako koristiti Hepan kremu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Hepan kremu
6. Dodatne informacije

1. Što je Hepan krema i za što se koristi

Hepan krema spada u skupinu antivarikozne terapije. U sastavu sadrži heparinnatrij i dekspantenol.

Hepan krema koristi se za lokalno liječenje površnog tromboflebitisa (lokalizirana upala površinskih vena i stanja nastalih kao posljedica tromboze površinskih vena).

2. Prije nego počnete koristiti Hepan kremu

Hepan kremu ne smijete koristiti:

- ako ste alergični na bilo koji sastojak lijeka (molim Vas pogledajte sastav lijeka naveden u dijelu 6).

Zbog veće propusnosti kože Hepan gel se ne primjenjuje u novorođenčadi i dojenčadi.

Budite oprezni s Hepan kremom

Informirajte liječnika ako bolujete od neke kronične bolesti, metaboličkog poremećaja, ako ste preosjetljivi ili uzimate još neke lijekove.

Za vrijeme korištenja Hepan kreme treba paziti da krema ne dospije u oči, na sluznicu ili otvorene rane, kao i na kožu zahvaćenu infekcijom.

Uzimanje drugih lijekova istovremeno s Hepan kremom

Prije početka korištenja Hepan kreme, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika ako koristite neke druge lijekove. Također i one lijekove koji Vam nije propisao liječnik.

Uz Hepan kremu lokalno se ne koriste drugi lijekovi pa interakcije nisu zabilježene.

Trudnoća i dojenje

Nema podataka o štetnim učincima na majku i dijete nakon lokalne primjene heparinnatrija i dekspantenola. Trudnice i dojilje mogu primjenjivati Heparan kremu prema predloženoj uputi o uzimanju.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Krema ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Ostala upozorenja

Heparan krema sadrži lanolin koji može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

Heparan krema sadrži metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat koji mogu uzrokovati alergijske reakcije (moguće i odgođene reakcije preosjetljivosti).

3. Kako koristiti Heparan kremu

Slijedite navedene upute, osim ako Vam liječnik nije dao druge upute.

Liječnik će Vas uputiti koliko dugo trebate koristiti kremu.

Heparan krema nanosi se na bolno, upaljeno područje vena 1-3 puta dnevno u tankom sloju, bez utrljavanja u kožu, a upalno područje prekrije se gazom i povije.

Liječenje najčešće traje 1-2 tjedna, a u kroničnim slučajevima i tjednima. Dulja primjena treba biti pod liječničkim nadzorom.

Ako uzmete više kreme nego što ste trebali

Koristi li se krema prema preporukama, nema opasnosti od predoziranja.

4. Moguće nuspojave

Nuspojave su rijetke.

Heparinnatrij i dekspantenol mogu tijekom dugotrajne lokalne primjene uzrokovati preosjetljivost kože.

O svakoj nuspojavi treba obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Heparan kremu

Lijek čuvati na temperaturi ispod 25°C, izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti otisnutog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Heparan krema sadrži

1 g kreme sadržava: 500 i.j. heparinnatrija i 5 mg dekspantenola.

Pomoćne tvari: vazelin, bijeli; emulgirajući vosak; izopropilmiristat; lanolin; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; voda, pročišćena.

Kako Heparan krema izgleda i sadržaj pakovanja

Heparan 500 i.j/g +/- 5 mg/g krema je bijela, homogena krema.

Aluminijska tuba s 50 g kreme, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima.

Datum revizije upute

Siječanj, 2014.