

Uputa o lijeku

LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju *lidokain*

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego se počne s primjenom LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopine za injekciju ili infuziju
3. Kako primjenjivati LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopinu za injekciju ili infuziju
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopinu za injekciju ili infuziju.
6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

1. ŠTO JE LIDOKAIN BELUPO 20 MG/ML OTOPINA ZA INJEKCIJU ILI INFUZIJU I ZA ŠTO SE KORISTE

LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju sadrži lokalni anestetik koji se koristi za:

- provođenje postupaka lokalne anestezije (kako bi se izazvala obamrlost određenog dijela tijela) te se na taj način sprječava osjećaj boli na mjestu primjene
- regulaciju brzih ili neuobičajenih otkucaja srca koji se mogu pojaviti nakon srčanog udara.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO SE POČNE S PRIMJENOM LIDOKAIN BELUPO 20 MG/ML OTOPINE ZA INJEKCIJU ILI INFUZIJU

Ne smijete primiti LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopinu za injekciju ili infuziju:

- ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Obavijestite Vašeg liječnika ukoliko ste ikada imali alergijsku reakciju ili neku drugu lošu reakciju, npr. kožni osip ili ste ostali bez daha, na bilo koji drugi lokalni anestetik.
- ako imate određene poremećaje u radu srca. Obavijestite Vašeg liječnika ukoliko bolujete od nekih poremećaja u radu srca, a naročito od poremećaja koji uzrokuju slabiji rad, nepravilne otkucaje ili usporeni rad srca.
- ako bolujete od porfirije (krvni poremećaj). Obavijestite Vašeg liječnika ukoliko bolujete od bilo kojeg poremećaja krvi.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije nego primite LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopinu za injekciju ili infuziju:

- ako imate poremećaj u radu srca ili poremećaj disanja
- ako imate bolest bubrega ili jetre
- ako se osjećate iscrpljeno ili loše iz bilo kojeg razloga
- ako bolujete od epilepsije ili imate napade grčeva
- ako bolujete od mijastenije gravis (bolest koja uzrokuje slabost mišića)
- ako imate krvni poremećaj ili imate neravnotežu sastojaka krvi
- ako imate upalu ili infekciju na dijelu tijela na kojem trebate primiti injekciju.

Oprez je potreban kod davanja LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopine za injekciju ili infuziju u stanju šoka.

Ukoliko odlazite od liječnika prije nego prestane učinak LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopine za injekciju ili infuziju i još osjećate obamrlost i gubitak osjeta morate paziti na sljedeće:

- tijekom vremena dok traje osjećaj obamrlosti može doći do ozbiljnih ozljeda, bez da ste toga svjesni. Budite posebno oprezni kako bi izbjegli nastanak ozljede sve dok traje učinak lijeka i dok se ne vrati osjet u zahvaćani dio tijela.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili pak niste sigurni, javite se svom liječniku.

Drugi lijekovi i LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ovo se odnosi i na lijekove koje ste kupili bez recepta uključujući biljne i homeopatske lijekove.

Obavijestite svojeg liječnika ukoliko uzimate neke od sljedećih lijekova:

- **sedativi** - koriste se za smirenje
- **acetazolamid** – koristi se za smanjenje očnog tlaka
- **cimetidin** – koristi se za liječenje čireva na želucu ili žgaravice
- **dolasetron** – koristi se za sprječavanje i liječenje mučnine i povraćanja
- **kvinupristin/dalfopristin** – koriste za liječenje određenih infekcija
- **β-blokatori** – koriste se za liječenje boli u prsima, povišenog krvnog tlaka i drugih srčanih tegoba
- **diuretici** – koriste se za poticanje mokrenja
- **antivirusni lijekovi** – lijekovi poput amprenavira, atazanavira, darunavira i lopinavira mogu uzrokovati porast koncentracije LIDOKAIN Belupo injekcija u serumu
- **drugi antiaritmici** – koriste se za liječenje nepravilnog rada srca npr. propafenon
- **antipsihotici** – koriste se u liječenju psihičkih poremećaja, npr. fenotijazin
- **mišićni relaksansi** – koriste se za opuštanje mišića, npr. suksametonij.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primite ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima što ovisi o mjestu i načinu primjene. Pitajte svojeg liječnika kada će popustiti učinak injekcije te kada je sigurno da možete upravljati vozilima i strojevima.

Nemojte upravljati vozilima ili raditi na strojevima ukoliko osjećate učinak LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopine za injekciju ili infuziju.

3. KAKO PRIMIJENJIVATI LIDOKAIN BELUPO 20 MG/ML OTOPINU ZA INJEKCIJU ILI INFUZIJU

LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopinu za injekciju ili infuziju će Vam dati liječnik ili medicinska sestra.

Liječnik će procijeniti koju će dozu primijeniti te kada i na koji način će Vam dati injekciju.

Ako je primijenjeno više LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopine za injekciju ili infuziju nego što je trebalo

LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopinu za injekciju ili infuziju će primijeniti Vaš liječnik ili medicinska sestra, tako da je vjerojatnost da primite preveliku dozu mala.

Ako ipak mislite da ste primili preveliku dozu, tada to recite liječniku ili medicinskoj sestri.

Lidokain Belupo 20 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju nije namijenjene za primjenu u oko.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Zabilježene su sljedeće nuspojave kod primijene LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopine za injekciju ili infuziju:

- **alergijske reakcije** – alergijske reakcije na LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopinu za injekciju ili infuziju su rijetke, ali odmah obavijestite Vašeg liječnika ukoliko primijetite poteškoće u disanju, kožni osip ili svrbež
- **poremećaji živčanog sustava** – omaglica ili omamljenost, pospanost, drhtavica, obamrlost jezika. Ponekad ovi simptomi mogu biti pokazatelj da ste primili preveliku dozu LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopine za injekciju ili infuziju. Također, mogu se još javiti epileptički napadi (mišićni grčevi).
- **poremećaji oka** – zamućeni vid ili dvostruka slika
- **poremećaji uha** – tinitus (zvonjava u ušima), hiperakuzija (pojačana osjetljivost na zvukove)
- **poremećaji u radu srca** – povišen ili snižen krvni tlak, usporavanje rada srca te prekid rada srca, promjene u otkucajima srca
- **poremećaji disanja** – otežano disanje ili prekid disanja

- **poremećaji probave** – mučnina i povraćanje
- **poremećaji kože** – osip, svrbež i oteklina lica. Zabilježeni su još bol, upala ili obamrlost na mjestu primjene injekcije nakon što je vrijeme učinka lijeka prošlo.

Nakon primjene LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopine za injekciju ili infuziju u kralježnicu, recite svojem liječniku ukoliko primijetite:

- bolove ili obamrlost u leđima ili potkoljenicama
- otežan hod
- poteškoće s kontrolom mokrenja ili crijevne tegobe
- osjećaj nesvjestice ili omamljenost
- usporene otkucaje srca.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. KAKO ČUVATI LIDOKAIN BELUPO 20 MG/ML OTOPINU ZA INJEKCIJU ILI INFUZIJU

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek čuvajte na temperaturi ispod 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. SADRŽAJ PAKOVANJA I DODATNE INFORMACIJE

Što LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju sadrži

Djelatna tvar je lidokain.

1 ml otopine za injekciju ili infuziju sadrži 20 mg lidokainklorida.

Ampula s 2 ml otopine za injekciju ili infuziju sadrži 40 mg lidokainklorida.

Ampula s 5 ml otopine za injekciju ili infuziju sadrži 100 mg lidokainklorida.

Pomoćne tvari su: natrijev klorid; natrijev hidroksid; voda za injekcije.

Kako LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju izgleda i sadržaj pakovanja

LIDOKAIN Belupo 20 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju je bistra, bezbojna otopina.

2 ml otopine za injekciju ili infuziju u 10 ili 100 ampula, u kutiji.

5 ml otopine za injekciju ili infuziju u 5 ampula, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Ulica Danica 5
48 000 Koprivnica, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja
Na recept, u ljekarni.

Datum revizije upute
Ožujku 2013.