

UPUTA O LIJEKU

BELODIN 10 mg tablete *loratadin*

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi možete pročitati sljedeće:

1. Što je BELODIN i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati BELODIN
3. Kako uzimati BELODIN
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati BELODIN
6. Dodatne informacije

1. ŠTO JE BELODIN I ZA ŠTO SE KORISTI

BELODIN pripada skupini lijekova poznatoj kao antihistaminici. Antihistaminici ublažavaju simptome alergijskih reakcija sprječavajući učinke tvari zvane histamin, koja se stvara u tijelu.

BELODIN ublažava simptome alergijskog rinitisa (npr. peludne groznice) kao što su kihanje, curenje ili svrbež nosa te peckanje ili svrbež očiju.

BELODIN također ublažava simptome urtikarije (koprivnjače) kao što su svrbež i crvenilo.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI BELODIN

Nemojte uzimati BELODIN

- ako ste već imali alergijsku reakciju (crvenilo, oticanje usana i jezika, svrbež, gušenje) na loratadin ili na neki od pomoćnih sastojaka lijeka.
- ako ste trudni ili dojite (vidjeti dio **Trudnoća i dojenje**).

BELODIN tablete ne primjenjujte u djece mlađe od 2 godine.

Budite posebno oprezni s BELODIN tabletama ako imate bolest jetre.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, javite se svom liječniku.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Laboratorijske pretrage

Ukoliko trebate obaviti kožne testove za alergiju, prekinite uzimanje BELODIN tableta dva dana prije testa.

Uzimanje hrane i pića s BELODIN tabletama

BELODIN se može uzimati neovisno o obroku.
BELODIN ne pojačava učinak alkoholnih pića.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.
Primjena loratadina se tijekom trudnoće ne preporučuje.
Loratadin se izlučuje u majčino mlijeko te se ne preporučuje primjena lijeka u dojilja.

Upravljanje vozilima i strojevima

U preporučenim dozama BELODIN ne bi trebao izazvati pospanost ili smanjenje budnosti. Međutim, u vrlo rijetkim slučajevima BELODIN može izazvati pospanost, što može utjecati na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima BELODIN tableta

BELODIN tablete sadržavaju laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI BELODIN

BELODIN uvijek uzimajte točno onako kako Vam je preporučio Vaš liječnik. Ukoliko niste sigurni, trebali biste provjeriti način uzimanja sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

BELODIN tablete uzimajte samo jedanput na dan otprilike u isto vrijeme, neovisno o obroku.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Uzmite jednu BELODIN tabletu jedanput na dan.

Djeca mlađa od 12 godina (tjelesne mase veće od 30 kg)

Uzmite jednu BELODIN tabletu jedanput na dan.

Ne primjenjujte BELODIN u djece mlađe od dvije godine (vidjeti dio **Nemojte uzimati BELODIN**).

Bolesnici s teškim oštećenjem jetre

Uzmite jednu BELODIN tabletu **svaki drugi dan**.

Ako uzmete više BELODIN tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više BELODIN tableta nego što ste trebali, obratite se svom liječniku ili u najbližu zdravstvenu ustanovu. Sa sobom ponesite i ovu uputu kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lijek uzeli.

Ne očekuju se teže posljedice u slučaju uzimanja veće doze BELODIN tableta od preporučene. Moguća je pojava pospanosti, ubrzano lupanje srca i glavobolja.

Ako ste zaboravili uzeti BELODIN

Ako ste propustili uzeti BELODIN tabletu, uzmite je što je moguće prije, a zatim nastavite uzimati lijek po uobičajenom rasporedu uzimanja. Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili pojedinačnu dozu koju ste zaboravili.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom BELODIN tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, BELODIN može izazvati nuspojave.

Vrlo rijetko su prijavljeni slučajevi alergijskih reakcija (reakcije preosjetljivosti) poput otežanog disanja, naticanja lica, vrata, jezika ili ždrijela nakon primjene BELODIN tableta. Ukoliko razvijete bilo koju od navedenih reakcija, prestanite uzimati tablete i odmah se javite Vašem liječniku ili ljekarniku.

Najčešće prijavljene nuspojave u djece u dobi od 2 do 12 godina uključuju glavobolju, nervozu i umor.

Najčešće prijavljene nuspojave u odraslih i adolescenata uključuju pospanost, glavobolju, pojačan apetit i nesanicu.

Druge vrlo rijetke nuspojave uključuju omaglicu, nepravilne ili ubrzane otkucaje srca, mučninu, suha usta, želučane tegobe, probleme s jetrom, gubitak kose, osip i umor.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI BELODIN

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25°C.

BELODIN se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo naš okoliš.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što sadrži BELODIN

Djelatna tvar je loratadin.

Jedna tableta sadržava 10 mg loratadina.

Pomoćne tvari: laktoza hidrat; magnezijev stearat i kukuruzni škrob.

Kako BELODIN izgleda i sadržaj pakiranja

BELODIN 10 mg je bijela okrugla tableta.

30 (1x30) tableta u PVC//Al blisteru, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja/proizvođača za stavljanje u promet gotovog lijeka

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Datum revizije upute

Siječanj, 2012.