

UPUTA O LIJEKU

LUPOCET® JUNIOR sirup *paracetamol*

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu.

Uputu nemojte baciti. Kasnije ćete je možda trebati ponovo pročitati.

Ako trebate dodatne obavijesti, zatražite ih od svog liječnika ili ljekarnika.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi možete pročitati sljedeće:

1. Što je LUPOCET i za što se koristi
2. Prije nego počnete primjenu LUPOCETA
3. Kako uzimati LUPOCET
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati LUPOCET
6. Dodatne informacije

1. ŠTO JE LUPOCET I ZA ŠTO SE KORISTI

LUPOCET je lijek koji sadrži paracetamol i izdaje bez recepta. Koristi se za snižavanje povišene tjelesne temperature i za ublažavanje boli.

LUPOCET sirup namijenjen je djeci. Prikladan je za snižavanje povišene tjelesne temperature koja je povezana s prehladom, gripom, dječjim zaraznim bolestima (npr. vodene kozice, hripavac, ospice, zaušnjaci) ili reakcijom na cijepljenje, kao i za ublažavanje zubobolje, glavobolje, grlobolje, boli pri nicanju zuba, nakon operacija i ozljeda te boli u mišićima i zglobovima.

2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENU LUPOCETA

LUPOCET sirup **ne smije se primjenjivati** ako je Vaše dijete preosjetljivo na paracetamol ili neki od pomoćnih sastojaka lijeka.

U nedonoščadi mlađe od 3 mjeseca, LUPOCET se primjenjuje uz nadzor liječnika.

Budite oprezni s LUPOCET sirupom:

- ako Vaše dijete ima problema s bubrezima i/ili jetrom
- ako Vaše dijete istodobno uzima druge lijekove koji sadrže paracetamol (odmah **prekinite** njihovu primjenu jer se ne smiju koristiti zajedno s LUPOCET sirupom, vidi **Uzimanje drugih lijekova s LUPOCET sirupom**).

Obavijestite svog liječnika ako bol traje dulje vremena (npr. dugotrajna, neprekidna glavobolja).

Potreban je oprez pri primjeni LUPOCETA tijekom duljeg razdoblja.

U slučaju predoziranja potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć, čak i ako nema nikakvih simptoma (vidi **Ako se uzme više LUPOCET sirupa nego što je trebalo**). Naime, postoji rizik za naknadnu pojavu teškog oštećenja jetre.

A L¹¹ M P
20-05-2010
ODOBRENO

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vaše dijete ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Uzimanje drugih lijekova s LUPOCET sirupom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika o svim lijekovima koje Vaše dijete uzima ili je nedavno uzimalo, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ukoliko je dijete zaprimljeno u bolnicu, obavijestite nadležnog liječnika o uzimanju LUPOCET sirupa, kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje dijete uzima.

Obavijestite liječnika ili ljekarnika o drugim lijekovima koje Vaše dijete uzima jer neki lijekovi mogu ometati djelovanje drugih.

Tijekom primjene LUPOCET sirupa **ne smiju se uzimati** neki drugi lijekovi koji sadržavaju paracetamol.

Ako Vaše dijete uzima neke od sljedećih lijekova, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije primjene LUPOCET sirupa:

- metoklopramid ili domperidon (lijekovi protiv mučnine i povraćanja)
- kolestiramin (lijek za snižavanje kolesterola u krvi, za ublažavanje svrbeža i proljeva u nekim bolestima probavnog sustava)
- antikoagulans (lijek koji sprječava zgrušavanje krvi)
- antiepileptik (lijek za liječenje epilepsije ili padavice)
- barbiturat (lijeka za smirenje, i za liječenje epilepsije ili padavice)
- rifampicin (lijek za liječenje bakterijske infekcije).

Uzimanje hrane i pića s LUPOCET sirupom

LUPOCET sirup može se uzimati neovisno o obroku.

Ostala upozorenja

LUPOCET sirup sadržava sorbitol. Stoga, ako Vaše dijete boluje od nekog oblika nepodnošenja šećera, prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek posavjetujte se sa liječnikom.

3. KAKO UZIMATI LUPOCET


Pridržavajte se preporučenog doziranja.

Ne preporučuje se primjena dulje od tri dana bez savjeta liječnika. U slučaju da se unatoč primjeni lijeka tegobe Vašeg djeteta ne ublaže ili se pojave novi simptomi, potražite savjet liječnika.

Doziranje se treba temeljiti na tjelesnoj masi djeteta. Približna dob u odnosu na tjelesnu masu navedena je samo kao smjernica.

Preporučene doze ne smiju se uzimati u razmacima kraćim od 4 sata niti više od četiri doze tijekom 24 sata.

Prije svake primjene treba dobro promućkati bočicu sa sirupom.



Novorođenčad i dojenčad do 3 mjeseca (tjelesna masa do 5 kg)

Uobičajena doza: 10 mg/kg tjelesne mase, odnosno do 1/2 žličice sirupa (60 mg) 3 do 4 puta na dan po potrebi

Novorođenačka žutica: 5 mg/kg tjelesne mase, odnosno do 1/4 žličice sirupa (30 mg) 3 do 4 puta na dan.

Dojenčad od 3 mjeseca do jedne godine (tjelesna masa od 5-10 kg)

1/2 - 1 žličica sirupa (60-120 mg) 3 do 4 puta na dan.

Djeca od 1-6 godina (tjelesna masa od 10-20 kg)

1 - 2 žličice sirupa (120-240 mg) 3 do 4 puta na dan.

Djeca od 6-12 godina (tjelesna masa od 20-40 kg)

2 - 4 žličice sirupa (240-480 mg) 3 do 4 puta na dan.

Ako ste zaboravili dati LUPOCET

Ako ste zaboravili Vašem djetetu dati dozu lijeka, odmah dajte propuštenu dozu, osim ako nije već vrijeme za sljedeću dozu. Ne primjenjujte dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ako se uzme više LUPOCET sirupa nego je trebalo

Odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Uzmite bočicu sirupa ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno o kojem se lijeku radi.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom LUPOCET sirupa, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi LUPOCET može izazvati nuspojave.

Uz terapijsku dozu lijeka općenito su rijetke nuspojave.

Procjena pojavljivanja nuspojava temelji se na sljedećim parametrima učestalosti:

vrlo često: $\geq 10\%$

često: $\geq 1\% - <10\%$

manje često: $\geq 0,1\% - <1\%$

rijetko: $\geq 0,01\% - <0,1\%$

vrlo rijetko: $< 0,01\%$, uključujući i pojedinačne slučajeve.

Poremećaji imunološkog sustava


Rijetko: Alergijske reakcije.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Rijetko: Kožni osip, koprivnjača.

Poremećaji jetre i žuči

Rijetko: Oštećenje jetre.



Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

Rijetko: Odstupanja u laboratorijskim pokazateljima bubrežne funkcije (porast kreatinina u krvi)

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Zabilježeni su poremećaji u stvaranju krvnih stanica, uključujući manjak krvnih pločica (trombociti) i bijelih krvnih stanica (leukociti), što se može odraziti kao neuobičajena krvarenja ili učestale infekcije.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI LUPOCET

LUPOCET sirup čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

LUPOCET sirup ne smijete upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo naš okoliš.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što LUPOCET sirup sadrži

Djelatna tvar je paracetamol.

Pomoćne tvari: propilenglikol; makrogol; glicerol; sorbitol, tekući, nekristalizirajući; saharinnatrij; karmelozanatrij; natrijev citrat; natrijev benzoat; citratna kiselina hidrat; aroma jagode; aroma maline; boja ponceau 4R (E124); voda, pročišćena.

Kako LUPOCET sirup izgleda i sadržaj pakovanja

LUPOCET sirup je bistra, crvena tekućina karakterističnog mirisa.

LUPOCET sirup se nalazi u smeđoj staklenoj bočici za volumen od 100 ml s polietilenskim (HDPE) zatvaračem.

Ime i adresa nositelja odobrenja/proizvođača lijeka

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima.

Datum revizije upute

Travanj 2010.

