

UPUTA O LIJEKU

Bisolex 8 mg tablete

bromheksinklorid

- **Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke.**
- Ovaj lijek dostupan je bez liječničkog recepta. Ipak, morate ga uzimati oprezno kako biste postigli najbolji učinak.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Nemojte koristiti Bisolex 8 mg tablete dulje od 6 dana bez savjetovanja s liječnikom.
- Obavezno kontaktirajte liječnika ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju tijekom liječenja ili se ne poboljšaju nakon 6 dana.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute:

- 1. Što su Bisolex 8 mg tablete i za što se koriste**
- 2. Prije nego počnete uzimati Bisolex 8 mg tablete**
- 3. Kako uzimati Bisolex 8 mg tablete**
- 4. Moguće nuspojave**
- 5. Kako čuvati Bisolex 8 mg tablete**
- 6. Dodatne informacije**

1. Što su Bisolex 8 mg tablete i za što se koriste

Bisolex tablete sadrže djelatnu tvar bromheksinklorid. Bromheksinklorid je mukolitik – razrjeđuje gustu sluz u dišnim putovima. Bisolex tablete se koriste za simptomatsko liječenje (olakšavanje iskašljavanja) bolesti dišnog sustava popraćenih izlučivanjem guste sluzi (upala dušnika i bronha, upala pluća, kronična opstruktivna bolest pluća, bronhiektazije).

2. Prije nego počnete uzimati Bisolex 8 mg tablete

Nemojte uzimati Bisolex tablete:

- ako ste ikada imali alergijsku reakciju na Bisolex tablete.
- ako ste ikada imali alergijsku reakciju na neki drugi lijek koji sadrži bromheksinklorid.

Budite posebno oprezni s Bisolex tabletama

Budite posebno oprezni s primjenom Bisolex tableta i nemojte ih koristiti bez savjetovanja s liječnikom ili ljekarnikom ako:

- bolujete ili ste bolovali od čira (vrijeda) na želucu i dvanaesniku
- vam se za vrijeme uzimanja Bisolex tableta jave mjehurići na koži i/ili sluznicama
- imate znatno oslabljenu funkciju jetre
- uzimate druge lijekove za ublažavanje kašlja
- vam se jave problemi s probavom ili problemi s noćnim mokrenjem (kod djece).

Tijekom uzimanja Bisolex tableta može se pojačati izlučivanje sluzi u dišnim putovima.

Uzimanje drugih lijekova

Nemojte uzimati Bisolex tablete istovremeno s drugim lijekovima koji olakšavaju iskašljavanje ili lijekovima koji suzbijaju refleks kašlja.

Istovremena primjena Bisolex tableta i nekih lijekova koje koristimo za liječenje bakterijskih infekcija (antibiotici) dovodi do povećane koncentracije antibiotika u plućnom tkivu.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka

Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Prilikom uzimanja ovog lijeka može doći do pojave omaglice. O ovoj nuspojavi se mora voditi računa prilikom upravljanja vozilima i strojevima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, sumnjate na trudnoću ili ako dojite, nemojte uzimati Bisolex tablete bez savjetovanja s liječnikom

3. Kako uzimati Bisolex 8 mg tablete

Bisolex tablete namijenjene su odraslima i djeci starijoj od 10 g.

Preporučena dnevna doza iznosi 3x1 Bisolex tableta do 3x2 Bisolex tablete (1 do 2 Bisolex tablete svakih 8 sati).

Ukupna dnevna doza: 24 - 48 mg.

Tijekom primjene Bisolex tableta treba uzimati puno tekućine.

Bisolex tablete počinju djelovati nakon otprilike pet sati. Kad se oslobađanjem sluzi dišni putovi pročiste, kašalj će se ublažiti i disanje olakšati. Proći će nekoliko dana za postizanje optimalnog učinka. Iz tog razloga ne smije se prebrzo prekinuti uzimanje Bisolex tableta.

Ne prekoračujte preporučenu dozu!

Nemojte koristiti Bisolex tablete dulje od 6 dana bez savjetovanja s liječnikom. Savjet liječnika valja potražiti i ranije ako se simptomi pogoršavaju unatoč primjeni lijeka.

Ako ste uzeli više Bisolex tableta nego što ste trebali

Predoziranje bromheksinom nije zabilježeno. Mogu se očekivati nešto naglašenije nuspojave, prvenstveno mučnina i povraćanje.

Obratite se liječniku ako ste uzeli više Bisolex tableta od preporučene doze.

Ako zaboravite uzeti Bisolex tablete

Bisolex tablete treba uzimati u pravilnim vremenskim razmacima (od oko 8 sati). Ukoliko ste zaboravili uzeti predviđenu dozu – lijek uzmite sa sljedećom predviđenom dozom. Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu!

Ako prestanete uzimati Bisolex tablete

Bisolex tablete namijenjene su olakšavanju iskašljavanja. Ukoliko prestanete uzimati Bisolex tablete jedina moguća posljedica jest da sluz u dišnim putovima ponovno postane gušća i iskašljavanje otežano – ako bolest koja ih uzrokuje nije izliječena.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Bisolex tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi i Bisolex tablete mogu uzrokovati nuspojave.

Nuspojave koje se mogu javiti tijekom liječenja Bisolex tabletama opisane su niže u tekstu i razvrstane su po učestalosti.

Manje česte nuspojave (javljaju se u više od 1 na 1000, ali u manje od 1 na 100 bolesnika)

- bol u trbuhu, mučnina, povraćanje i proljev

Rijetke nuspojave (javljaju se u više od 1 na 10 000, ali u manje od 1 na 1000 bolesnika)

- preosjetljivost na lijek
- osip.

Nuspojave kod kojih se na temelju dostupnih podataka ne može procijeniti učestalost

- alergijske reakcije (svrbež i crvenilo kože, otečenost sluznica, otežano disanje).
- glavobolja, omaglica.
- suženje bronha (bronhospazam).
- žgaravica.
- angioedem (oticanje vjeđa, lica i usana), sitnotočkasti osip na koži (uritikarija-koprivnjača), svrbež, pojačano znojenje.
- povišene vrijednosti jetrenih enzima

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika

5. Kako čuvati Bisolex 8 mg tablete

Bisolex tablete morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece!

Bisolex tablete treba čuvati ,na temperaturi ispod 25 °C, zaštićeno od svjetlosti.

Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti označenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Bisolex 8 mg tablete sadrže

Djelatna tvar je bromheksinklorid

1 tableta sadrži 8 mg bromheksinklorida.

Bisolex tablete sadrže i sljedeće pomoćne tvari: laktoza; kukuruzni škrob; želatina; magnezijev stearat; talk.

Kako Bisolex 8 mg tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Bisolex 8 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete.

Dostupne su u pakovanju od 20 (2x10) tableta u blisteru, u kutiji

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:



PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka:



PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Datum revizije upute :

Svibanj, 2013.