

Uputa o lijeku

Maxflu okus limuna

paracetamol, pseudoefedrin, askorbatna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalaz u ovoj uputi:

- 1. Što je Maxflu i za što se koristi**
- 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Maxflu**
- 3. Kako uzimati Maxflu**
- 4. Moguće nuspojave**
- 5. Kako čuvati Maxflu**
- 6. Dodatne informacije**

1. Što je Maxflu i za što se koristi

Maxflu je kombinirani pripravak, koji sadrži tri djelatna sastojka: paracetamol, pseudoefedrin i vitamin C (askorbatna kiselina).

Maxflu djeluje protiv boli i povišene tjelesne temperature, a ima i blago protuupalno djelovanje (paracetamol). Smanjuje prokrvljenost i oteknuće sluznice nosa i sinusa (pseudoefedrin), te olakšava disanje. Vitamin C zadovoljava povećane potrebe organizma za tim vitaminom tijekom prehlade i gripe.

Djelovanje započinje oko pola sata nakon uzimanja lijeka i traje četiri do šest sati.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Maxflu

Nemojte uzimati Maxflu:

- Ako ste imali alergijsku reakciju na neki od sastojaka Maxflu šumećih tableta

- Ako imate teške bolesti jetre (akutne ili aktivne kronične upale jetre, teško zatajenja jetre)
- Ako imate jako visoki tlak
- Ako imate smanjeni protok (začepljenje) kroz krvne žile srca (koronarna bolest srca)
- Uzimate li ili ste do prije dva tjedna uzimali neke od lijekova za liječenje depresije (antidepresive iz skupine monoaminooksidaza, npr. moklobemid)

Upozorenja i mjere opreza

Posavjetujte se s liječnikom o uporabi Maxflu šumećih tableta u slučajevima:

- Oslabljene funkcije bubrega
- Oslabljene funkcije jetre
- Gilbertova sindroma (nasljedni poremećaj metabolizma bilirubina karakteriziran žuticom)
- Kamenaca u mokraći (oksalatna urolitijaza)
- Raznih vrsta anemija i nedostatka željeza (talasemija, hemokromatoza, sideroblastična anemija)
- Tumora srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom)
- Alkoholizma
- Začepljenja žučnih vodova i izlaza mokraćnog mjehura kamencima
- Glaukoma i drugih stanja s povećanim očnim tlakom
- Ulkusa želuca ili dvanaesnika
- Ubrzanog rada štitnjače (hipertireoza)
- Bolesti perifernih krvnih žila
- Povećane prostate (benigna hipertrofija prostate – BHP)
- Poremećaja srčanog ritma (srčane aritmije)

Maxflu se ne smije uzimati duže od 7 dana za redom. U slučaju visoke temperature koja traje duže od 3 dana, pogoršavanja simptoma ili dodatnih komplikacija, obvezno se treba obratiti liječniku.

Općenito, bez konzultiranja liječnika ili stomatologa, lijekove koji sadrže paracetamol ne treba uzimati dulje od nekoliko dana niti se smiju uzimati doze veće od preporučenih.

Ako konzumirate alkohol ili bolujete od alkoholnog oštećenja jetre ne biste smjeli uzimati lijekove koji sadrže paracetamol, te u tom slučaju trebate se posavjetovati sa liječnikom.

Maxflu nije predviđen za liječenje djece mlađe od 12 godina.

Drugi lijekovi i Maxflu šumeće tablete

Recite svom liječniku ako uzimate neke druge lijekove, bilo da Vam ih je propisao liječnik ili ste ih nabavili sami. Kod kombinacije s drugim lijekovima može doći do njihovog međudjelovanja (interakcija), stoga može biti potrebno dozu Maxflu šumećih tableta prilagoditi ovisno o potrebama.

Maxflu može stupiti u interakcije sa sljedećim lijekovima:

- Lijekovi koji usporavaju pražnjenje probavnog sustava, npr. propantelin i metoklopramid.
- Zidovudin – lijek koji se koristi u liječenju HIV infekcije
- Probenecid – lijek koji se koristi u liječenju gihta (ulozi).
- Salicilamidi – lijekovi koji se koriste u liječenju boli i povišene temperature
- Lijekovi koji se koriste u liječenju epilepsije (npr. barbiturati)
- Varfarin – lijek koji se koristi u sprečavanju zgrušavanja krvi
- Kolestiramin – lijek koji se koristi u liječenju povišenih razina kolesterola
- Kloramfenikol – lijek koji se koristi u liječenju bakterijskih infekcija
- Lijekovi koji se koriste u liječenju povišenog krvnog tlaka (npr. bretilijum, betadin, gvanetid...))
- Lijekovi koji se koriste u liječenju depresije (triciklički antidepresivi)
- Lijekovi koji smanjuju apetit i psihostimulansi (npr. amfetamin)
- Nitrati – lijekovi koji se koriste u liječenju angine pectoris
- Glikozidi digitalisa – lijekovi koji se koriste u liječenju zatajenja srca
- Ergot alkaloidi – lijekovi koji se koriste u liječenju glavobolje (npr. ergotamin, bromokriptin)
- Hipoglikemici – lijekovi koji se koriste u liječenju šećerne bolesti
- Preparati željeza
- Hormonska nadomjesna terapija – preparati estrogena

Maksflu šumeće tablete mogu promijeniti rezultate nekih pretraga (npr. šećer u krvi, jetrene enzime, željezo u krvi....)

Trudnoća, dojenje i plodnost

Maxflu se ne preporuča uzimati za vrijeme trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i rad na strojevima

Maxflu zbog pseudoefedrina može izazvati vrtoglavicu. Ako osjetite vrtoglavicu trebali bi izbjegavati upravljanje vozilima i strojevima ili slične aktivnosti.

Važni podaci o nekim pomoćnim tvarima u Maxflu šumećim tabletama

Maxflu šumeće tablete sadrže laktozu i sorbitol. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Maxflu šumeće tablete sadrže izvor fenilalanina (aspartam). Mogu naštetiti osobama koje boluju od fenilketonurije.

3. Kako uzimati Maxflu

Preporučena doza za odrasle i djecu stariju od 12 godina je 1 do 2 šumeće tablete do 4 puta na dan, prema potrebi koliko traju simptomi ali ne duže od 7 dana.

Maksimalna dopuštena dnevna količina Maxflu šumećih tableta za osobe iznad 50 kg tjelesne težine je 8 šumećih tableta.

Način primjene

Jednu do dvije šumeće tablete valja otopiti u čaši vode i popiti svježe pripravljenu otopinu.

Maksimalne dopuštene doze paracetamola su sljedeće:

- Za odrasle (tjelesna težina > 50 kg): maksimalno 1 g (1000 mg) po dozi, odnosno maksimalno 4 g (4000 mg) na dan.
- Za djecu stariju od 12 god (tjelesna težina < 50 kg): maksimalno 15 mg/kg po dozi, odnosno maksimalno 75 mg/kg na dan

Maksimalna dopuštena dnevna doza pseudoefedrina za odrasle i djecu stariju od 12 godina je 240 mg.

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina.

Ako uzmete više Maxflu šumećih tableta nego što ste trebali

U slučaju prekoračenja doze potrebno je hitno javiti se liječniku.

Simptomi predoziranja paracetamolom tijekom rane faze predoziranja mogu biti ograničeni na mučninu ili povraćanje i ne moraju biti pokazatelj težine predoziranja ili rizika od oštećenja organa. Stoga se u slučaju prekoračenja doze javite liječniku čak i ukoliko se osjećate dobro.

Simptomi predoziranja pseudoefedrinom najčešće su blaga tjeskoba, lupanje srca i blago povišenje krvnog tlaka. Simptomi se obično javljaju 4 do 8 sati nakon uzimanja lijeka, prolazni su i najčešće ne zahtijevaju liječenje.

Zbog malog sadržaja u Maxflu šumećim tabletama, predoziranje vitaminom C je teško moguće.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Osjetite li bilo koju od niže nabrojanih nuspojava prekinite uzimati lijek i odmah obavijestite svog liječnika ili se javite hitnoj službi u najbližoj bolnici.

- alergijske reakcije (otežano disanje, osjećaj gušenja, natečenost usnica, jezika, kapaka i lica; nespecifični osip, urtikarija, eritem)

Tijekom uzimanja Maxflu šumećih tableta također su prijavljene i sljedeće nuspojave;

- Drhtanje, glavobolja, vrtoglavica, napetost u mišićima, pojačana osjetljivost na svjetlo.
- Nemir, nesanica, uznemirenost.
- Mučnina, povraćanje.
- Pojačano znojenje.
- Slabost.
- Niska razina šećera u krvi.
- Bol u prsima (angina pectoris), nepravilan rad srca (aritmije)
- Produženo krvarenje, pojava modrica.
- Povišen očni tlak.

- Oštećenje jetrene funkcije karakterizirano simptomima poput žutila kože i bjeloočnica te boli i nelagode u trbuhu.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Maxflu

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece!

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C, radi zaštite od vlage.

Maxflu šumeće tablete ne koristite nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Maxflu šumeće tablete sadrže

- Jedna šumeća tableta sadrži 500 mg paracetamola, 30 mg pseudoefedrinklorida i 60 mg askorbatne kiseline (vitamin C)
- Maxflu šumeće tablete sadrže i sljedeće pomoćne tvari: citratna kiselina, bezvodna; natrijev hidrogenkarbonat; povidon; natrijev dokuzat; natrijev karbonat, bezvodni; sorbitol; aspartam; laktoza hidrat; makrogol 6000; natrijev benzoat (E 211); natrijev riboflavinofosfat (E 101); aroma limun.

Kako Maxflu šumeće tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

Maxflu šumeće tablete su okrugle, žućkaste ili bijele do svijetloružičaste ravne tablete, kosih rubova.

Maxflu šumeće tablete su dostupne u pakovanju od po 10 (1 x 10) i po 20 (2 x 10) šumećih tableta u plastičnoj tubi (fioli), u kutiji.

Nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:



PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka



PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni

Datum revizije upute :

Prosinac, 2012.