

UPUTA O LIJEKU

Plibex filmom obložene tablete

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke:

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek namijenjen samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Plibex filmom obložene tablete i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Plibex filmom obložene tablete
3. Kako uzimati Plibex filmom obložene tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Plibex filmom obložene tablete
6. Dodatne informacije

1. ŠTO SU PLIBEX FILMOM OBLOŽENE TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE

Plibex filmom obložene tablete su vitaminski pripravak koji sadrži vitamine B skupine, a primjenjuje se za prevenciju ili liječenje stanja u kojima postoji nedostatak ili pomanjkanje vitamina B (avitaminoza ili hipovitaminoza).

Prevencija hipovitaminoze

- u stanjima s povećanom potrebom za vitaminima skupine B
- zbog nedovoljnog unosa vitamina skupine B (parenteralna prehrana, dijeta, gubitak apetita)
- zbog poremećene apsorpcije i iskorištavanja vitamina skupine B (povraćanje, proljev, upale probavnog sustava (gastritis, enteritis), sprue, resekcija želuca, bolesti jetre

- zbog liječenja nekim lijekovima (antibakterijski lijekovi, kemoterapeutici, citostatici, antikonvulzivi, oralni kontraceptivi)

Liječenje hipovitaminoze i avitaminoze u slijedećim stanjima:

- beriberi, ariboflavinoza, pelagra;
- bolesti kože;
- upale živca (neuritis, neuralgija, polineuritis);
- nedostatak vitamina u kroničnih alkoholičara.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI PLIBEX FILMOM OBLOŽENE TABLETE

Plibex filmom obložene tablete nemojte uzimati ako ste preosjetljivi (alergični) na jednu od djelatnih tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Plibex filmom obložene tablete ako:

- uzimate lijek levodopu za liječenje Parkinsonove bolesti jer istovremeno uzimanje Plibex filmom obloženih tableta može umanjiti djelovanje lijeka;
- konzumirate alkohol;
- uzimate imunosupresive, cikloserin, izoniazid, penicilamin, etionamid, hidralazin i oralne kontraceptive jer potreba za vitaminima skupine B može biti povećana;
- uzimate neomicin, kolhicin, para-aminosalicilatnu kiselinu, cimetidin, pripravke kalija ili kloramfenikol jer mogu ometati učinkovitost Plibex filmom obloženih tableta.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Trudnice i dojilje smiju uzimati Plibex filmom obložene tablete u preporučenim dozama.

Upravljanje vozilima i strojevima

Plibex filmom obložene tablete nemaju utjecaja na upravljanje vozilima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Plibex filmom obloženih tableta

Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. KAKO UZIMATI PLIBEX FILMOM OBLOŽENE TABLETE

Plibex filmom obložene tablete treba progutati cijele s tekućinom.

Za prevenciju hipovitaminoze (nedostatka ili pomanjkanja vitamina B skupine) uzima se 1 tableta na dan, a za liječenje 1 do 2 tablete 2 do 3 puta na dan.

Navedene doze se ne smiju prekoračiti.

Ako uzmete više Plibex filmom obloženih tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli više lijeka nego što ste trebali, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Mogući su poremećaji u probavnom sustavu, a uzimanje većih doza tijekom duljeg vremena rijetko može izazvati poremećaje živčanog sustava.

Ako ste zaboravili uzeti Plibex filmom obložene tablete

Zaboravite li uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Potom tablete nastavite uzimati kao i prije. Ako se već približilo vrijeme za uzimanje iduće doze, zaboravite na onu propuštenu. Uzmite iduću dozu u uobičajeno vrijeme i lijek nastavite uzimati prema rasporedu. Nemojte udvostručiti dozu kako biste nadoknadili onu propuštenu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Plibex tablete mogu uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave Plibex filmom obloženih tableta su vrlo rijetke. Mogu se javiti reakcije preosjetljivosti na neki od sastojaka lijeka te crvenilo.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI PLIBEX FILMOM OBLOŽENE TABLETE

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C, na suhom mjestu.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što Plibex filmom obložene tablete sadrže

Djelatna tvar su vitamini B skupine.

Jedna Plibex filmom obložena tableta sadrži: 25 mg nikotinamida, 5 mg tiaminklorida, 5 mg riboflavina, 5 mg kalcijevog pantotenata, 2 mg piridoksinklorida, 1 mikrogram cijanokobalamina

Plibex filmom obložene tablete također sadrže i sljedeće pomoćne tvari: laktozu; povidon; želatinu; kukuruzni škrob; talk; magnezijev stearat; hipromelozu; makrogol 6000 i boje eritrozina (E 127) i željezov oksid, žuti (E 172).

Kako Plibex filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Plibex filmom obložena tableta je crvena, okrugla, bikonveksna filmom obložena tableta. Jezgra filmom obložene tablete je žuto-narančaste boje.

Plibex filmom obložene tablete su dostupne u pakovanju od 30 odnosno 60 filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet

PLIVA HRVATSKA, d.o.o.

Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 25

Ime i adresa proizvođača lijeka

PLIVA HRVATSKA, d.o.o.

Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 25

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Datum revizije upute:

Srpanj 2015.