

## Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

### Plicet Forte 1000 mg tablete *paracetamol*

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

#### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što su Plicet Forte tablete i za što se koriste?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Plicet Forte tablete?
3. Kako uzimati Plicet Forte tablete?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Plicet Forte tablete?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### **1. Što su Plicet Forte tablete i za što se koriste?**

Plicet Forte tablete sadrže paracetamol koji ima izraženo djelovanje protiv boli i povišene tjelesne temperature.

Plicet Forte tablete namijenjene su za ublažavanje blagih do umjerenih boli te za snižavanje povišene tjelesne temperature. Mogu se koristiti u mnogim stanjima kao što su glavobolja, zubobolja, grlobolja, obična prehlada i gripa, bolovi u leđima, reumatski i mišićni bolovi, kod bolnih menstruacija (dismenoreja) te boli u području živca (neuralgija).

Plicet Forte tablete se također preporučuju za ublažavanje boli kod blažeg oblika upale zglobova (artritisa).

#### **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Plicet Forte tablete?**

##### **Nemojte uzimati Plicet Forte tablete:**

- ako ste alergični na paracetamol ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako uzimate druge lijekove koji sadrže paracetamol
- ako ste mlađi od 12 godina

##### **Upozorenja i mjere opreza**

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Plicet Forte tablete:

- ako imate problema s jetrom ili bubrežima, uključujući i alkoholnu bolest jetre
- ako patite od blagog artritisa i morate svakodnevno uzimati lijekove protiv boli
- ako konzumirate veće količine alkohola svaki dan

##### **Djeca**

Plicet Forte tablete nisu namijenjene za primjenu kod djece mlađe od 12 godina.

##### **Drugi lijekovi i Plicet Forte tablete**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

To je osobito važno ako uzimate metoklopramid ili domperidon (protiv mučnine i povraćanja); kolestiramin (za snižavanje kolesterola u krvi); zidovudin (antivirusni lijek); barbiturate (koriste se kao antiepileptici: karbamazepin, feniton, fenobarbital, lijekovi za smirenje ili uspavljivanje); probenecid (za liječenje gihta); tricikličke antidepresive.

Ako uzimate lijekove za razrjeđivanje krvi (antikoagulanse) kao što je varfarin, a svakodnevno trebate uzimati lijekove za ublažavanje boli, posavjetujte se sa svojim liječnikom jer postoji rizik od krvarenja. Ipak, povremena primjena Plicet Forte tableta nema značajan učinak i možete ga uzimati i ako uzimate lijekove za razrjeđivanje krvi.

Plicet Forte tablete nemojte istodobno uzimati s ostalim lijekovima koji sadrže djelatnu tvar paracetamol.

U slučaju predoziranja potrebno je odmah se javiti liječniku, jer može doći do teškog oštećenja jetre.

### **Plicet Forte tablete s hranom i pićem**

Plicet Forte tablete možete uzimati neovisno o obroku.

Tijekom uzimanja Plicet Forte tableta ne biste smjeli piti alkohol zbog povećane opasnosti od oštećenja jetre i želučanog krvarenja.

### **Trudnoća i dojenje**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Plicet Forte tablete se, nakon savjetovanja s liječnikom, mogu u preporučenim terapijskim dozama primjenjivati tijekom cijele trudnoće.

Dojilje smiju uzimati ovaj lijek u preporučenim terapijskim dozama, nakon savjetovanja s liječnikom.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Nema podataka o utjecaju Plicet Forte tableta na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

## **3. Kako uzimati Plicet Forte tablete?**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Lijek je namijenjen za primjenu kroz usta. Tabletu treba popiti s čašom vode.

Plicet Forte tableta može se podijeliti na jednake polovice.

Preporučena pojedinačna doza za **odrasle i djecu stariju od 12 godina** je 500 mg do 1000 mg paracetamola 3-4 puta dnevno, prema potrebi.

Razmak između pojedinih doza ovisi o simptomima i najvišoj dnevnoj dozi, no ne smije biti kraći od 4 sata. U 24 sata se ne smiju dati više od 4 doze (4 tablete), odnosno 4000 mg paracetamola.

Ne uzimajte dozu veću od one navedene u ovoj uputi.

Ako se simptomi pogoršaju ili potraju dulje od 3 dana, odnosno ako imate povišenu tjelesnu temperaturu, savjetujte se s liječnikom.

### **Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega /ili jetre**

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega te oni s oštećenjem funkcije jetre moraju potražiti savjet liječnika prije uzimanja paracetamola.

Morate se javiti svom liječniku ako se simptomi pogoršavaju ili potraju dulje od 3 dana.

### **Ako uzmete više Plicet Forte tableta nego što ste trebali**

U slučaju predoziranja morate **hitno zatražiti savjet liječnika** čak i ako se budete osjećali dobro jer postoji opasnost od odgođenog, jakog oštećenja jetre.

Simptomi predoziranja paracetamolom u prva 24 sata su bljedilo, mučnina, povraćanje, gubitak apetita i bol u trbuhu. Simptomi mogu biti ograničeni na mučninu i povraćanje i ne moraju odražavati težinu predoziranja ni rizik od oštećenja organa.

Opasnost od trovanja osobito je velika kod starijih osoba, male djece, osoba s oštećenjem jetre, kroničnih alkoholičara, kronično pothranjenih osoba i kod istodobnog uzimanja nekih od lijekova ranije nabrojenih pod točkom 2. u odlomku Uzimanje drugih lijekova s Plicet Forte tabletama.

Potraju li simptomi ili ako vaša glavobolja potraje, **posavjetujte se s liječnikom.**

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

#### 4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

**Prestanite uzimati lijek i javite odmah svom liječniku** ako dobijete:

- **alergijsku reakciju** kao što je osip i svrbež, ponekad udružen s problemima s disanjem ili oteklinom usana, jezika, grla ili lica te nedostatkom zraka
- **kožni osip ili ljuštenje kože** što može biti popraćeno s **oštećenjem sluznice usne šupljine**. Prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija.
- **probleme s disanjem**. Ovi simptomi su vjerojatniji ako ste prije imali iste simptome pri uzimanju drugih lijekova protiv bolova kao što su acetilsalicilatna kiselina ili drugi nesteroidni protuupalni lijek (npr. ibuprofen)
- neobjašnjive **masnice ili krvarenja**
- **mučninu**, nagli **gubitak tjelesne težine**, **gubitak apetita** i **žutilo očiju i kože**
- krvni poremećaji (trombocitopenija, agranulocitoza)

Ove nuspojave se javljaju vrlo rijetko.

#### Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

#### 5. Kako čuvati Plicet Forte tablete?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Nema posebnih uvjeta čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

#### 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

##### Što Plicet Forte tablete sadrže?

- Djelatna tvar je paracetamol. Svaka tableta sadrži 1000 mg paracetamola.
- Pomoćne tvari: natrijev škroboglikolat, vrste A; povidon K30; kukuruzni škrob, prethodno geliran; stearatna kiselina (E570)

##### Kako Plicet Forte tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Plicet Forte 1000 mg tablete su bijele do gotovo bijele tablete oblika kapsule, s razdjelnim urezom između oznaka „10“ i „00“ na jednoj strani te razdjelnim urezom između oznaka „PA“ i „RA“ na drugoj strani tablete. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Plicet Forte 1000 mg tablete dostupne su u pakiranju od 10 tableta u blisteru, u kutiji.

**Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

PLIVA Hrvatska d.o.o.  
Prilaz baruna Filipovića 25  
10 000 Zagreb, Hrvatska

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni

**Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2015.**