

UPUTA O LIJEKU

Plivadon tablete

paracetamol, propifenazon, kofein, kodeinfosfat hemihidrat

Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate cijelu uputu.

Uputu sačuvajte jer ćete je možda trebati ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne informacije o lijeku Plivadon tablete. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ovaj lijek se smije upotrebljavati samo za kratkotrajno liječenje akutne, umjerene boli koja se ne smanjuje primjenom samog paracetamola, ibuprofena ili acetilsalicilatne kiseline.

- Ovaj lijek smijete uzimati samo tijekom 3 dana za redom. Ako Vam se simptomi ne smanjuju, posavjetujete se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.
- Lijek sadrži kodein koji može uzrokovati ovisnost ako ga uzimate dulje od 3 dana za redom. Stoga, možete imati simptome ustezanja kada prestanete uzimati lijek.
- Ako uzimate lijek zbog glavobolje dulje od 3 dana za redom, glavobolje se mogu pogoršati.

Sadržaj upute:

- 1. Što su Plivadon tablete i za što se koriste**
- 2. Prije nego počnete uzimati Plivadon tablete**
- 3. Kako uzimati Plivadon tablete**
- 4. Moguće nuspojave**
- 5. Kako čuvati Plivadon tablete**
- 6. Dodatne informacije**

1. ŠTO SU PLIVADON TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE

Plivadon tablete sadrže četiri djelatne tvari: paracetamol, propifenazon, kofein, kodeinfosfat hemihidrat.

Plivadon tablete se upotrebljavaju samo za kratkotrajno liječenje akutne, umjerene boli koja se ne smanjuje primjenom samog paracetamola, ibuprofena ili acetilsalicilatne kiseline.

2. PRIJE NEGOTEGO POČNETE UZIMATI PLIVADON TABLETE

Plivadon tablete sadrže kodein koji može uzrokovati ovisnost ako ga uzimate kontinuirano dulje od 3 dana za redom. Stoga, možete imati simptome ustezanja kada prestanete uzimati lijek.

Ako uzimate lijek zbog glavobolje dulje od 3 dana za redom, glavobolje se mogu pogoršati.

Lijekovi koji sadrže kodein mogu uzrokovati pozitivni rezultat anti-doping testa.

Nemojte uzimati Plivadon tablete:

- ako ste alergični na paracetamol, propifenazon, kofein, kodein, opiodne analgetike ili na bilo koju od pomoćnih tvari lijeka.
- ako uzimate druge lijekove koji također sadrže paracetamol, propifenazon, kofein ili kodein.
- ako imate teško oštećenje bubrežne i jetrene funkcije.
- ako imate akutnu intermitentnu porfiriju ili nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, što su rijetki, nasljedni, metabolički poremećaji.
- ako imate zastoj stolice i vjetrova zbog nemogućnosti nesmetanog prolaza kroz tanko ili debelo crijevo zbog prestanka crijevne peristaltike
- ako dojite.

Budite posebno oprezni s Plivadon tabletama:

- ako imate oslabljenu bubrežnu ili jetrenu funkciju.
- ako imate oslabljenu funkciju dišnog sustava.
- ukoliko bolujete od bolesti crijeva, uključujući opstrukciju crijeva.
- ako ste imali operaciju žući.
- ako imate poremećaje krvi.
- ukoliko se javi smanjenje broja bijelih krvnih stanica (simptomi uključuju povišenu tjelesnu temperaturu, upalu grla, ulceracije i čireve u ustima, apceze u analnom području), primjenu lijeka treba odmah prekinuti i savjetovati se s liječnikom.

Uzimanje drugih lijekova s Plivadon tabletama

Obavijestite liječnika ili ljekarnika o lijekovima koje uzimate ili ih namjeravate uzimati, uključujući i one koje nabavljate bez recepta.

To je osobito važno ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

- hipnotici (lijekovi koji izazivaju san) ili anksiolitici (lijekovi za liječenje tjeskobe)
- stimulansi središnjeg živčanog sustava
- MAO inhibitori (lijekovi za liječenje depresije)
- lijekovi koji sadrže kofein ili paracetamol
- metoklopramid i domperidon (za liječenje probavnih smetnji)
- kolestiramin (lijek za snižavanje razine kolesterola)
- lijekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi - oralni antikoagulansi (npr. varfarin);
- nesteroidni protupalni lijekovi (za sniženje povišene tjelesne temperature, ublažavanje boli i upale)
- cimetidin (za liječenje čira na želucu).

Uzimanje hrane i pića

Tijekom primjene lijeka izbjegavajte alkoholna pića i napitke koji sadrže kofein.

Trudnoća i dojenje

Savjetujte se s liječnikom prije primjene bilo kojeg lijeka.

- Ne preporuča se primjena Plivadon tableta tijekom trudnoće, osobito u prvom tromjesečju i u zadnjih 6 tjedana trudnoće
- Primjenu Plivadon tableta treba izbjegavati i tijekom porođaja zbog opasnosti od nastanka respiratorne depresije kod novorođenčadi.
- **Plivadon tablete se ne smiju koristiti za vrijeme dojenja.**

Upravljanje vozilima i strojevima

Savjetuje se da ne upravljaljte vozilima ili strojevima ako osjećate omaglicu ili sediranost.

3. KAKO UZIMATI PLIVADON TABLETE

Ne uzimajte lijek dulje od 3 dana za redom. Ako Vam se simptomi ne smanjuju, morate se obratiti svom liječniku ili ljekarniku.

Plivadon tablete treba popiti s čašom vode.

Odrasli: 1-2 tablete najviše tri puta na dan.

Najveća dnevna doza je 6 tableta. Interval između dvije primjene lijeka: 4-6 sati.

Uporaba lijeka ograničena je na 3 dana za redom.

Primjena u djece: Lijek nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 18 godina.

Ako uzmete više Plivadon tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli više od preporučene doze, odmah zatražite medicinsku pomoć.

U slučaju predoziranja svaki sastojak lijeka može uzrokovati specifične simptome. Zbog prisutnosti paracetamola predoziranje može dovesti do teškog oštećenja jetre i ponekad do oštećenja bubrega. Neophodna je hitna hospitalizacija i liječenje. Lijek izbora kod predoziranja je N-acetilcistein.

Ako prestanete uzimati Plivadon tablete

Ovaj lijek sadrži kodein koji može uzrokovati ovisnost ako ga uzimate dulje od 3 dana za redom.

Stoga, možete imati simptome ustezanja kada prestanete uzimati lijek. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako mislite da imate simptome ustezanja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Plivadon tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi i Plivadon tablete mogu izazvati nuspojave.

Prestanite uzimati lijek i javite se odmah liječniku:

- ako osjetite jaku bol u trbuhu, mučninu i povraćate, a nedavno ste bili na operaciji žuči.
- ako se javi alergijska reakcija koja može biti teška i uključivati svrbež i crvenilo, ponekad s otokom usta i lica te poremećajima u disanju.
- ako primijetite crvenilo kože ili guljenje kože ili čireve u ustima.
- ako osjetite probleme s disanjem što je vjerojatnije ukoliko ste već imali sličnih problema kada ste uzimali druge lijekove protiv боли kao što su acetilsalicilatna kiselina i ibuprofen.
- ako imate neobjašnjive modrice ili krvarenje.
- ako se javi mučnina, iznenadni gubitak tjelesne težine i apetita te ako primijetite žutilo kože i očiju.

Također, dok koristite Plivadon tablete možete dobiti zatvor.

Ako uzimate lijek prema uputi, malo je vjerojatno da ćete razviti ovisnost o lijeku. Ukoliko se nešto od niže navedenog odnosi na Vas, važno je da se obratite svom liječniku:

- ako imate potrebu uzimati lijek tijekom duljeg razdoblja;
- ako imate potrebu uzimati lijek u većoj dozi od preporučene;
- ako se osjećate loše kada prestanete uzimati lijek te se osjećate bolje kada ga ponovno počnete uzimati.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI PLIVADON TABLETE

Plivadon tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati pri temperaturi do 25 °C.

Plivadon tablete se ne smiju upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što Plivadon tablete sadrže

- Djelatne tvari Plivadon tableta su paracetamol, propifenazon, kodeinfosfat hemihidrat i kofein.
Svaka Plivadon tableta sadrži 210 mg paracetamola, 250 mg propifenazona, 10 mg kodeinfosfat hemihidrata i 25 mg kofeina.
- Pomoćne tvari: poliakrilat, 40 postotna raspršina; kopovidon; povidon; celuloza, mikrokristalična; karmelozanatrij, umrežena; škrob, prethodno geliran; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; talk; magnezijev stearat; hidrogenizirano biljno ulje, vrste I

Kako Plivadon tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

- Plivadon tablete su bijele do skoro bijele, okrugle bikonveksne tablete, s natpisom PLIVADON na jednoj strani i razdjelnim urezom na drugoj strani tablete.
- Plivadon tablete dostupne su u pakovanju od 10 tableta u narančastom blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet



PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka



PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni.

Datum revizije upute :

Listopad, 2012.