

UPUTA O LIJEKU

CARBOMED 150 mg tablete *aktivirani ugljen*

Molim vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete koristiti ovaj lijek.

- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.
- Ako imate još pitanja, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
- Ovaj lijek dostupan je bez recepta za liječenje blažih bolesti za koje nije potrebna liječnička pomoć.
- Ako primjetite bilo koju nuspojavu obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika.

Uputa sadrži:

1. Što su Carbomed tablete i za što se koriste
2. Prije nego počnete koristiti Carbomed tablete
3. Kako koristiti Carbomed tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Carbomed tablete
6. Dodatne informacije

1. Što su Carbomed tablete i za što se koriste

Aktivni medicinski ugljen nespecifičan je intestinalni adsorbens.

Primjenjuje se u stanjima:

- proljeva
- napuhnutosti.

Uz liječenje akutnog trovanja preporučuje se rektalno ili oralno primijeniti laksativ (natrij sulfat ili magnezij sulfat).

2. Prije nego počnete koristiti Carbomed tablete

Nemojte koristiti Carbomed tablete

- ako ste alergični na aktivni medicinski ugljen;
- ako postoji mogućnost peroralne primjene specifičnoga antidota.

Budite oprezni s lijekom Carbomed tablete

Posavjetujte se s liječnikom ako imate neku od kroničnih bolesti, metabolički poremećaj, ako ste alergični ili uzimate još neke lijekove.

Osoba kojoj dajemo suspenziju aktivnoga medicinskog ugljena mora biti pri svijesti. Tijekom primjene treba paziti da ne dođe do udisanja čestica aktivnog ugljena.

Dugotrajna terapija aktivnim medicinskim ugljenom može izazvati probavne poremećaje zbog adsorpcije enzima i vitamina iz hrane.

Aktivni medicinski ugljen može otežati otkrivanje patogenih parazita u probavnom sustavu pa u slučaju sumnje na parazitima uzrokovan proljev valja prije liječenja aktivnim medicinskim ugljenom pregledati stolicu.

Žene koje primjenjuju oralne kontraceptive, u doba uzimanja aktivnoga medicinskog ugljena preporučuje se primjena drugih oblika zaštite od začeća.

U slučaju akutne dizenterije s krvavom stolicom i povišenom temperaturom primjerenije je umjesto aktivnoga medicinskog ugljena primijeniti odgovarajući antibiotik.

Primjena aktivnoga medicinskog ugljena ne preporučuje se u slučajevima trovanja mineralnim kiselinama ili lužinama, sredstvima za pranje, odnosno solima teških metala, metanolom, etanolom, etilen glikolom, jer za navedene tvari aktivni medicinski ugljen ima mali adsorptivni kapacitet.

Treba imati na umu da će prisutnost medicinskog ugljena u probavnom sustavu ometati eventualnu potrebu za hitnom pretragom (endoskopijom).

U slučaju da uzeti otrov ima svojstva diuretika ili je uzet s alkoholom, nakon primjene medicinskog ugljena preporučuje se uzeti veću količinu tekućine (vode).

Carbomed tablete sadrže laktozu.

Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošljivosti galaktoze, Lapp sindromom ili glukoza-galaktoza malapsorpcijom ne smiju koristiti ovaj lijek.

Korištenje drugih lijekova s Carbomed tabletama

Prije početka primjene Carbomed tableta, potrebno je obavijestiti svoga liječnika ili ljekarnika ako koristite neke druge lijekove.

Aktivni medicinski ugljen smanjuje učinak većine istodobno oralno primijenjenih lijekova. Uzrok je tomu njihovo vezanje na čestice ugljena. Zbog toga, pri istodobnoj primjeni trebate paziti da razmak između njihova uzimanja bude **najmanje dva sata**.

Usporedno liječenje aktivnim medicinskim ugljenom i lijekom koji izaziva povraćanje (emetik) ili protuotrovom smanjuje djelovanje emetika ili protuotrova.

Istodobna primjena sorbitola i aktivnoga medicinskog ugljena može dovesti do dehidracije. Mlijeko, sladoled i slični proizvodi smanjuju djelovanje aktivnoga medicinskog ugljena.

Trudnoća i dojenje

U trudnica i dojilja nisu zabilježeni problemi vezani uz primjenu aktivnoga medicinskog ugljena. Medicinski ugljen se ne resorbira iz probavnog trakta.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Aktivni medicinski ugljen ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako koristiti Carbomed tablete

Poštujte navedene upute!

Proljev i napuhnutost

Ako nije drugačije propisano, treba uzeti 4-7 tableta aktivnoga medicinskog ugljena, 3-4 puta na dan nakon jela. Aktivni medicinski ugljen u slučaju proljeva treba uzimati tako dugo dok se stolica ne normalizira, ali najdulje 4 dana. U slučaju napuhnutosti aktivni medicinski ugljen može se uzimati do 7 dana. Ako ne dođe do poboljšanja treba se javiti liječniku.

Tablete treba razmrviti u čaši (200 ml) vode ili čaja. Lijek ne otapati i/ili piti s mlijekom.

Djeca

Djeca starija od tri godine uzimaju 2-4 tablete, 1-2 puta na dan.

Ne preporučuje se davanje aktivnoga medicinskog ugljena djeci mlađoj od tri godine.

Ako uzmete više Carbomed tableta nego što ste trebali

S obzirom na mehanizam djelovanja medicinskog ugljena nema opasnosti od predoziranja.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi ostali lijekovi i Carbomed tablete mogu dovesti do nuspojava.

Aktivni medicinski ugljen boji stolicu u crno.

Manje česte nuspojave (u 0,1% ili više bolesnika, ali manje od 1%)

- opstipacija.

Rijetke nuspojave (u 0,01% ili više bolesnika, ali manje od 0,1%)

- povraćanje, bol u trbuhu
- hipokalemija, acidoza
- dispnea, poremećaj disanja s insuficijencijom, plućne infiltracije, aspiracija
- blagi nadražaj kože i/ili sluznice, alergijska reakcija
- groznica, stupor.

O svakoj nuspojavi potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Carbomed tablete

Carbomed tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek čuvati na suhom mjestu, na temperaturi do 25°C.

Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti označenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Carbomed tablete sadrže

1 tableta sadrži 150 mg aktiviranog ugljena.

Pomoćne tvari: karmelozanatrij, laktoza hidrat, saharoza.

Kako Carbomed tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

30 (2x15) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima.

Datum revizije upute

Veljača, 2014.