

UPUTA O LIJEKU

Pantexol 5% krema *dekspantenol*

Molim vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete koristiti ovaj lijek.

- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.
- Ako imate još pitanja, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
- *Ovaj lijek dostupan je bez recepta za liječenje blažih bolesti za koje nije potrebna liječnička pomoć.*

Uputa sadrži:

1. Što je Pantexol krema i za što se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Pantexol kremu
3. Kako koristiti Pantexol kremu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Pantexol kremu
6. Dodatne informacije

1. Što je Pantexol krema i za što se koristi

Dekspantenol pripada u skupinu cikatrizanata, za lokalnu primjenu.

Lokalno primjenjen dekspantenol koristi se kod:

- mehaničkih oštećenja kože poput ogrebotina, hiperkeratoza (prekomjerno orožnjavanje kože).
- manjih oštećenja ili nakon kirurških zahvata i opeklina, s ciljem poticanja epitelizacije kože i/ili povećanja njene vlažnosti i olakšanja njege.

Povoljan učinak pokazuje na smanjenje svrbeža i poboljšanje zarastanja blažih dermatozoa.

U djece se može primjenjivati kod ogrebotina i blažih kožnih nadražaja (uzrokovanih suncem, ultraljubičastim ili rendgenskim zračenjem).

2. Prije nego počnete koristiti Pantexol kremu

Nemojte koristiti Pantexol kremu

- ako ste alergični na dekspantenol ili druge sastojke kreme.

Budite oprezni s Pantexol kremom

Posavjetujte se s liječnikom ako imate neku od kroničnih bolesti, metabolički poremećaj, ako ste alergični ili uzimate još neke lijekove.

Krema je namjenjena isključivo za vanjsku uporabu, a budući da uzrokuje nadražaj oka valja izbjegavati kontakt s očima. Ako dođe do pojave lokalnog kožnog nadražaja trebate privremeno prekinuti primjenu kreme.

Uzimanje drugih lijekova s Pantexol kremom

Prije početka korištenja kreme, potrebno je obavijestiti svoga liječnika ili ljekarnika ako koristite neke druge lijekove. Također i one lijekove koji vam nisu propisani na lječnički recept.

Interakcije se ne opisuju, budući da se istodobno ne primjenjuju drugi lijekovi na oboljelo mjesto.

Trudnoća i dojenje

Ne postoje podaci o štetnim učincima lokalne primjene dekspantenola tijekom trudnoće i dojenja.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Pantexol krema ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3. Kako koristiti Pantexol kremu

Poštujte navedene upute!

Pantexol kremu primjenite lokalno na oboljelo područje kože, 1-2 puta na dan, a po potrebi i češće.

Oboljelo područje kože (ako je upaljeno) prethodno trebate isprati blagim antiseptikom koji ne nadražuje kožu ili mlakom vodom. Zatim, nanesite kremu u tankom sloju koji se lagano utrlja u zahvaćeno kožno područje.

Krema je pogodna za primjenu na nepokrivenim dijelovima tijela (npr. lice, vrat) i područjima pokrivenim dlačicama.

Ako imate osjećaj da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika.

Ako uzmete više kreme nego što ste trebali

Nisu zabilježene tegobe kod prekomjernog korištenja kreme.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi ostali lijekovi i Pantexol krema može dovesti do nuspojava.

Moguće su lakše alergijske reakcije.

U slučaju pojave alergijske reakcije potrebno je prekinuti korištenje kreme.

O svakoj nuspojavi potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Pantexol kremu

Kremu treba čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25°C, tubu čuvati čvrsto zatvorenu.

Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti označenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Pantexol krema sadrži

1 g kreme sadržava 50 mg dekspantenola.

Pomoćne tvari: cetilni alkohol, makrogol cetostearil eter (Cremophor A 25; Cremophor A 6), dimetikon, glicerol monostearat, cetearil oktanoat, propilenglikol, metilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, miris, voda pročišćena.

Sadržaj pakovanja

25 g kreme u Al tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Datum revizije upute

Siječanj 2014.