

UPUTA O LIJEKU

Molim Vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete koristiti ovaj lijek.

- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.
 - Ako imate još pitanja, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
 - Ovaj lijek dostupan je bez recepta za liječenje blažih bolesti za koje nije potrebna liječnička pomoć.
- Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.*

Paracetamol JADRAN 120 mg/5 ml sirup

(paracetamol)

Uputa sadrži:

1. Što je Paracetamol sirup i za što se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Paracetamol sirup
3. Kako koristiti Paracetamol sirup
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Paracetamol sirup
6. Dodatne informacije

1. Što je Paracetamol sirup i zašto se koristi

Paracetamol snižava povišenu tjelesnu temperaturu i ublažava bolove.

Paracetamol sirup namjenjen je djeci za snižavanje povišene tjelesne temperature koja je povezana s prehladom, gripom, dječjim zaraznim bolestima (npr. vodene kozice, hripavac, ospice, zaušnjaci) ili reakcijom na cijepljenje, kao i za ublažavanje boli povezane s nicanjem zuba, zubobolje, glavobolje, boli nakon operacija i ozljeda te boli u mišićima i zglobovima.

2. Prije nego počnete koristiti Paracetamol sirup

Nemojte koristiti Paracetamol sirup

- ako je Vaše dijete alergično (crvenilo, oticanje usana i jezika, osip, svrbež, gušenje) na paracetamol ili na bilo koji drugi sastojak lijeka.

Budite oprezni s primjenom Paracetamol sirupa

Obavijestite liječnika ako dijete boluje od neke kronične bolesti, metaboličkog poremećaja, ako je preosjetljivo ili uzima još neke lijekove.

- ako Vaše dijete ima problema s bubrežima i/ili jetrom
- ako Vaše dijete uzima istodobno neki drugi lijek koji u sebi ima paracetamol (odmah prekinite primjenu jer se ne smiju uzimati istodobno dva lijeka koja oba sadrže paracetamol).

Obavijestite liječnika ako bol traje dulje vrijeme (npr. dugotrajna, neprekidna glavobolja). Primjena Paracetamol sirupa tijekom duljeg vremena zahtjeva oprez.

U slučaju predoziranja potrebno je odmah zatražiti medicinsku pomoć čak iako nema znakova predoziranja. Naime, postoji rizik od pojave naknadnog teškog oštećenja jetre.

Korištenje drugih lijekova s Paracetamol sirupom

Prije početka primjene sirupa, potrebno je obavijestiti svoga liječnika ili ljekarnika ako Vaše dijete koristi neke druge lijekove. Također i one lijekove koji nisu propisani na liječnički recept.

Tijekom primjene Paracetamol sirupa **ne smiju se** koristiti drugi lijekovi koji sadrže u sastavu paracetamol.

Ako dijete uzima neki od sljedećih lijekova nemojte mu davati Paracetamol Jadran sirup, prije savjetovanja s liječnikom:

- metoklopramid i domperidon (lijekovi protiv mučnine i povraćanja),
- kolestiramin (lijek za snižavanje povišene masnoće u krvi, za ublažavanje svrbeža i proljeva u nekim bolestima probavnoga trakta),
- antikoagulansi (lijekovi za sprječavanje zgrušavanje krvi),
- antiepileptik (lijek za liječenje epilepsije ili padavice),
- barbiturati (lijek za smirenje i za liječenje epilepsije ili padavice),
- rifampicin (lijek za liječenje bakterijske infekcije).

Ostala upozorenja

Paracetamol sirup sadrži sorbitol. Stoga, ako Vaše dijete boluje od nekog oblika nepodnošenja šećera, prije nego počnete koristiti ovaj lijek posavjetujte se s liječnikom.

Trudnoća i dojenje

Ovaj lijek namjenjen je za primjenu u djece.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Paracetamol sirup nema utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rad na strojevima.

3. Kako koristiti Paracetamol sirup

Poštujte upute liječnika.

Ne preporučuje se dulja primjena od 3 dana bez savjeta liječnika. U slučaju da unatoč primjeni lijeka tegobe Vašeg djeteta ne prolaze ili se pojave novi simptomi, potražite savjet liječnika.

Doziranje se treba temeljiti na tjelesnoj masi djeteta. Približna dob u odnosu na tjelesnu masu navedena je samo kao smjernica.

Paracetamol sirup koristite kako je navedeno u tablici:

dob djeteta	jednokratna doza Paracetamol Jadran sirupa
novorođenčad i dojenčad do 3 mjeseca (tjelesna masa do 5 kg)	10mg/kg tjelesne težine, odnosno na dozirnoj čašici* do oznake 2,5 ml u slučaju novorođenčake žutice uobičajena je doza 5 mg/kg tjelesne težine (30 mg)
3 mjeseca do 1 godine (tjelesna masa od 5-10 kg)	na dozirnoj čašici* od oznake 2,5 ml do oznake

	5 ml
1 do 6 godina (tjelesna masa od 10-20 kg)	na dozirnoj čašici* od oznake 5 ml do oznake 10 ml
6 do 12 godina (tjelesna masa od 20-40 kg)	na dozirnoj čašici* od oznake 10 ml do oznake 20 ml

* priložena dozirna čašica uz proizvod.

Ne preporučuje se primjena više od 4 jednokratne doze *Paracetamol sirupa* u 24 sata, a vremenski razmak između dvije doze ne smije biti manji od 4-6 sati.

Ako ste zaboravili dati Paracetamol sirup

Nemojte primjeniti dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu!

Primjenite lijek što prije. Međutim, ako je ostalo nekoliko sati do sljedeće primjene, nemojte primjeniti propuštenu nego pričekajte vrijeme za sljedeću primjenu.

Ako date više lijeka nego što ste trebali

Ako ste dali više Paracetamol sirupa nego je trebalo, obratite se svom liječniku. Uzmite bočicu sirupa sa sobom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi ostali lijekovi i **Paracetamol sirup** može izazvati nuspojave.

Ukoliko se neka od sljedećih nuspojava dogodi, prestanite davati djetetu sirup i kontaktirajte svog liječnika ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu jer možete trebati liječničku pomoć.

Nuspojave na *Paracetamol Jadran sirup* uglavnom su blage naravi i rijetko se pojavljuju u djece u koje se sirup pravilno primjenjuje.

Rijetko (javljaju se u manje od 1 na 1000 bolesnika)

- osip, urticarija, svrbež
- alergijske reakcije
- oštećenje jetre
- porast kreatinina u plazmi (odstupanje u laboratorijskim nalazima bubrežne funkcije).

Poremećaj krvi i limfnog sustava

Zabilježeni su slučajevi krvne diskrazije, uključujući trombocitopeniju i agranulocitozu, iako ove reakcije nisu bile nužno uzročno povezane s primjenom paracetamola, a može se odraziti kao neuobičajeno krvarenje ili učestale infekcije.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Paracetamol sirup

Paracetamol sirup morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svjetlosti.

Sirup se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Paracetamol sirup sadrži

100 ml sirupa sadrži 2,4 g paracetamola.

Pomoćne tvari: etanol (96-postotni); metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; aroma naranče; propilenglikol; saharoza; sorbitol; glicerol.

Kako Paracetamol sirup izgleda i sadržaj pakovanja

150 ml sirupa u smeđoj staklenoj bočici s plastičnim zatvaračem i dozirnom čašicom na zatvaraču, u kutiji.

Ime i adresa proizvodača lijeka / nositelja odobrenja

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni

Datum revizije upute

Siječanj, 2014.