

UPUTA O LIJEKU

CONTRAL 10 mg tablete

loratadin

Pažljivo pročitajte uputu prije početka korištenja lijeka.

Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom ako imate dodatna pitanja ili trebate savjet.

Ovaj lijek propisan je vama osobno i ne smijete ga davati drugim osobama. Može im naškoditi iako njihovi simptomi mogu biti isti kao vaši.

Sadržaj upute:

1. Što su Contral tablete i za što se koriste
2. Prije nego počnete uzimati Contral tablete
3. Kako uzimati Contral tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Contral tablete
6. Dodatne informacije

1. Što su Contral tablete i za što se koriste

Loratadin spada u skupinu lijekova koji se zovu antihistaminici. Antihistaminici pomažu u ublažavanju simptoma alergije sprječavajući djelovanje histamina, tvari koja se stvara u organizmu.

Contral tablete koriste se za ublažavanje:

- simptoma sezonskoga alergijskog rinitisa kao što su kihanje, iscjedak iz nosa, svrbež te peckanje i nadraženost očiju;
- simptoma (osip, svrbež, urtikarija) kod idiopatske kronične urtikarije.

2. Prije nego počnete uzimati Contral tablete

Contral ne smijete koristiti u slučaju:

- ako ste alergični na loratadin ili bilo koji drugi sastojak lijeka
- ako ste trudni ili dojite.

Lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 2 godine ili tjelesne težine manje od 30 kg.

Budite oprezni tijekom uzimanja Contral tableta

Posavjetujte se s liječnikom ako imate neku od kroničnih bolesti, metabolički poremećaj, ako ste alergični ili uzimate još neke lijekove.

Ako imate bolest jetre, prije nego što počnete uzimati Contral tablete obavijestite liječnika.

Uzimanje drugih lijekova

*Ukoliko koristite neke druge lijekove posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije početka primjene **Contrala**. Posavjetujte se i za one lijekove koji vam nisu propisani na liječnički recept.*

Laboratorijske pretrage

Ako vam je liječnik rekao da morate raditi alergijske kožne testove, Contral tablete ne smijete uzimati dva dana prije tih testova.

Uzimanje Contral tableta s hranom i pićem

Tablete možete uzimati uz obrok ili neovisno od obroka. Alkohol ne pojačava djelovanje Contral tableta.

Upravljanje vozilima i rad na strojevima

Ako se uzimaju u preporučenoj dozi, tablete ne bi trebale uzrokovati pospanost ili smanjiti koncentraciju. Međutim, vrlo rijetko, neki ljudi osjete pospanost što može utjecati na njihovu sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

Važne informacije o sastojcima Contral tableta

Contral tablete sadrže laktozu. Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Contral tablete

Poštujte navedene upute!

Doziranje Contral tableta:

Dob	Količina primijenjenog lijeka	Učestalost primjene
Odrasli i djeca starija od 12 godina	1 tableta	Jednom dnevno
Djeca u dobi od 2 do 12 godina i teža od 30 kg	1 tableta	Jednom dnevno

Ako imate tešku bolest jetre, liječnik ili ljekarnik može vam savjetovati da preporučenu dozu uzimate svaki drugi dan. U tom slučaju morate slijediti njihove upute.

Primjena lijeka u djece

Važno je znati tjelesnu težinu djeteta kako bi se osigurala primjena ispravne količine lijeka. Primjerice, devetogodišnje dijete teško je oko 30 kg. Ako niste sigurni, izvažite dijete i slijedite upute iz gornje tablice.

Lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 2 godine ili tjelesne težine manje od 30 kg.

Ako ste uzeli više Contral tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše **Contral** tableta, odmah se javite liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti tablete

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka na vrijeme, uzmite je čim se sjetite i nastavite s redovnim uzimanjem lijeka. Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu koju ste propustili.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Contral tableta obratite se svom

liječniku ili ljekarniku

4. Moguće nuspojave

*Kao svi ostali lijekovi i **Contral** može dovesti do nuspojava iako ne u svih ljudi koji ih uzimaju.*

Vrlo rijetko nakon uporabe ovog lijeka mogu se javiti reakcije preosjetljivosti poput teškoća s disanjem i naticanja lica, vrata, jezika ili grla. Ako primijetite neku od tih nuspojava, prestanite uzimati tablete i odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Najčešće nuspojave u djece u dobi od 2 do 12 godina su glavobolja, nervoza i umor.

Najčešće nuspojave u odraslih bolesnika i adolescenata su pospanost, glavobolja, povećani apetit i teškoće sa spavanjem.

Druge nuspojave, koje se javljaju jako rijetko, su vrtoglavica, nepravilan ili ubrzani puls, mučnina, suha usta, problemi sa želucom, problemi s jetrom, gubitak kose, osip i umor.

O svakoj nuspojavi potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Contral tablete

Contral tablete morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece!

Čuvati na suhom mjestu.

Contral tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što sadržava Contral

Djelatna tvar u tableti je loratadin. Svaka tableta sadrži 10 mg loratadina.

Pomoćne tvari: laktoza hidrat; škrob, prethodno geliran; kukuruzni škrob; magnezijev stearat.

Kako Contral tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

Contral su bijele, ovalne tablete, na jednoj strani imaju razdjelnu crtu, koja odvaja jednu polovicu sa slovom „L“ od druge s brojem „10“.

Contral 10 mg tablete dostupne su u pakovanju od 10 ili 30 tableta u blisteru, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja

Na recept, u ljekarni.

Datum revizije upute :

Siječanj 2014.