

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

DOKSICIKLIN Belupo 100 mg kapsule *doksiciklin*

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je DOKSICIKLIN Belupo i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati DOKSICIKLIN Belupo?
3. Kako uzimati DOKSICIKLIN Belupo?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati DOKSICIKLIN Belupo?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je DOKSICIKLIN Belupo i za što se koristi?

DOKSICIKLIN Belupo je antibiotik koji pripada skupini tetraciklina. Primjenjuje se u liječenju različitih infekcija uključujući:

- infekcije prsišta, pluća i nosa, npr. bronhitis, upala pluća, sinuitis
- infekcije mokraćnog trakta, npr. cistitis, uretritis
- infekcije oka
- spolno prenosive bolesti, npr. gonoreja, sifilis, klamidija
- groznice povezane s ušima ili ugrizima krpelja
- malariju, u slučajevima kada klorokin nije djelotvoran.

DOKSICIKLIN Belupo se također primjenjuje u sprječavanju određenih infekcija poput „scrub“ tifusa (bolest koju prenose mali insekti), putničke dijareje, malarije, kolere i leptospiroze (bakterijska infekcija koja se prenosi nečistom vodom).

Vaš liječnik može primijeniti DOKSICIKLIN Belupo za liječenje neke druge infekcije koja nije prethodno navedena. Također, može propisati dodatan lijek koji ćete uzimati zajedno s DOKSICIKLIN Belupo kapsulama za liječenje infekcije od koje bolujete.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati DOKSICIKLIN Belupo?

Nemojte uzimati DOKSICIKLIN Belupo:

- ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste alergični na antibiotike iz skupine tetraciklina
- ako imate poteškoća s gutanjem
- ako ste trudni ili planirate trudnoću
- ako dojite.

DOKSICIKLIN Belupo ne smije se primjenjivati u djece mlađe od 12 godina.

Primjena DOKSICIKLIN Belupo kapsula tijekom razdoblja rasta zubi (u trudnoći, dojenačkoj dobi ili u djece mlađe od 12 godina) može uzrokovati trajno obojenje (žuto-sivo-smeđe) zubi ili može utjecati na njihov normalan rast.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete DOKSICIKLIN Belupo, ukoliko se nešto od ispod navedenog odnosi na Vas:

- izloženi ste ili postoji mogućnost da budete izloženi jakoj sunčevoj svjetlosti ili UV svjetlosti (npr. solarij). Izbjegavajte jaku sunčevu svjetlost sve dok uzimate ovaj lijek, jer je tijekom terapije koža sklonija razvoju opekline nego inače.
- imate poteškoća s jetrom ili bubrezima
- ako postoji sumnja da bolujete od sifilisa. Vaš liječnik će pratiti Vaše zdravstveno stanje i nakon prekida terapije.
- ako ste kod prijašnjih liječenja s antibioticima imali proljev
- ako bolujete od refluksa želučane kiseline. DOKSICIKLIN Belupo može pogoršati vaše stanje te možda nije najpogodniji lijek za Vas.

Odmah obavijestite svojeg liječnika ukoliko imate poteškoća s gutanjem ili osjećaj nelagode u ždrijelu nakon uzimanja DOKSICIKLIN Belupo kapsula. Liječnik u tom slučaju može prekinuti terapiju s DOKSICIKLIN Belupo kapsulama.

Operativni zahvat ili stomatološki zahvat

Obavijestite svojeg liječnika anesteziologa ili stomatologa da uzimate DOKSICIKLIN Belupo ukoliko ćete biti podvrgnuti općoj anesteziji zbog operativnog ili stomatološkog zahvata, jer u tom slučaju možete iskusiti više nuspojava lijeka.

Laboratorijske pretrage

Obavijestite svojeg liječnika da uzimate DOKSICIKLIN Belupo ukoliko provodite laboratorijske pretrage, jer ovaj lijek može utjecati na rezultate nekih pretraga.

Ako niste sigurni odnosi li se na Vas nešto od gore navedenog, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego počnete uzimati DOKSICIKLIN Belupo.

Djeca

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina starosti.

Drugi lijekovi i DOKSICIKLIN Belupo

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Neki od ovih lijekova mogu umanjiti učinak DOKSICIKLIN Belupo kapsula:

- antacidi (lijekovi za ublažavanje žgaravice i kiseline), preparati željeza, cinka ili bizmuta. Ne uzimajte ove lijekove/preparate istovremeno s DOKSICIKLIN Belupo kapsulama.
- karbamazepin, fenitoin (lijekovi za liječenje epilepsije) i barbiturati (lijekovi za liječenje epilepsije i za smirenje).

DOKSICIKLIN Belupo može utjecati na učinak nekih drugih lijekova poput:

- varfarina ili kumarina (lijekovi za razrjeđivanje krvi). DOKSICIKLIN Belupo pojačava njihov učinak.
- penicilinskih antibiotika (koriste se u liječenju različitih infekcija). DOKSICIKLIN Belupo smanjuje njihovu učinkovitost.
- metoksiflurana (sredstvo za anesteziju).

DOKSICIKLIN Belupo s hranom, pićem i alkoholom

Kod liječenja infekcija, DOKSICIKLIN Belupo možete uzeti s ili bez hrane.

Ako osjetite mučninu pri uzimanju DOKSICIKLIN Belupo kapsula, tada je preporučljivo da lijek uzimate s hranom ili mlijekom.

Alkohol može umanjiti učinak DOKSICIKLIN Belupo kapsula stoga izbjegavajte njegovu konzumaciju.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati DOKSICIKLIN Belupo ako ste trudni, planirate trudnoću ili ako dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

DOKSICIKLIN Belupo nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

DOKSICIKLIN Belupo sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati DOKSICIKLIN Belupo?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Način primjene

- uzmite DOKSICIKLIN Belupo s punom čašom vode u stojećem ili sjedećem položaju
- najbolje vrijeme za uzimanje DOKSICIKLIN Belupo kapsula je po mogućnosti ujutro ili barem 1 sat prije odlaska na spavanje navečer
- važno je da ne legnete barem 30 minuta od uzimanja DOKSICIKLIN Belupo kapsula, tako da kapsula može nesmetano stići do želuca. Na taj način ćete spriječiti nadražaj ždrijela ili jednjaka (mišićna cijev koja provodi hranu iz usta do želuca).
- ukoliko osjećate mučninu pri uzimanju DOKSICIKLIN Belupo kapsula, tada lijek uzmite s hranom ili mlijekom.

Način uzimanja naveden u nastavku pokazuje različite doze lijeka koje može propisati Vaš liječnik ovisno o infekciji koja se liječi. Liječnici mogu propisati i doze koje su drugačije od navedenih.

Uobičajena doza lijeka

Uzeti 2 kapsule (200 mg) prvog dana, a dalje uzimati 1 kapsulu (100 mg) na dan.

U slučaju težih infekcija uzimaju se 2 kapsule (200 mg) i u nastavku liječenja.

Ukupno vrijeme trajanja terapije ovisi o infekciji za koju je lijek propisan.

Spolno prenosive bolesti

Uzeti 1 kapsulu (100 mg) dva puta na dan kroz 7 do 10 dana.

Primarni i sekundarni sifilis

Uzeti 1 kapsulu (100 mg) dva puta na dan kroz 14 dana.

Vaš liječnik će pratiti vaše zdravstveno stanje i nakon završetka terapije.

Groznice povezane s ugrizom krpelja ili uši

Uzeti jednokratno dozu od 1 do 2 kapsule (100 – 200 mg).

Liječenje malarije

Uzeti 2 kapsule na dan (200 mg) kroz barem 7 dana.

Vaš liječnik će propisati još jedan lijek za liječenje malarije (npr. kinin) koji ćete uzimati istovremeno s DOKSICIKLIN Belupo kapsulama.

Sprječavanje malarije

Uzeti 1 kapsulu (100 mg) na dan tijekom 1 do 2 dana prije putovanja u područje u kojem postoji mogućnost zaraze malarijom pa sve do 4 tjedna nakon povratka s putovanja.

Sprječavanje „scrub“ tifusa (bolest koju prenose mali insekti)

Uzeti jednokratno dozu od 2 kapsule (200 mg) jednom na tjedan.

Sprječavanje „putničkog“ proljeva

Uzeti 2 kapsule (200 mg) prvog dana putovanja, a u nastavku uzimati 1 kapsulu (100 mg) na dan tijekom cjelokupnog boravka na zaraznom području.

Obavijestite svog liječnika, ako namjeravate uzimati DOKSICIKLIN Belupo dulje od 21 dan.

Liječenje leptospiroze (infekcija koje se širi zaraženom vodom)

Uzeti 1 kapsulu (100 mg) jednom na dan kroz 7 dana.

Sprječavanje leptospiroze (infekcija koje se širi zaraženom vodom)

Uzeti 2 kapsule (200 mg) jednom u tjednu tijekom cjelokupnog boravka na zaraznom području.

Uzeti još 2 kapsule (200 mg) nakon završetka putovanja.

Obavijestite svog liječnika, ako namjeravate uzimati DOKSICIKLIN Belupo dulje od 21 dan.

Liječenje i sprječavanje kolere

Uzeti jednokratno dozu od 3 kapsule (300 mg).

Prvi i drugi stadij Lajmske bolesti

Uzeti 1 kapsulu (100 mg) dva puta na dan kroz 10 do 30 dana.

Vrijeme trajanja liječenja ovisi o odgovoru organizma na lijek.

Ako uzmete više DOKSICIKLIN Belupo kapsula nego što ste trebali

Ako uzmete više DOKSICIKLIN Belupo kapsula nego što ste trebali, odmah se javite svojem liječniku ili se uputiti u najbližu jedinicu hitne medicinske pomoći.

Ponesite sa sobom kapsule ili uputu o lijeku, kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti DOKSICIKLIN Belupo

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite je čim prije, a sljedeću dozu uzmite u propisano vrijeme. Međutim, ako je vrijeme za uzimanje sljedeće doze već blizu, tada nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu već nastavite uzimati lijek po uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati DOKSICIKLIN Belupo

Ako prerano prekinete uzimati lijek, bolest od koje ste se liječili može se vratiti. Uvijek uzimajte lijek kroz cijelo vrijeme koje je propisao liječnik, čak i kada se počnete osjećati bolje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Odmah obavijestite svog liječnika ako iskusite bilo koji simptom alergijske reakcije nakon uzimanja ovog lijeka. Iako su ove reakcije vrlo rijetke, simptomi mogu biti izuzetno teški:

- iznenadno piskutanje, poteškoće s disanjem, stezanje u prsima, visoka temperatura, oteklina očnih kapaka, lica ili usna, osip ili svrbež (naročito proširen po cijelom tijelu)

- mučnina u želucu, gubitak apetita, teški, trajni ili krvavi proljev (ovo se može javiti i 2 do 3 mjeseca nakon uzimanja zadnje doze lijeka te može biti povezano s boli u trbuhu ili visokom temperaturom).

Ovi simptomi koji se mogu javiti nakon liječenja s antibiotikom mogu biti znak ozbiljne upale crijeva.

Što prije se javite svom liječniku ukoliko iskusite neke od sljedećih nuspojava:

- kožni osip, perutanje ili guljenje kože
- teške kožne reakcije zbog kojih se možete osjećati vrlo loše
- pojačanu osjetljivost kože na sunčevu svjetlost. Možete dobiti kožni osip, svrbež, crvenilo ili teške opekline. Ukoliko se ovo dogodi, prekinite uzimati ovaj lijek i obavijestite svog liječnika.
- glavobolju, koja ako je vrlo teška, može biti povezana s poremećajima vida poput zamućenog vida ili gubitka vida
- upalu ili pojavu ranica na ždrijelu
- poremećaje u krvnoj slici. Ovo je posljedica promjene broja različitih vrsta krvnih stanica. Simptomi uključuju umor, lagani nastanak modrica ili razvoj infekcija.
- nizak krvni tlak
- ubrzan rad srca
- bolovi u zglobovima i mišićima
- bol u trbuhu ili proljev.

Sljedeće nuspojave mogu nestati tijekom liječenja, kako se Vaš organizam privikava na lijek.

Obavijestite svog liječnika ukoliko primijetite da neka od navedenih nuspojava ne prestaje:

- žgaravica, mučnina ili povraćanje
- poteškoće s gutanjem, natečen ili bolan jezik ili usta
- crvenilo kože (koža lica)
- zujanje u ušima
- bol i svrbež u području čmara i/ili spolovila.

Zabilježene su i sljedeće nuspojave:

- pogoršanje sistemskog lupus eritematozusa (SLE). Ovo je alergijsko stanje koje uzrokuje bolove u zglobovima, kožni osip i visoku temperaturu.
- upala crijeva
- izbočene fontanele u dojenčadi (mekani dio na tjemenu gdje kosti glave nisu srasle)
- upala i oštećenje jetre, žuta boja kože i bjeloočnica (žutica), upala gušterače te neuobičajene vrijednosti biokemijskih nalaza jetre
- povišena koncentracija ureje u krvi
- perikarditis (upala srčane ovojnice)
- obojenost i/ili izostanak rasta zubi
- obojenost tkiva štitne žlijezde koje se javlja kod dugotrajnog uzimanja lijeka. Ovaj lijek ne utječe na funkciju štitnjače.
- klimanje noktiju nakon izlaganja suncu.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati DOKSICIKLIN Belupo?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što DOKSICIKLIN Belupo sadrži?

Djelatna tvar je doksiciklin.

Jedna kapsula sadrži 100 mg doksiciklina u obliku doksiciklinhiklata.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat; magnezijev stearat; željezov oksid, crveni; željezov oksid, žuti (E172), boja quinoline yellow (E104); boja patent blue V (E131); titanijev dioksid (E171); želatina.

Kako DOKSICIKLIN Belupo izgleda i sadržaj pakiranja?

DOKSICIKLIN Belupo 100 mg kapsule su tvrde želatinske kapsule zelene boje, ispunjene žutim praškom.

6 kapsula u bijeloj plastičnoj bočici sa sigurnosnim zatvaračem, u kutiji.

25 kapsula u bijeloj plastičnoj bočici sa sigurnosnim zatvaračem, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2016.