

Uputa o lijeku

LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej

lidokain

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svojem liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej i za što se koristi
2. Što morate znati prije primjene LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml spreja
3. Kako primjenjivati LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej
6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

1. ŠTO JE LIDOKAIN BELUPO 100 mg/ml SPREJ I ZA ŠTO SE KORISTI

LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej sadrži djelatnu tvar lidokain. Lidokain spada u skupinu lijekova koja se naziva lokalni anestetici.

LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej koristi se za anesteziju dijelova tijela. Uklanja bol tijekom:

- medicinskih pregleda i operacija nosa i ždrijela
- poroda, te nakon poroda ako je potrebno šivanje
- liječenja kod liječnika stomatologa.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE PRIMJENA LIDOKAIN BELUPO 100 mg/ml SPREJA

LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej ne smije se primijeniti:

- ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste alergični na bilo koji drugi lokalni anestetik iste skupine (kao što je prilokain ili bupivakain).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili stomatologu prije primjene LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml spreja ukoliko se nešto od ispod navedenog odnosi na Vas:

- imate porezotine, rane ili čireve u ždrijelu, ustima ili nosu
- imate infekciju dišnih putova
- imate padavicu (epilepsiju)
- imate poteškoće sa srcem, npr. spore otkucaje srca
- imate izrazito nizak krvni tlak
- imate poteškoća s jetrom ili bubrezima
- Vi ili netko od Vaših srodnika ima porfiriju, rijetku bolest krvnog pigmenta.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku ili stomatologu.

Djeca i adolescenti

Doza LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml spreja mora se prilagoditi s obzirom na dob, tjelesnu masu, fizičku kondiciju i vrstu medicinskog zahvata (vidjeti dio 3. **Kako primjenjivati LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej**).

Drugi lijekovi i LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej

Obavijestite svog liječnika, stomatologa ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ovo se odnosi i na lijekove koje ste kupili bez recepta, uključujući i biljne lijekove.

LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej može utjecati na djelovanje drugih lijekova, a neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml spreja.

Osobito je važno da obavijestite svojeg liječnika ili stomatologa ako uzimate lijekove za liječenje poremećaja ritma srca (aritmije), kao što je npr. meksiletin.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni, planirate imati dijete ili dojite, obavijestite svojeg liječnika ili stomatologa prije primjene LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml spreja.

Upravljanje vozilima i strojevima

LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. To je ovisno o dijelu tijela na kojem je sprej primijenjen i o korištenoj količini.

Vaš liječnik ili stomatolog reći će Vam kada smijete voziti i upravljati strojevima.

LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej sadrži:

- **etanol.** Ovaj lijek sadrži etanol u količini 39,6 %vol etanola (alkohola), tj. do 625 mg po dozi, što odgovara 15,84 ml piva ili 6,6 ml vina po dozi. Štetno za alkoholičare.

Treba uzeti u obzir u trudnica, dojilja, djece te visokorizičnih skupina ljudi poput bolesnika s bolešću jetre ili epileptičara.

- **propilenglikol.** Ovaj lijek sadrži propilenglikol, koji može nadražiti kožu.

3. KAKO PRIMIJENJIVATI LIDOKAIN BELUPO 100 mg/ml SPREJ

LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej uglavnom primjenjuje liječnik ili stomatolog. Doziranje je ovisno o vrsti boli na koju treba djelovati, o Vašoj dobi i tjelesnoj kondiciji.

Ako LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej primjenjujete kod kuće, trebate uzeti onu dozu koju Vam je propisao liječnik ili stomatolog. Uvijek primijenite LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili stomatolog. Provjerite sa svojim liječnikom ili stomatologom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kako koristiti LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej

Ne koristiti više od 20 potisaka pumpice u odraslih osoba.

Koristiti najmanji mogući broj potisaka.

Ne prskati u oči.

Kako primijeniti LIDOKAIN Belupo sprej 100 mg/ml u usnoj šupljini i u ždrijelu

LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej uzrokuje obamrlost osjeta u usnoj šupljini i ždrijelu, zbog čega hrana ili tekućina može dospjeti u dišne putove. Također, može otežati gutanje ili dovesti do slučajnog ugriza jezika ili sluznice obraza.

U starijih osoba, osoba narušena zdravlja i u djece, LIDOKAIN Belupo sprej 100 mg/ml mora se primjenjivati s oprezom.

Ako primijenite više LIDOKAIN BELUPO 100 mg/ml spreja nego što ste trebali

Ako mislite da ste primijenili više LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml spreja nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku ili stomatologu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili stomatologu ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Teške alergijske reakcije:

Ako primijetite neke od sljedećih ozbiljnih nuspojava, odmah prestanite uzimati ovaj lijek te obavijestite svojeg liječnika ili se obratite najbližoj ustanovi hitne medicinske pomoći:

- otekлина lica, usnica, jezika i ždrijela, što može uzrokovati otežano gutanje
- jako ili iznenadno naticanje šaka, stopala ili gležnjeva
- otežano disanje
- jaki svrbež kože (s plikovima).

Ostale moguće nuspojave:

- iritacija na mjestu primjene
- nervoza
- omaglica
- pospanost
- gubitak svijesti
- grlobolja
- promuklost ili gubitak glasa
- nizak krvni tlak, što može uzrokovati omaglicu ili ošamućenost
- epileptički napadi (konvulzije)
- otežano ili usporeno disanje
- spori srčani otkucaji
- prestanak disanja ili rada srca.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili stomatologa. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. KAKO ČUVATI LIDOKAIN BELUPO 100 mg/ml SPREJ

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek čuvajte na temperaturi ispod 25°C, zaštićen od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći očuvanju okoliša.

6. SADRŽAJ PAKOVANJA I DODATNE INFORMACIJE

Što LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej sadrži

Djelatna tvar je lidokain.

Jedna potisna doza (0,1 ml) otopine za raspršivanje sadrži 10 mg lidokaina.

Pomoćne tvari su etanol (96 postotni); propilenglikol; levomentol; eukaliptusovo eterično ulje; saharinnatrij; voda, pročišćena.

Kako LIDOKAIN Belupo sprej 100 mg/ml izgleda i sadržaj pakovanja

LIDOKAIN Belupo 100 mg/ml sprej je bistra, bezbojna do svijetložuta otopina, karakteristična mirisa.

50 ml otopine u smeđoj staklenoj bočici s pumpicom i raspršivačem, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja

Na recept, u ljekarni.

Datum revizije upute

Veljača, 2013.