

Uputa o lijeku

MIROBACT 20 mg/1 g mast *mupirocin*

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
- Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

U ovoj uputi:

1. Što je MIROBACT mast i za što se primjenjuje
2. Prije nego počnete primjenjivati MIROBACT mast
3. Kako primjenjivati MIROBACT mast
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati MIROBACT mast
6. Dodatne informacije

1. ŠTO JE MIROBACT MAST I ZA ŠTO SE PRIMJENJUJE

MIROBACT mast sadrži mupirocin.

Mupirocin pripada skupini lijekova koji se zovu antibiotici.

MIROBACT mast se primjenjuje u liječenju:

- kožnih infekcija poput:
 - infekcije korijena dlaka u kojoj dolazi do pojave gnojnih prištića (folikulitis)
 - zarazne infekcije kože u kojoj dolazi do pojave mjehurića i ljuskica (krasta) na koži (impetigo)
 - gnojnih čireva koji se opetovano javljaju (furunkuloza).
- različitih drugih bakterijskih infekcija kože koje uzrokuju stafilokoki, streptokoki i *E. coli*. U ovu skupinu se također ubraja infekcija kože s bakterijom meticilin rezistentnim *Staphylococcus aureus* (MRSA).

MIROBACT mast namijenjena je isključivo za vanjsku primjenu na koži.

2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI MIROBACT MAST

Nemojte primjenjivati MIROBACT mast:

- ako ste alergični (preosjetljivi) na djelatnu tvar ili bilo koji sastojak lijeka MIROBACT mast
- na očima, nosu ili na mjestu primjene intravenskog katetera.

Budite posebno oprezni s MIROBACT masti

Ova mast sadrži polietilen glikol. Obavezno se posavjetujte s Vašim liječnikom:

- ako imate poteškoće s bubrezima
- ako se mast primjenjuje na velikoj površini kože s otvorenim ranama ili oštećenom kožom.

MIROBACT mast može uzrokovati teške kožne reakcije ili alergije (vidjeti dio 4 **Moguće nuspojave**).

Ukoliko se MIROBACT mast primjenjuje kroz dulje vrijeme, tada može doći do pojave gljivične infekcije. Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika, ako primijetite pojavu gljivične infekcije na mjestu primjene ovog lijeka.

Nemojte primjenjivati ovu mast u blizini očiju. Ukoliko mast slučajno dođe u dodir s Vašim očima, tada oči obilno isperite s vodom.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Primjena drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Ovo se odnosi i na biljne lijekove i homeopatske pripravke.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Ukoliko se mast primjenjuje na bradavicama, tada se mast mora temeljito isprati prije dojenja.

3. KAKO PRIMJENJIVATI MIROBACT MAST

Uvijek primijenite lijek MIROBACT mast točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

MIROBACT mast nemojte primjenjivati s drugim kremama ili mastima na oboljelom području. Miješanje MIROBACT masti s drugim kremama ili mastima može umanjiti učinkovitost lijeka.

MIROBACT mast se primjenjuje na oboljelom području 3 puta na dan, najviše 10 dana.

MIROBACT mast primjenjujte na sljedeći način:

1. Operite i osušite ruke prije primjene.
2. Mast nanosite na oboljelo područje kože.
3. Nakon primjene ovog lijeka, oboljelo područje možete prekriti s flasterom ili drugim odgovarajućim pokrovom, osim ako Vam je liječnik rekao da to ne činite.
4. Operite ruke nakon primjene.

Ako primijenite više MIROBACT masti nego što ste trebali

Ako ste primijenili više MIROBACT masti nego što ste trebali, tada se javite svojem liječniku ili ljekarniku za savjet.

Ako ste zaboravili primijeniti MIROBACT mast

Ako ste zaboravili primijeniti MIROBACT mast učinite to čim bude moguće, osim ukoliko nije blizu vrijeme za sljedeću redovnu primjenu (unutar jednog sata do redovne primjene). U tom slučaju zaboravljenu dozu lijeka nemojte primijeniti, već nastavite prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete s primjenom MIROBACT masti

Ukoliko prekinete primjenu MIROBACT masti ranije nego što je propisano, tada se infekcija može vratiti te dovesti do pogoršanja Vašeg stanja.

Ovaj lijek uvijek primjenjujte redovito, kako Vam je liječnik propisao.

Ako progutate MIROBACT mast

U slučaju gutanja MIROBACT masti odmah se javite svojem liječniku ili se uputite u najbližu jedinicu hitne medicinske pomoći.

Ponesite sa sobom **mast** ili uputu o lijeku, kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek progutali.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, lijek MIROBACT mast može uzrokovati nuspojave.

Ukoliko primijetite pojavu teške kožne reakcije ili alergije, **odmah prekinite s primjenom ovog lijeka**, isperite mast s kože te se što prije javite liječniku.

Tijekom primjene ovog lijeka mogu se javiti i sljedeće nuspojave:

- **česte nuspojave:** osjećaj žarenja na mjestu primjene
- **manje česte nuspojave:** svrbež, crvenilo, osjećaj bockanja te suha koža na mjestu primjene. Na drugim dijelovima kože također je moguća pojava alergijskog osipa, svrbeža, crvenila ili osjetljivosti kože.
- **vrlo rijetko nuspojave:** otekline lica i/ili poteškoće s disanjem. Ovo može biti znak ozbiljne alergijske reakcije koja zahtjeva hitno liječenje.

Za određivanje učestalosti nuspojava korištena je sljedeća podjela:

Vrlo često (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika)

Često (javljaju se u 1 na 10 bolesnika)

Manje često (javljaju se u 1 na 100 bolesnika)

Rijetko (javljaju se u 1 na 1000 bolesnika)

Vrlo rijetko (javljaju se u 1 na 10000 bolesnika)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. KAKO ČUVATI MIROBACT MAST

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek treba čuvati na temperaturi ispod 25°C.

MIROBACT mast se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što MIROBACT mast sadrži

Djelatna tvar je mupirocin.

Jedan gram masti sadrži 20 mg mupirocina.

Pomoćne tvari su: makrogol 400, makrogol 3350.

Kako MIROBACT mast izgleda i sadržaj pakovanja

Mast je bijele boje, djelomično prozirna.

15 g masti u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Hrvatska

Način i mjesto izdavanja

Na recept, u ljekarni.

Uputa je zadnji puta odobrena u lipnju 2013.