

UPUTA O LIJEKU

BAYER LOGO

Canesten 10 mg/g krema

klotrimazol

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu jer sadržava za vas važne podatke!

Lijek je dostupan bez recepta. Usprkos tome morate ga upotrebljavati pažljivo da vam može najbolje koristiti.

- Spremite uputu. Možda ćete je htjeti ponovno pročitati.
- Ako želite dodatne informacije ili savjet, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ako se znakovi vaše bolesti pogoršaju ili se ne poboljšaju za 4 tjedna, posavjetujte se s liječnikom.
- Ako bilo koja nuspojava postane teška ili ako primijetite nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Uputa sadržava:

1. Što je Canesten 10 mg/g krema i za što se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Canesten 10 mg/g kremu
3. Kako koristiti Canesten 10 mg/g kremu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Canesten 10 mg/g kremu
6. Dodatne informacije

1. Što je Canesten 10 mg/g krema i za što se koristi

Lijek Canesten 10 mg/g krema antimikotik je za lokalno liječenje. Sadržava ljekoviti sastojak klotrimazol, koji djeluje na gljivice i neke druge mikroorganizme.

Lijek Canesten 10 mg/g krema primjenjuje se za liječenje:

- gljivične infekcije stopala (tinea pedum ili »atletsko stopalo«) i ruku (tinea manuum). Infekcija uzrokuje ljuštenje, pojavu mjehurića i odumiranje kože na stopalima, dlanovima i između prstiju. Na oboljelim dijelovima koža je raspucala, mogu se pojaviti svrbež, upala i oteklina;
- gljivične infekcije kože na trupu, udovima, kožnim pregibima (tinea corporis) i u preponama (tinea inguinalis). Infekcija se najčešće očituje kao pojava ovalnih crvenih mrlja koje se šire i na sredini su svjetlijе;
- gljivične infekcije kože nazvane pityriasis versicolor. Infekcija uzrokuje nastanak mrlja sa sitnim ljuskama svjetlijе, tamnije, žutosmeđe ili ružičaste boje, može se pojaviti i gubitak kožnoga pigmenta (depigmentacija);
- infekcije vanjskih spolnih organa gljivicama iz roda Candida u žena i muškaraca. Kod žena se infekcija vanjskih spolnih organa (kandidni vulvitis) očituje kao svrbež, pocrvenjelost, otečenost, pekuće ranice stidnih usana i dijelova oko njih. Kod muškaraca se ta infekcije (kandidni balanitis) očituje kao sitan bijeli osip, svrbež i blaga upala glavića i kožice spolnog uda;

- bakterijske infekcije kože nazvane eritrazma. To je dugotrajna (kronična) infekcija koja se očituje kao crvenosmeđe ili ružičaste mrlje i obično se javlja na pregibima kože (ispod pazuha, ispod prsiju ili u preponama).

2. Prije nego počnete koristiti Canesten 10 mg/g kremu

Nemojte koristiti lijek Canesten 10 mg/g krema

- ako ste alergični (preosjetljivi) na klotrimazol, cetilni i stearilni alkohol ili bilo koji sastojak lijeka Canesten 10 mg/g krema. U tom slučaju prije primjene lijeka posavjetujte se s liječnikom. Kod poznate preosjetljivosti na cetilni i stearilni alkohol preporučuje se da umjesto lijeka Canesten 10 mg/g krema upotrebljavate lijek Canesten 10 mg/ml otopina za kožu. Pritom imajte na umu da lijek Canesten 10 mg/ml otopina za kožu ne smijete upotrebljavati za liječenje gljivičnih infekcija vanjskih spolnih organa.

Budite oprezni s Canesten 10 mg/g kremom

- ako upotrebljavate kontracepcijska sredstva od lateksa (npr. dijafragmu ili kondom) jer lijek Canesten 10 mg/g krema nakon nanošenja na spolne organe (stidne usne i područje vulve kod žena ili glavić i kožica muškog uda kod muškaraca) može smanjiti učinkovitost zaštite tih proizvoda. Taj je učinak kratkotrajan i nestane nakon završetka liječenja.

Uzimanje drugih lijekova s Canesten 10 mg/g kremom

Nije poznato je li moguće međusobno djelovanje između lijeka Canesten 10 mg/g krema i drugih lijekova.

Obavijestite svojega liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, pa i onda ako ste ga dobili bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća

Nisu provedena ispitivanja uporabe lijeka Canesten 10 mg/g krema u trudnica. Ako upotrebljavate lijek Canesten 10 mg/g krema kao što je napisano u ovoj uputji ili kao što vam je preporučio liječnik, odnosno ljekarnik, pojava učinaka na druge organe nije vjerojatna. Usprkos tome uporaba kreme u prva tri mjeseca trudnoće dopuštena je samo ako tako savjetuje liječnik.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Canesten 10 mg/g krema

Lijek Canesten 10 mg/g krema sadržava cetilni i stearilni alkohol koji mogu izazvati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktne dermatitis).

Upavljanje vozilima i strojevima

Pri uporabi lijeka Canesten 10 mg/g krema nije primijećen utjecaj na sposobnost upavljanja vozilima i strojevima.

3. Kako koristiti Canesten 10 mg/g kremu

Pri uporabi lijeka Canesten 10 mg/g krema strogo se pridržavajte savjeta navedenih u nastavku osim ako vam je liječnik savjetovao drugčije. Ako ste u dvojbi, obratite se liječniku ili ljekarniku. Ako se ne budete točno pridržavali uputa, lijek neće pravilno djelovati.

Lijek Canesten 10 mg/g krema namijenjen je samo za uporabu na koži (za dermalnu uporabu).

Dva do tri puta na dan nanesite tanak sloj kreme na oboljele dijelove kože i utrljajte je. Većinom je dovoljna mala količina kreme ($\frac{1}{2}$ cm) za površinu veličine dlana. Prije nanošenja kreme oboljelo mjesto dobro operite i osušite.

Ponavljanje bolesti spriječit ćete ako liječenje nastavite još dva tjedna nakon što nestanu svi znaci bolesti.

Simptomi obično nestaju kod liječenja:

gljivične infekcije ruku, nogu, kože na trupu, pregiba	od 3 do 4 tjedna
infekcije zvane eritrazma	od 2 do 4 tjedna
infekcije zvane pityriasis versicolor	od 1 do 3 tjedna
gljivične infekcije spolnih organa	od 1 do 2 tjedna

Što još možete učiniti za liječenje infekcije?

Donje rublje, odjeću i ručnike koji dođu u dodir s oboljelim dijelom treba zamijeniti svaki dan. To će pomoći u liječenju i spriječiti infekciju drugih dijelova tijela i drugih ljudi.

Ako uzmete više lijeka Canesten 10 mg/g krema nego što ste trebali

Nema podataka da uporaba prevelike količine lijeka Canesten 10 mg/g krema uzrokuje nuspojave.

Ako ste zaboravili koristiti lijek Canesten 10 mg/g krema

Upotrijebite ga odmah kad se sjetite. Nemojte nanositi dvostruku dozu ako ste zaboravili primijeniti prošlu dozu.

Ako prestanete koristiti lijek Canesten 10 mg/g krema

Ako želite posve izlijеčiti infekciju i spriječiti njezino ponavljanje, liječenje ne smijete prekinuti prije vremena ili odmah čim nestanu simptomi infekcije. Ako se za to ipak odlučite, bolest se može ponoviti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Canesten 10 mg/g krema, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi Canesten 10 mg/g krema može izazvati nuspojave.

Na mjestu primjene mogu se javiti mjehuri na koži, nelagoda, bol, otok, iritacija, ljuštenje, svrbež, osip, pečenje, probadanje.

Moguće su reakcije preosjetljivosti po cijelome tijelu, koje su različite jačine. Te reakcije mogu utjecati na kožu (svrbež, crvenilo), disanje (otežano disanje), protok krvi (npr. nizak krvni tlak ili ošamućenost).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Canesten 10 mg/g kremu

Canesten 10 mg/g kremu morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Lijek valja čuvati pri temperaturi do 25°C.

Rok valjanosti i način čuvanja u primjeni: 3 mjeseca od prvog otvaranja.

Canesten 10 mg/g krema se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Canesten 10 mg/g krema sadrži

Djelatna je tvar klotrimazol. 1 g krema sadržava 10 mg klotrimazola.
Pomoćne su tvari benzilni alkohol, cetilpalmitat, cetilni i stearilni alkohol, oktildodekanol, polisorbat 60, sorbitanstearat, pročišćena voda.

Kako lijek Canesten 10 mg/g krema izgleda i sadržaj pakovanja

Krema je bijela i nema mirisa. Pakiranje sadrži 20 g krema u aluminijskoj tubi s membranom i PE zatvaračem na navoj, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet u RH
Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Kern Pharma S.L., 08228 Terrassa (Barcelona), Španjolska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Datum revizije upute

Studeni, 2012.

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet u BiH:

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet u BiH: