

UPUTA O LIJEKU

BAYER LOGO

Canesten® 3 tablete za rodnicu 200 mg clotrimazolum

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu jer sadržava za vas važne podatke!

Lijek je dostupan bez recepta. Usprkos tome morate ga upotrebljavati pažljivo da vam može najbolje koristiti.

- Spremite uputu. Možda ćete je htjeti ponovno pročitati.
- Ako želite dodatne informacije ili savjet, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ako se znakovi vaše bolesti pogoršaju ili ne poboljšaju za 7 dana, posavjetujte se s liječnikom.
- Ako neke od nuspojava postanu ozbiljne ili ako primijetite nuspojave koje ovdje nisu navedene, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Uputa sadržava

1. Što su Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg i za što se koriste
2. Prije nego počnete koristiti lijek Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg
3. Kako koristiti lijek Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg
6. Dodatne informacije

1. Što su Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg i za što se koriste

Lijek Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg spada u ginekološke antimikrobne lijekove. Sadržava ljekoviti sastojak klotrimazol, koji je derivat imidazola sa širokim spektrom protugljivičnoga djelovanja.

Lijek Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg upotrebljava se u bolesnica u dobi od 12. godine života nadalje:

- za liječenje infekcija spolnih organa (vaginitisa) koje uzrokuju gljivice (iz roda kvasnica *Candida*). Znakovi i simptomi takve infekcije: bijeli, sirasti iscјedak. Na vanjskom spolnom organu obično se javljaju svrbež, crvenilo, otečenost i ranice koje peku. Može se također javiti bol pri mokrenju.

Na temelju precizne dijagnoze koju odredi liječnik lijek Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg upotrebljava se također:

- za liječenje infekcija spolnih organa koje izazove parazit *Trichomonas vaginalis* u kombinaciji s drugim peroralnim lijekovima koje propiše liječnik. Znakovi i simptomi takve infekcije: obilan zelenožućkast iscјedak, blaga upala vanjskoga spolnog organa, bol pri mokrenju i bolan spolni odnos;

- za liječenje infekcija koje se javljaju nakon prethodne infekcije, obično zbog invazije gljivica ili bakterija otpornih na primijenjeni lijek (tzv. superinfekcije).

Gljivične infekcije spolnih organa mogu se javiti zbog poremećene prirodne ravnoteže mikroorganizama na sluznicama spolnih organa, a mogu ih izazvati:

- uporaba nekih lijekova (npr. antibiotici, peroralna kontracepcijska sredstva – tablete),
- neke bolesti i stanja (npr. šećerna bolest, menstruacija, trudnoća),
- stres, uporaba agresivnih sredstava za pranje za intimnu njegu i ispiranje rodnice, uporaba donjeg rublja od umjetnih tkanina koje nije dovoljno prozračno.

2. Prije nego počnete koristiti lijek Canesten 3 tablete za rodnici 200 mg

Ukoliko imate vrućicu (temperatura 38°C ili više), bol u donjem dijelu abdomena, bol u ledima, neugodan miris iscjetka iz rodnice, mučninu, krvarenje iz rodnice i / ili bol u ramenu obratite se svom liječniku.

Nemojte uzimati lijek Canesten 3 tablete za rodnici 200 mg:

- ako ste alergični (preosjetljivi) na klotrimazol ili bilo koji sastojak lijeka Canesten 3 tablete za rodnici 200 mg; u tom slučaju prije uporabe lijeka posavjetujte se s liječnikom;
- za vrijeme menstruacije jer možda lijek neće pravilno djelovati.

Budite oprezni s lijekom Canesten 3 tablete za rodnici 200 mg:

- ako upotrebljavate kontracepcijska sredstva od lateksa (npr. dijafragmu ili kondom) jer lijek Canesten 3 tablete za rodnici 200 mg može smanjiti njihovu učinkovitost;
- ako se približava vrijeme kad ćete dobiti menstruaciju; liječenje lijekom Canesten 3 tablete za rodnici 200 mg mora biti završeno prije početka menstruacije.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom Canesten 3 tablete za rodnici 200 mg

Istovremena uporaba lijeka Canesten 3 tablete za rodnici 200 mg i oralnog takrolimusa (FK-506; imunosupresiv) može dovesti do povećane razine takrolimusa u krvi.

Obavijestite svojega liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, pa i onda ako ste ga dobili bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća

Uporaba lijeka Canesten 3 tablete za rodnici 200 mg u prva tri mjeseca trudnoće dopuštena je samo ako vam je tako savjetovao liječnik. Pri uporabi lijeka Canesten 3 tablete za rodnici 200 mg u prva tri mjeseca trudnoće potreban je oprez. U trudnoći ne

preporučujemo uporabu aplikatora, već savjetujemo uporabu tablete za rođnicu bez aplikatora.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pri uporabi lijeka Canesten 3 tablete za rođnicu 200 mg nije primijećen utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako koristiti lijek Canesten 3 tablete za rođnicu 200 mg

Pri uporabi lijeka Canesten 3 tablete za rođnicu 200 mg strogo se pridržavajte uputa za pravilnu uporabu, osim ako vam je liječnik propisao drukčije. Ako se ne budete pridržavali uputa, lijek neće pravilno djelovati.

Lijek je namijenjen odraslim bolesnicama i djevojkama u dobi od 12. godine života nadalje.

Doziranje i trajanje liječenja:

Lijek Canesten 3 tablete za rođnicu 200 mg namijenjen je za vaginalnu primjenu (primjenu u rođnici).

Za liječenje rođnice tri uzastopne večeri tabletu za rođnicu gurnite u rođnicu onako kako je opisano u uputi za pravilnu uporabu.

Simptomi koje uzrokuje gljivična infekcija rođnice obično se poboljšaju u roku od četiri dana od početka liječenja. Ako znaci infekcije posve ne nestanu, ako se stanje pogorša ili se infekcija ponovi, obratite se liječniku.

Ukoliko su kod vašeg partnera prisutni simptomi infekcije (npr. svrbež, upala) on se također mora podvrgnuti liječenju.


Uputa za pravilnu uporabu

Primjena tablete za rođnicu bez aplikatora (pri uporabi u trudnoći)


Tri uzastopne večeri tabletu za rođnicu gurnite opranim rukama što dublje u rođnicu. Najbolje je da pritom ležite na leđima s malo savijenim nogama.

Primjena tablete za rođnicu pomoći aplikatora


1. Najprije izvucite klip aplikatora dok se ne zaustavi. Tabletu za rođnicu namjestite u aplikator tako da zaobljeni dio tablete (približno polovica tablete) viri van. Pritom prstima malo stisnite zaobljeni dio aplikatora.



2. Gurnite aplikator što dublje u rodnicu (najbolje je da pritom ležite na leđima).
3. Klip aplikatora oprezno gurnite do kraja dok se tableta ne smjesti u rodnici. Zatim izvadite aplikator.



4. Nakon uporabe aplikator temeljito operite toplo vodom (ne kipućom).



Upozorenje

Ako je rodница suha, tableta za rodnicu neće se posve otopiti. Iz rodnice će se izlučiti komadići tablete, koje možete vidjeti na donjem rublju. Da biste to izbjegli, preporučujemo da lijek gurnete što dublje u rodnicu. Ako se tableta za rodnicu u jednoj noći potpuno ne otopi, preporučujemo primjenu lijeka Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g.

Tijekom uzimanja lijeka Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg ne biste trebali koristiti tampone, sredstva za ispiranje rodnice, spermicide ili druge vaginalne proizvode.

Ako uzmete više lijeka Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg nego što ste trebali
Nema izvještaja o slučajevima predoziranja lijekom Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg. Ako ste nenamjerno upotrijebili preveliku dozu tableta za rodnicu, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg

Ako ste uvečer zaboravili primijeniti tabletu za rodnicu, upotrijebite je sljedeće jutro, odnosno čim se sjetite. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu tableta za rodnicu da biste nadoknadiili propuštenu dozu.

Ako prestanete koristiti lijek Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg

Ako želite posve izlječiti gljivičnu infekciju i spriječiti njezino ponavljanje, ne smijete prijevremeno završiti liječenje ili odmah kad nestanu simptomi infekcije. Ako se za to ipak odlučite, velika je vjerojatnost da će se bolest ponoviti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg može izazvati nuspojave.

Na mjestu primjene mogu se javiti ljuštenje sluznice, svrbež, osip, otok, nelagoda, pečenje, iritacija i crvenilo. Moguće su također reakcije preosjetljivosti po cijelome tijelu, koje su različite jačine. Te reakcije mogu utjecati na kožu (svrbež, crvenilo), disanje (otežano disanje), protok krvi (npr. nizak krvni tlak ili ošamućenost) te na probavni sustav (mučnina, proljev). Može se javiti i bol u abdomenu.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati lijek Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg

Lijek Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Čuvajte pri temperaturi do 30 °C.

Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što lijek Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg sadrži

Djelatna je tvar klotrimazol. Jedna tabletta za rodnicu sadrži 200 mg klotrimazola. Pomoćne su tvari kalcijev laktat pentahidrat; kukuruzni škrob; krospovidon; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; laktatna kiselina; laktoza hidrat; magnezijev stearat; hipromeloza; celuloza, mikrokristalična.

Kako lijek Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg izgleda i sadržaj pakovanja

Jedna kutija s lijekom Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg sadrži 3 tablete za rodnicu u aluminijskom blisteru i 1 aplikator za primjenu tableta za rodnicu.

Tablete za rodnicu duguljaste su, bijele do žućkaste boje s natpisom NR na jednoj strani i oznakom BAYER na drugoj strani.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka u RH
Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka
Bayer Pharma, 51368 Leverkusen, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Datum revizije upute
Kolovoz, 2012.

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet u BiH:

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet u BiH: