

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA

Tantum Verde pastile s okusom mente benzidaminklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
Ovaj lijek dostupan je bez liječničkog recepta. Ipak, morate ga uzimati oprezno kako biste postigli najbolji učinak.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Obavezno se обратите liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon tri dana.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Tantum Verde pastile s okusom mente i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tantum Verde pastile s okusom mente
3. Kako uzimati Tantum Verde pastile s okusom mente
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Tantum Verde pastile s okusom mente
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Tantum Verde pastile s okusom mente i za što se koriste

Tantum Verde pastile s okusom mente namijenjene su za lokalnu primjenu u ustima. To je lijek iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova (skupina lijekova koji se koriste najčešće za liječenje boli npr. salicilatna kiselina, ibuprofen itd.).

Koriste se za liječenje simptoma bolnih upala i nadražaja u usnoj šupljini i ždrijelu kao što su pečenje, crvenilo, osjećaj natečenosti i problemi s gutanjem.

Pokazuju i lokalno djelovanje na smanjivanje osjetljivosti sluznice (lokalno anestetsko djelovanje).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tantum Verde pastile s okusom mente

Nemojte uzimati Tantum Verde pastile s okusom mente:

- ako ste preosjetljivi (alergični) na djelatnu tvar (benzidaminklorid)
- ako ste preosjetljivi na bilo koju od pomoćnih tvari u sastavu lijeka (pomoćne tvari navedene su u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Budite oprezni s Tantum Verde otopinom za grgljanje

- Uporaba benzidamina nije preporučljiva kod bolesnika koji su preosjetljivi na nesteroidne protuupalne lijekove (vrstu lijekova koji se koriste najčešće za liječenje boli npr. salicilatna kiselina, ibuprofen, diklofenak i sl.)

Drugi lijekovi i Tantum Verde pastile s okusom mente

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

H A L M E D
12 - 05 - 2015
O D O B R E N O

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni, sumnjate na trudnoću, planirate trudnoću ili ako dojite, prije uzimanja Tantum Verde pastila zatražite savjet svog liječnika koji će procijeniti omjer mogućeg rizika i koristi u svakom pojedinačnom slučaju.

Upravljanje vozilima i strojevima

Uporaba lijeka u preporučenim dozama ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Posebna upozorenja

- Zbog mogućnosti gutanja cijelih pastila ne preporučjuju se za upotrebu kod djece ispod šest godina starosti. Kod djece mlađe od dvanaest godina, iz istog razloga preporučuje se uzimanje pastila uz nadzor odrasle osobe.
- Tantum Verde pastile s okusom mente ne sadrže šećer a kao sladilo sadrže aspartam. Stoga ih mogu koristiti dijabetičari i osobe na niskokaloričnim dijetama koje izbjegavaju konzumiranje šećera.
- Sladilo aspartam je izvor fenilalanina. Može biti štetan u osoba s fenilketonurijom.
- U sastavu pastila je izomalt. Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Tantum Verde pastile s okusom mente?

Tri puta dnevno otopiti jednu pastilu u ustima.

Kako bi se postigao maksimalni učinak i korist, preporučuje se polagano otapanje pastile u ustima.

Djeca do 6 godina starosti

Lijek se ne preporuča za djecu do 6 godina starosti.

Djeca od 6-12 godina starosti

Lijek treba primjenjivati uz nadzor odrasle osobe

Napomena: Uvijek uzmite Tantum Verde pastile s okusom mente točno kako je opisano u ovoj uputi ili Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Ne povećavajte navedenu dnevnu dozu bez savjetovanja s liječnikom.

Trajanje liječenja

Lijek uzimajte po potrebi, u bilo koje doba dana.

Ne uzimajte lijek duže od sedam dana.

Kod malog broja bolesnika mogu se pojaviti i teži oblici čireva u usnoj šupljini i ždrijelu. U takvim slučajevima bolesnik mora odmah potražiti pomoć liječnika ili stomatologa.

Ukoliko se tegobe ponovno pojave, ili ukoliko ste primijetili bilo kakve promjene s ranije opisanim karakteristikama (vidijeti poglavlje 2.), koje su se kod Vas nedavno pojavile, obratite se liječniku.

Ako uzmete više Tantum Verde pastile s okusom mente nego što ste trebali

Dosad nije primijećen i zabilježen niti jedan slučaj predoziranja pastilama.

U slučaju gutanja/slučajnog uzimanja Tantum Verde pastila u dozi većoj od propisane, odmah potražite pomoć liječnika, ili se uputite u najbližu bolnicu. Sa sobom ponesite i ovu uputu o lijeku.

Kod predoziranja je potrebno isprazniti sadržaj želuca, izazivanjem povraćanja i ispiranjem želuca; također je potrebno osigurati odgovarajuću nadoknadu tekućine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave koje su zabilježene, navedene su prema učestalosti:

Manje često (javlja se u 1-10 na 1 000 bolesnika): preosjetljivost kože na sunčevu svjetlu (uzrokuje osip i opekline od sunca)

Rijetko (javlja se u 1-10 na 10 000 bolesnika): osjećaj pečenja i suhoća u ustima. Ako Vam se to dogodi, pokušajte smanjiti taj učinak ispijajući čašu vode; reakcije preosjetljivosti -alergijske reakcije (osip ili svrbež)

Vrlo rijetko (javlja se u manje od 1 na 10 000 bolesnika): iznenadna otekлина usana/grla i sluznice usne šupljine (angioedem); otežano disanje (laringospazam)

Nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka): ozbiljne alergijske reakcije (anafilaktičke reakcije), lokalni gubitak osjeta sluznice usne šupljine

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Tantum Verde pastile s okusom mente?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte na temperaturi do 25°C, u originalnom pakiranju.

Sačuvajte kutijicu i uputu o lijeku, kako bi vam podaci o lijeku uvijek bili dostupni.

Rok valjanosti lijeka naveden je na pakiranju. Taj datum vrijedi za neotvoreno i pravilno čuvano pakiranje lijeka.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tantum Verde pastile s okusom mente sadrže

Jedna Tantum Verde pastila s okusom mente sadržava 3 mg benzidaminklorida (što odgovara 2,68 mg benzidamina)

Pomoćne tvari: aspartam (E951); izomalt (E953); citratna kiselina hidrat; levomentol; aroma mente; aroma paprene metvice; boje kinolin žuta (E104) i indigotin (E 132).

Kako Tantum Verde pastile s okusom mente izgledaju i sadržaj pakiranja

Pastile su prozirno, zelene boje, četvrtastog oblika s udubljenjem u sredini i karakterističnim okusom mente.

Jedno originalno pakiranje Tantum Verde pastila sadrži 20 pastila.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Clinres Nova d.o.o.
Kneza Višeslava 11
10000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka:

A.C.R.A.F. S.p.A.
Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona
Italija

Pierre Fabre Medicament Production
Site Diététique et Pharmacie
Zone Industrielle de la Coudette
32290 Aignan
Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Izdaje se bez recepta, u ljekarnama.

Ova uputa je zadnji put revidirana u svibnju 2015.