

## Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

### Plimycol 200 mg tablete za rodnicu klotrimazol

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

#### Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Plimycol tablete za rodnicu i za što se koriste?
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu?
3. Kako primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Plimycol tablete za rodnicu?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### 1. Što su Plimycol tablete za rodnicu i za što se koriste?

Lijek Plimycol tablete za rodnicu pripada u ginekološke protugljivične lijekove.

Sadržava djelatnu tvar klotrimazol, lijek iz skupine protugljivičnih lijekova koji se nazivaju imidazoli.

Plimycol tablete za rodnicu koriste se u odraslih žena i adolescentica u dobi između 16 i 60 godina za liječenje kandidijaze rodnice (gljivične infekcije rodnice uzrokovane gljivicama iz roda kvasnica *Candida*).

Tablete se primjenjuju u rodnicu tijekom tri uzastopna dana.

#### 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu?

##### Nemojte primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu:

- ako ste alergični na klotrimazol ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- tijekom menstruacije

#### Upozorenja i mjere opreza

##### Prije liječenja Plimycol tableta za rodnicu morate se obratiti svom liječniku:

- ako se infekcija kandidom pojavila više od 2 puta u posljednjih 6 mjeseci
- ako ste vi ili vaš partner ikada imali spolno prenosivu bolest
- ako ste trudni, sumnjate na trudnoću ili nastojite zatrudnjeti
- ako ste mlađi od 16 ili stariji od 60 godina
- ako ste alergični na vaginalne pripravke protiv gljivica
- ako osjećate bolove u donjem dijelu trbuha ili imate bolno mokrenje
- ako imate iscjedak iz rodnice neugodnog mirisa
- ako imate sukrvavi iscjedak iz rodnice
- ako imate poremećeno ili neredovito krvarenje iz rodnice
- ako imate ikakve ranice, čireve ili mjehuriče na stidnici ili rodnici
- ako imate vrućicu ili zimicu

Ako nakon primjene lijeka dođe do nuspojava povezanih s liječenjem (crvenila, nadražaja ili oticanja), morate se obratiti svom liječniku.

**Poseban oprez s Plimycol tabletama za rodnicu potreban je:**

- ako koristite kontraceptivna sredstva od lateksa, poput kondoma i dijafragmi jer Plimycol tablete za rodnicu mogu smanjiti njihovu učinkovitost.
- ako se približava vrijeme kad ćete dobiti menstruaciju; liječenje Plimycol tabletama za rodnicu mora biti završeno prije početka menstruacije;

**Drugi lijekovi i Plimycol tablete za rodnicu**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Istodobna primjena Plimycol tableta za rodnicu i oralnog takrolimusa (lijeka za potiskivanje imuniteta) može dovesti do povećane razine takrolimusa u krvi.

**Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Plimycol tablete za rodnicu se smiju koristiti tijekom trudnoće samo pod nadzorom liječnika.

Plimycol tablete za rodnicu mogu se koristiti tijekom dojenja, ali samo nakon savjetovanja s liječnikom.

**Upravljanje vozilima i strojevima**

Primjena Plimycol tablete za rodnicu nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

**Plimycol tablete za rodnicu sadrže laktozu**

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

**3. Kako primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu?**

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Plimycol tablete za rodnicu namjenjene su odraslim ženama i adolescenticama u dobi između 16 i 60 godina.

Plimycol tablete za rodnicu namjenjene su za primjenu u rodnicu.

Cijeli postupak liječenja sastoji se od primjene 1 tablete uvečer u rodnicu tijekom tri uzastopna dana. Tabletu je potrebno što je moguće dublje umetnuti u rodnicu. Najbolje je da pritom ležite na leđima s blago savijenim nogama.

Trodnevno liječenje obično je dostatno za liječenje gljivične infekcije rodnice.

Ako se ne osjećate bolje ili se osjećate lošije nakon 7 dana te u slučaju ponovnog javljanja infekcije unutar 2 mjeseca potrebno je potražiti savjet liječnika.

Liječenje se prema preporuci liječnika može ponoviti.

Tijekom liječenja Plimycol tabletama za rodnicu preporučuje se suzdržavati od spolnih odnosa zbog moguće infekcije partnera ili ponavljanja infekcije kod Vas. Ako su kod Vašeg partnera prisutni simptomi infekcije (npr. svrbež, upala) on se također mora podvrgnuti liječenju.

Tijekom uporabe Plimycol tableta za rodnicu nemojte koristiti tampone, sredstva za ispiranje rodnice, spermicide ili druge proizvode za primjenu u rodnicu.

### **Primjena u djece**

Plimycol tablete za rodnicu ne smiju se primjenjivati u osoba mlađih od 16 godina.

### **Ako primijenite više Plimycol tableta za rodnicu nego što ste trebali**

Vjerojatnost primjene prekomjerne doze Plimycol tableta za rodnicu je vrlo mala. Ako ste slučajno upotrijebili preveliku dozu tableta za rodnicu, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

### **Ako ste zaboravili primijeniti Plimycol tabletu za rodnicu**

Ako ste uvečer zaboravili primijeniti tabletu za rodnicu, upotrijebite je sljedeće jutro, odnosno čim se sjetite. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Rijetko (javljaju se u jednog do 10 bolesnika na 10 000 bolesnika):

- nadražaj
- pečenje
- bol.

Nepoznato (na temelju dostupnih podataka ne može se odrediti učestalost):

- svrbež;
- crvenilo;
- reakcije preosjetljivosti

### Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati Plimycol tablete za rodnicu?**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C, zaštićeno od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili blisteru iza oznake „Rok valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Plimycol tablete za rodnicu sadrže?**

Djelatna tvar je klotrimazol. Jedna tableta za rodnicu sadrži 200 mg klotrimazola.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat; kukuruzni škrob; karmelozanatrij; želatina; glicerol; natrijev

škroboglikolat, vrste A; magnezijev stearat.

**Kako Plymicol tablete za rodnicu izgledaju i sadržaj pakiranja?**

Plymicol tablete za rodnicu su bijele tablete za rodnicu s jedne strane označene nazivom PLIVA.

Plymicol tablete za rodnicu su dostupne u pakiranjima od 3 tablete u blisteru, u kutiji.

**Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

**Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2016.**