

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Bronchostop sprej za usnu sluznicu

tekući ekstrakt timijanove zeleni, tekući ekstrakt kaduljinog lista

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Bronchostop sprej za usnu sluznicu i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bronchostop sprej za usnu sluznicu?
3. Kako primjenjivati Bronchostop sprej za usnu sluznicu?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Bronchostop sprej za usnu sluznicu?
6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

1. Što je Bronchostop sprej za usnu sluznicu i za što se koristi?

Bronchostop sprej za usnu sluznicu je tradicionalni biljni lijek za liječenje simptoma upale u usnoj šupljini i ždrijelu uzrokovanih prehladom.

Bronchostop sprej za usnu sluznicu je tradicionalni biljni lijek za primjenu kod naznačenih indikacija temeljenih na iskustvu iz dugotrajne uporabe.

Bronchostop sprej za usnu sluznicu namijenjen je za odrasle osobe starije od 18 godina.

Bronchostop sprej za usnu sluznicu se ne smije primjenjivati neprekidno dulje od 7 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bronchostop sprej za usnu sluznicu?

Nemojte primjenjivati Bronchostop sprej za usnu sluznicu

- ako ste alergični na timijan, kadulju ili neku od biljnih vrsta iz porodice usnatice (*Lamiaceae*) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Nemojte primijeniti u oči i nos.

Nemojte primijeniti na otvoreni plamen.

Nemojte primjenjivati na ranice u ustima.

U slučaju nedostatka daha te pojave vrućice ili gnojnog ispljuvka morate se javiti Vašem liječniku.

Djeca i adolescenti

Primjena u djece i adolescenata mlađih od 18 godina se ne preporuča radi nedostatnih podataka o primjeni.

Drugi lijekovi i Bronchostop sprej za usnu sluznicu

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta.

isu provedena ispitivanja interakcije Bronchostop spreja za usnu sluznicu s drugim lijekovima. Uporaba lijekova koji sadrže kadulju može djelovati na učinak lijekova koji djeluju putem GABA receptora, kao što su barbiturati i benzodiazepini, iako navedeno nije klinički dokazano. Ne preporuča se istovremeno uzimati Bronchostop sprej za usnu sluznicu i navedene lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Primjena u trudnica ili dojilja se ne preporuča radi nedostatnih podataka o primjeni.

Upravljanje vozilima i strojevima

Primjena može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Ako primjenjujete Bronchostop sprej za usnu sluznicu ne bi trebali upravljati vozilima i strojevima.

Bronchostop sprej za usnu sluznicu sadrži etanol.

Ovaj lijek sadrži malu količinu etanola (alkohol), manje od 100 mg po raspršivanju. Nemojte primijeniti Bronchostop sprej za usnu sluznicu ako ste ovisni o alkoholu.

3. Kako primjenjivati Bronchostop sprej za usnu sluznicu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli:


Ako Vam liječnik nije drugačije propisao, raspršite 1–2 puta u usnu šupljinu i ždrijelo, na bolna mjesta, 2-4 puta dnevno.

Primjena u djece i adolescenata

Primjena u djece i adolescenata mlađih od 18 godina se ne preporučuje radi nedostatnih podataka.

Kako primijeniti Bronchostop sprej za usnu sluznicu

- Okrenite nastavak za raspršivanje pod pravi kut u odnosu na bočicu (vidjeti crtež).
- Usmjerite vrh nastavka za raspršivanje prema željenom mjestu primjene u usnoj šupljini. Čak i teško dostupna mjesta mogu se lako dosegnuti nastavkom za raspršivanje. Raspršite 1-2 puta u usnu šupljinu i ždrijelo, na bolna mjesta, 2-4 puta dnevno.
- Vratite nastavak za raspršivanje u početni položaj. (vidjeti crtež).



Ako primijenite više Bronchostop spreja za usnu sluznicu nego što ste trebali

Slučajevi predoziranja su zabilježeni prilikom uzimanja doze kaduljinog eteričnog ulja koja odgovara količini većoj od 15 grama listova kadulje.

Pri tome su zabilježeni simptomi:

- osjećaj topline
- ubrzani rad srca
- vrtoglavica
- napadaji.

U slučaju prekoračenja propisane doze posavjetujte se sa liječnikom, koji će odrediti je li potrebno poduzeti odgovarajuće mjere.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. Reakcije preosjetljivosti (uključujući jedan slučaj anafilaktičnoga šoka i jedan slučaj Quinckeovog edema), kao i želučani poremećaji, uočeni su u lijekova koji sadrže timijanovu zelen. Učestalost nije poznata.

Obzirom na sadržaj alkohola, u rijetkim slučajevima mogući je privremeni osjećaj žarenje na upaljenim mjestima.

Učestalost nuspojava nije poznata.

Prijavlivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#). Prijavlivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Bronchostop sprej za usnu slunicu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C.

Ovaj lijek se ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici .

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan u navedenog mjeseca.

Nakon prvog otvaranja: čuvati 8 tjedana na temperaturi ispod 25 °C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bronchostop sprej za usnu sluznicu sadrži?

Djelatne tvari su tekući ekstrakt timijanove zeleni i tekući ekstrakt kaduljinog lista.

1 g otopine sadrži: 0,32 g ekstrakta (kao tekući ekstrakt) iz *Thymus vulgaris* L. i/ili *Thymus zygis* L., herba (timijanova zelen) (1 : 4-6); ekstrakcijsko otapalo: etanol 70 % V/V i 0,32 g ekstrakta (kao tekući ekstrakt) iz *Salvia officinalis* L., folium (kaduljin list) (1 : 4-6); ekstrakcijsko otapalo: etanol 70 % V/V.

Druge pomoćne tvari su:

tekući ekstrakt lista paprene metvice(sadrži etanol); levomentol; saharinnatrij (E 954); hidroksipropilceluloza; etanol (alkohol); voda, pročišćena.

Jednim potiskom pumpice (126 mg odnosno 0,14 ml otopine) oslobađa se 40,3 mg tekućeg ekstrakta timijanove zeleni i 40,3 mg tekućeg ekstrakta kaduljinog lista.

Kako Bronchostop sprej za usnu sluznicu izgleda i sadržaj pakiranja?

Bistra, smeđa otopina, karakteristična mirisa (na paprenu metvicu).

15 ml otopine u smeđoj staklenoj bočici s plastičnom pumpicom raspršivača i plastičnim nastavkom za raspršivanje, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21, 1160 Beč

Austrija

<logo nositelja odobrenja>

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Oktal Pharma d.o.o.

Utinjska 40

10 020 Zagreb

Tel: 01/6595 777

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje se bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u travnju 2019.