

## UPUTA O LIJEKU

### A. Vogel Echinaforce forte tablete

Echinaceae purpureae herbae recentis tinctura

Echinaceae purpureae radicis recentis tinctura

#### Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije početka primjene A. Vogel Echinaforce forte tableta

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
- Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
- Ovaj lijek propisan je Vama osobno i nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i kada su njihovi simptomi isti kao Vaši.
- O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

#### U ovoj uputi:

1. Što su A. Vogel Echinaforce forte tablete i za što se koriste
2. Prije nego počnete uzimati A. Vogel Echinaforce forte tablete
3. Kako uzimati A. Vogel Echinaforce forte tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati A. Vogel Echinaforce forte tablete
6. Dodatne informacije

### 1. ŠTO SU A. VOGEL ECHINAFORCE FORTE TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE

A. Vogel Echinaforce forte tablete su biljni lijek za pomoć pri liječenju i prevenciji simptoma obične prehlade kao što su kašalj, suzenje očiju, grlobolja, glavobolja te bol u mišićima. Za poboljšanje fizičke otpornosti pri osjetljivosti na običnu prehladu, prehladu popraćenu vrućicom i ponavljamajućim infekcijama.

### 2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI A. VOGEL ECHINAFORCE FORTE TABLETE

#### Nemojte uzimati A. Vogel Echinaforce forte tablete:

- ako imate od ranije poznatu preosjetljivost na djelatnu tvar, na biljke iz porodice glavočika (*Asteraceae (Compositae)*) ili bilo koju pomoćnu tvar.
  - ako bolujete od neke progresivne sistemske bolesti, autoimune bolesti, bolesti imunološkog sustava ili bolesti bijelih krvnih stanica.
- A. Vogel Echinaforce forte tablete se ne smiju davati djeci mlađoj od godinu dana.

#### Budite oprezni s A. Vogel Echinaforce forte tabletama:

- ako ste skloni alergijama. U tom slučaju potražite savjet svog liječnika prije početka primjene lijekova koji sadrže purpurnu rudbekiju (*Echinaceu*).
- Ovaj proizvod sadrži laktuzu. Ukoliko imate rijetku nasljednu bolest nepodnošenja galaktoze, nedostatak enzima Lapp laktaze ili malapsorpciju glukoze-galaktoze u tom slučaju ne bi trebali uzimati ovaj lijek.
- Ovaj proizvod sadrži sojine polisaharide pa ako ste alergični na kikiriki ili soju u tom slučaju ne bi smjeli koristiti ovaj lijek.

#### Uzimanje drugih lijekova s A. Vogel Echinaforce forte tabletama

Nije zabilježeno da A. Vogel Echinaforce forte tablete utječu na djelovanje drugih lijekova.

#### Trudnoća i dojenje

Iako nisu zabilježeni štetni učinci na trudnoću ili zdravlje fetusa/novorođenčeta, zbog nedostatnih podataka o mogućim štetnim učincima, ne preporučuje se primjena ovog lijeka tijekom trudnoće i dojenja, osim ukoliko Vam to nije preporučio Vaš liječnik.

## **Upravljanje vozilima i strojevima**

Nema podataka o utjecaju na upravljanje vozilima i rad na strojevima.

## **Ostala upozorenja**

Ukoliko tijekom primjene A. Vogel Echinaforce forte tableta dođe do pogoršanja simptoma ili se pojavi visoka temperatura, javite se svome liječniku ili ljekarniku.

## **3. KAKO UZIMATI A. VOGEL ECHINAFORCE FORTE TABLETE**

S primjenom ovog lijeka u svrhu liječenja treba započeti čim se zamijete prvi znakovi obične prehlade.

### **Doziranje**

#### Adolescenti stariji od 12 godina, odrasli i starije osobe:

Za liječenje: 2-3 x 1 tableta dnevno

Za prevenciju: 2 x 1 tableta dnevno

#### Djeca (između 6 i 12 godina starosti):

Za liječenje: 1-2 x 1 tableta dnevno

Za prevenciju: 1 x 1 tableta dnevno

Ne smiju ga koristiti djeca mlađa od godinu dana.

Niti u prevenciji niti u liječenju A. Vogel Echinaforce forte tablete se ne bi smjele koristiti neprekidno dulje od 8 tjedana.

Ako simptomi traju dulje od 14 dana, posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Samo za oralnu primjenu.

Tablete je potrebno uzeti prije obroka s malo vode ili ih otopiti u ustima.

### **Ako uzmete više A. Vogel Echinaforce forte tableta nego što ste trebali**

Do sada nije prijavljen niti jedan slučaj predoziranja ovim lijekom.

Ukoliko Vam se čini da ste uzeli preveliku količinu javite se liječniku.

### **Ako ste zaboravili uzeti A. Vogel Echinaforce forte tablete**

Ako ste zaboravili uzeti redovnu dozu A. Vogel Echinaforce forte tableta, pričekajte i uzmite slijedeću dozu prema uobičajenom vremenskom rasporedu.

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako bi nadoknadili preskočenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom A. Vogel Echinaforce forte tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

## **4. MOGUĆE NUSPOJAVE**

Kao i svi drugi lijekovi A. Vogel Echinaforce forte tablete mogu izazvati nuspojave.

Iz dostupnih podataka ne može se procijeniti učestalost nuspojava.

U pojedinačnim slučajevima mogu se pojaviti reakcije preosjetljivosti sa znakovima kao što su osip, svrbež, Stevens-Johnsonov sindrom (teške reakcije preosjetljivosti na koži), Quinckeov edem (oticanje usnica, jezika, lica i vrata, oticanje tijela npr. ruku), otežano disanje, astma a u pojedinačnim slučajevima i anafilaktički šok (teška reakcija preosjetljivosti).

Ako se javi bilo koji od navedenih znakova preosjetljivosti, prestanite uzimati A. Vogel Echinaforce forte tablete i hitno otidite u najbližu bolnicu.

Smanjenje broja bijelih krvnih stanica (leukocita) može se javiti nakon dugotrajne primjene (dulje od 8 tjedana).

Prijavljeni su učinci na autoimune bolesti, bolesti kod kojih tijelo napada svoje vlastite stanice kao što su encefalitis (upala mozga), eritema nodozum (crvenilo kože sa čvorićima), imunotrombocitopenija (smanjen broj krvnih pločica), Evansov sindrom (istodobno razaranje crvenih krvnih stanica i krvnih pločica) i Sjörgenov sindrom (kronična sustavna upalna bolest sa znakovima kao što su suhoća usta, očiju i drugih sluznica) uz poremećaj tubularne funkcije bubrega.

Za očekivati je da učestalost, vrsta i težina nuspojava kod djece odgovara onima zabilježenim kod odraslih.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

## **5. KAKO ČUVATI A. VOGEL ECHINAFORCE FORTE TABLETE**

A. Vogel Echinaforce forte tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Neotvoreni lijek se može čuvati 3 godine, na suhom i pri temperaturi do 25 °C.  
Nakon otvaranja lijek treba iskoristiti unutar 3 mjeseca.

A. Vogel Echinaforce forte tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

## **6. DODATNE INFORMACIJE**

### **Što A. Vogel Echinaforce forte tablete sadrže**

#### **Djelatne tvari:**

1 tableta sadržava 1140 mg tinkture (kao suhi ekstrakt) iz *Echinacea purpurea* (L.) Moench, herba recens (svježa zelen purpurne rudbekije) (1:12) i 60 mg tinkture (kao suhi ekstrakt) iz *Echinacea purpurea* (L.) Moench, radix recens (svježi korijen purpurne rudbekije) (1:11);  
ekstrakcijsko otapalo: etanol 65 % V/V

**Pomoćne tvari:** laktoza hidrat, preželatinirani škrob, sojini polisaharidi, magnezijev stearat.

#### **Kako A. Vogel Echinaforce forte tablete izgledaju i sadržaj pakovanja**

A. Vogel Echinaforce forte tablete su okrugle, bikonveksne, zelenkaste tablete aromatskog mirisa i aromatskog, slatkog i anestezirajućeg okusa.

A. Vogel Echinaforce forte tablete su dostupne u sljedećim pakovanjima:

30 ili 40 tableta u smedoj staklenoj bočici s pokrovom od aluminijске folije i sa sigurnosnim aluminijskim zatvaračem, u kutiji.

#### **Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka**

Salveo d.o.o.  
Zavrtnica 17  
10000 Zagreb  
Hrvatska

**Ime i adresa proizvodača lijeka**

Biohorma B.V.

J.P. Broekhovenstraat 16

8081 HC Elburg

Nizozemska

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

**Datum revizije upute**

Svibanj 2014.