

UPUTA O LIJEKU

A. Vogel Echinaforce oralne kapi

Echinaceae purpureae herbae recentis tinctura
Echinaceae purpureae radicis recentis tinctura

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije početka primjene A. Vogel Echinaforce kapi

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
- Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
- Ovaj lijek propisan je Vama osobno i nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i kada su njihovi simptomi isti kao Vaši.
- O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1. Što su A. Vogel Echinaforce kapi i za što se koriste
2. Prije nego počnete uzimati A. Vogel Echinaforce kapi
3. Kako uzimati A. Vogel Echinaforce kapi
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati A. Vogel Echinaforce kapi
6. Dodatne informacije

1. ŠTO SU A. VOGEL ECHINAFORCE KAPI I ZA ŠTO SE KORISTE

A. Vogel Echinaforce kapi su biljni lijek za pomoć pri liječenju i prevenciji simptoma obične prehlade kao što su kašalj, suzenje očiju, grlobolja, glavobolja te bol u mišićima. Za poboljšanje fizičke otpornosti pri osjetljivosti na običnu prehladu, prehladu popraćenu vrućicom i ponavljačnim infekcijama.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI A. VOGEL ECHINAFORCE KAPI

Nemojte uzimati A. Vogel Echinaforce kapi:

- ako imate od ranije poznatu preosjetljivost na djelatnu tvar, na biljke iz porodice glavočika (*Asteraceae (Compositae)*) ili bilo koju pomoćnu tvar.
- ako bolujete od neke progresivne sistemske bolesti, autoimune bolesti, bolesti imunološkog sustava ili bolesti bijelih krvnih stanica.

A. Vogel Echinaforce kapi se ne smiju davati djeci mlađoj od godinu dana.

Budite oprezni s A. Vogel Echinaforce kapima:

- ako ste skloni alergijama. U tom slučaju potražite savjet svog liječnika prije početka primjene lijekova koji sadrže purpurnu rudbekiju (*Echinaceu*).
- ovaj proizvod u sebi sadrži 65 vol % etanola (alkohola), što odgovara 11,6 ml piva, odnosno 4,8 ml vina po jednoj dozi, stoga njegovo uzimanje može biti štetno kod osoba koje boluju od alkoholizma.

O ovoj činjenici također treba voditi računa kod njegove primjene u trudnica, dojilja, djece i osoba s povećanim rizikom štetnog djelovanja kao što su bolesnici s oštećenjem jetre ili s epilepsijom.

Ne preporuča se uporaba u djece od 1 do 12 godina, jer u njih nije dokazana učinkovitost pripravka

Uzimanje drugih lijekova uz A. Vogel Echinaforce kapi

Nije zabilježeno da A. Vogel Echinaforce kapi utječu na djelovanje drugih lijekova.

Trudnoća i dojenje

Iako nisu zabilježeni štetni učinci na trudnoću ili zdravlje fetusa/novorođenčeta, zbog nedostatnih podataka o mogućim štetnim učincima, ne preporučuje se primjena ovog lijeka tijekom trudnoće i dojenja, osim ukoliko vam to nije preporučio Vaš liječnik.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka o utjecaju na upravljanje vozilima i rad na strojevima.

Ostala upozorenja

Ukoliko tijekom primjene A. Vogel Echinaforce kapi dođe do pogoršanja simptoma ili se pojavi visoka temperatura, javite se svome liječniku ili ljekarniku.

3. KAKO UZIMATI A. VOGEL ECHINAFORCE KAPI

S primjenom ovog lijeka u svrhu liječenja treba započeti čim se zamijete prvi znakovi obične prehlade.

Doziranje

Adolescenti stariji od 12 godina, odrasli i starije osobe

Za liječenje: 3-5 x 20-25 kapi dnevno

Za prevenciju: 3 x 20 kapi dnevno

Djeca (između 6 i 12 godina starosti):

Za liječenje: 3-5 x 10 kapi dnevno

Za prevenciju: 3 x 10 kapi dnevno

Ne smiju ga koristiti djeca mlađa od godinu dana.

Niti u prevenciji niti u liječenju A. Vogel Echinaforce kapi se ne bi smjele koristiti neprekidno dulje od 8 tjedana.

Ako simptomi traju dulje od 14 dana, posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Samo za oralnu primjenu.

Lijek uzeti s malo vode.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom A. Vogel Echinaforce kapi obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako uzmete više A. Vogel Echinaforce kapi nego što ste trebali

Iako nije prijavljen niti jedan slučaj predoziranja ovim lijekom, ovisno o unesenoj količini mogli bi se očekivati simptomi predoziranja alkoholom.

Ukoliko Vam se čini da ste uzeli preveliku količinu javite se liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti A. Vogel Echinaforce kapi

Ako ste zaboravili uzeti redovnu dozu A. Vogel Echinaforce kapi, pričekajte i uzmite sljedeću dozu prema uobičajenom vremenskom rasporedu.

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako bi nadoknadili preskočenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom A. Vogel Echinaforce kapi obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi A. Vogel Echinaforce kapi mogu izazvati nuspojave.

Iz dostupnih podataka ne može se procijeniti učestalost nuspojava.

U pojedinačnim slučajevima mogu se pojaviti reakcije preosjetljivosti sa znakovima kao što su osip, svrbež, Stevens-Johnsonov sindrom (teške reakcije preosjetljivosti na koži), Quinckeov edem (oticanje usnica, jezika, lica i vrata, oticanje tijela npr. ruku), otežano disanje, astma a u pojedinačnim slučajevima i anafilaktički šok (teška reakcija preosjetljivosti).

Ako se javi bilo koji od navedenih znakova preosjetljivosti, prestanite uzimati A. Vogel Echinaforce kapi i hitno otidite u najbližu bolnicu.

Smanjenje broja bijelih krvnih stanica (leukocita) može se javiti nakon dugotrajne primjene (dulje od 8 tjedana).

Prijavljeni su učinci na autoimune bolesti, bolesti kod kojih tijelo napada svoje vlastite stanice kao što su encefalitis (upala mozga), eritema nodozum (crvenilo kože sa čvorićima), imunotrombocitopenija (smanjen broj krvnih pločica), Evansov sindrom (istodobno razaranje crvenih krvnih stanica i krvnih pločica) i Sjörorgenov sindrom (kronična sustavna upalna bolest sa znakovima kao što su suhoća usta, očiju i drugih sluznica) uz poremećaj tubularne funkcije bubrega.

Za očekivati je da učestalost, vrsta i težina nuspojava kod djece odgovara onima zabilježenim kod odraslih.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI A. VOGEL ECHINAFORCE KAPI

A. Vogel Echinaforce kapi morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Neotvoreni lijek se može čuvati 3 godine, bez posebnih uvjeta čuvanja.
Nakon otvaranja lijek treba iskoristiti unutar 4 mjeseca.

A. Vogel Echinaforce kapi se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što A. Vogel Echinaforce kapi sadrže

Djelatne tvari:

1 ml otopine sadržava 860 mg tinkture iz *Echinacea purpurea* (L.) Moench, herba recens (svježa zelen purpurne rudbekije) (1:12) i 45 mg tinkture iz *Echinacea purpurea* (L.) Moench, radix recens (svježi korijen purpurne rudbekije) (1:11);
ekstrakcijsko otapalo: etanol 65 % V/V

Pomoćne tvari: etanol 96% V/V, pročišćena voda

Kako A. Vogel Echinaforce kapi izgledaju i sadržaj pakovanja

A. Vogel Echinaforce kapi su bistra tekućina maslinaste boje aromatskog mirisa i aromatskog, gorkog i anestezirajućeg okusa.

A. Vogel Echinaforce kapi su dostupne u sljedećim pakovanjima:

50 ili 100 ml otopine u smeđoj staklenoj bočici s umetnutim PE nastavkom za kapanje i PP navojnim zatvaračem, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Salveo d.o.o.
Zavrtnica 17
10000 Zagreb
Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Biohorma B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg
Nizozemska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Datum revizije upute

Svibanj 2014.