

UPUTA O LIJEKU

BAYER LOGO

Canesten[®] 10 mg/ml otopina za kožu clotrimazolum

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu jer sadržava za vas važne podatke!

Lijek je dostupan bez recepta. Usprkos tome morate ga upotrebljavati pažljivo da vam može najbolje koristiti.

- Spremite uputu. Možda ćete je htjeti ponovno pročitati.
- Ako želite dodatne informacije ili savjet, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ako se znaci vaše bolesti pogoršaju ili se ne poboljšaju za 4 tjedna, posavjetujte se s liječnikom.
- Ako bilo koja nuspojava postane teška ili ako primijetite nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Uputa sadržava

1. Što je Canesten 10 mg/ml otopina za kožu i za što se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Canesten 10 mg/ml otopinu z kožu
3. Kako koristiti Canesten 10 mg/ml otopinu za kožu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Canesten 10 mg/ml otopinu za kožu
6. Dodatne informacije

1. Što je Canesten 10 mg/ml otopina za kožu i za što se koristi

Lijek Canesten 10 mg/ml otopina za kožu antimikotik je za lokalno liječenje. Sadržava ljekoviti sastojak klotrimazol, koji djeluje na gljivice i neke druge mikroorganizme.

Lijek Canesten 10 mg/ml otopina za kožu primjenjuje se za liječenje:

- gljivične infekcije stopala (tinea pedum ili »atletsko stopalo«) i ruku (tinea manuum). Infekcija uzrokuje ljuštenje, pojavu mjehurića i odumiranje kože na stopalima, dlanovima i između prstiju. Na oboljelim dijelovima koža je raspucala, mogu se pojaviti svrbež, upala i oteklina;
- gljivične infekcije kože na trupu, udovima, kožnim pregibima (tinea corporis) i u preponama (tinea inguinalis). Infekcija se najčešće očituje kao pojava ovalnih crvenih mrlja koje se šire i na sredini su svjetlije;
- gljivične infekcije kože nazvane pityriasis versicolor. Infekcija uzrokuje nastanak mrlja sa sitnim ljuskama svjetlije, tamnije, žutosmeđe ili ružičaste boje, može se pojaviti i gubitak kožnoga pigmenta (depigmentacija);
- bakterijske infekcije kože nazvane eritrazma. To je dugotrajna (kronična) infekcija koja se očituje kao crvenosmeđe ili ružičaste mrlje i obično se javlja na pregibima kože (ispod pazuha, ispod prsiju ili u preponama).

H A L M E D
04 - 02 - 2011
1 O D O B R E N O

2. Prije nego počnete koristiti Canesten 10 mg/ml otopinu za kožu

Nemojte koristiti lijek Canesten 10 mg/ml otopinu za kožu

- ako ste alergični (preosjetljivi) na klotrimazol ili bilo koji sastojak lijeka Canesten 10 mg/ml otopina za kožu. U tom slučaju posavjetujte se s liječnikom prije uporabe lijeka.

Budite oprezni s Canesten 10 mg/ml otopinom za kožu

- Pazite da lijek ne dođe u kontakt s očima.

Uzimanje drugih lijekova s Canesten 10 mg/ml otopina za kožu

Nije poznato je li moguće međusobno djelovanje između lijeka Canesten 10 mg/ml otopina za kožu i drugih lijekova.

Obavijestite svojega liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, pa i onda ako ste ga dobili bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća

Nisu provedena ispitivanja uporabe lijeka Canesten 10 mg/ml otopina za kožu u trudnica. Ako upotrebljavate lijek Canesten 10 mg/ml otopina za kožu kao što je napisano u ovoj uputi ili kao što vam je preporučio liječnik, odnosno ljekarnik, pojava učinaka na druge organe nije vjerojatna. Usprkos tome uporaba otopine u prva tri mjeseca trudnoće dopuštena je samo ako tako savjetuje liječnik.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Canesten 10 mg/ml otopina za kožu

Lijek Canesten 10 mg/ml otopina za kožu sadržava propilenglikol i izopropilni alkohol, koji mogu izazvati nadraženost kože.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pri uporabi lijeka Canesten 10 mg/ml otopina za kožu nije primijećen utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako koristiti Canesten 10 mg/ml otopinu za kožu

Pri uporabi lijeka Canesten 10 mg/ml otopina za kožu strogo se pridržavajte savjeta navedenih u nastavku osim ako vam je liječnik savjetovao drukčije. Ako ste u dvojbi, obratite se liječniku ili ljekarniku. Ako se ne budete točno pridržavali uputa, lijek neće pravilno djelovati.

Lijek Canesten 10 mg/ml otopina za kožu namijenjen je samo za uporabu na koži (za dermalnu uporabu).

Otopinu nanesite dva do tri puta na dan na oboljele dijelove kože i oprezno je utrljajte. Većinom je dovoljno nekoliko kapi za površinu veličine dlana. Prije nanošenja otopine oboljelo mjesto dobro operite i osušite.

H A L M E D
04 - 02 - 2011
O D O B R E N O

Trajanje liječenja različito je i ovisi o raširenosti te mjestu pojave bolesti. Za potpuno izlječenje važno je da liječenje ne prekinete odmah kad nestanu simptomi infekcije.

Ponavljanje bolesti spriječit ćete ako liječenje nastavite još dva tjedna nakon što nestanu svi znaci bolesti.

Simptomi obično nestaju kod liječenja:

gljivične infekcije ruku, nogu, kože na trupu, pregiba	od 3 do 4 tjedna
infekcije zvane eritrazma	od 2 do 4 tjedna
infekcije zvane pityriasis versicolor	od 1 do 3 tjedna.

Što još možete učiniti za liječenje infekcije?

Donje rublje, odjeću i ručnike koji dođu u dodir s oboljelim dijelom treba zamijeniti svaki dan. To će pomoći u liječenju i spriječiti infekciju drugih dijelova tijela i drugih ljudi.

Ako uzmete više lijeka Canesten 10 mg/ml otopina za kožu nego što ste trebali
Nema podataka da uporaba prevelike količine lijeka Canesten 10 mg/ml otopina za kožu uzrokuje nuspojave.

Ako ste zaboravili koristiti lijek Canesten 10 mg/ml otopina za kožu
Upotrijebite ga odmah kad se sjetite. Nemojte nanositi dvostruku dozu ako ste zaboravili primijeniti prošlu dozu.

Ako prestanete koristiti lijek Canesten 10 mg/ml otopina za kožu
Ako želite posve izliječiti infekciju i spriječiti njezino ponavljanje, liječenje ne smijete prekinuti prije vremena ili odmah čim nestanu simptomi infekcije. Ako se za to ipak odlučite, bolest se može ponoviti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Canesten 10 mg/ml otopine za kožu, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi Canesten 10 mg/ml otopina za kožu može izazvati nuspojave.

Na mjestu primjene mogu se javiti mjehuri na koži, nelagoda, bol, otok, iritacija, ljuštenje, svrbež, osip, pečenje, probadanje. Moguće su reakcije preosjetljivosti po cijelome tijelu, koje su različite jačine. Te reakcije mogu utjecati na kožu (svrbež, crvenilo), disanje (otežano disanje), protok krvi (npr. nizak krvni tlak ili ošamućenost).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Canesten 10 mg/ml otopinu za kožu

Canesten 10 mg/ml otopinu za kožu morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Lijek valja čuvati pri temperaturi do 25°C.

H A L M E D
04 - 02 - 2011
ODOBRENO

Canesten 10 mg/ml otopina za kožu se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Canesten 10 mg/ml otopina za kožu sadrži

Djelatna je tvar klotrimazol. 1 ml otopine sadržava 10 mg klotrimazola.

Pomoćne su tvari makrogol 400, izopropilni alkohol, propilenglikol.

Kako lijek Canesten 10 mg/ml otopina za kožu izgleda i sadržaj pakovanja

Otopina je bistra, bezbojna do blago žućkasta. Pakiranje sadrži 20 ml otopine u plastičnoj bočici s kapaljkom i PE zatvaračem na navoj, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet u RH

Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

KVP Pharma und Veterinaer Produkte GmbH, Kiel, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Datum revizije upute

Siječanj, 2011.

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet u BiH:

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet u BiH:

H A L M E D
04 - 02 - 2011
O D O B R E N O