

UPUTA O LIJEKU

BAYER LOGO

CANESEN 3 krema za rodnicu 20 mg/g klotrimazol

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu jer sadržava za vas važne podatke!

Lijek je dostupan bez recepta. Usprkos tome morate ga upotrebljavati pažljivo da vam može najbolje koristiti.

- Spremite uputu. Možda ćete je htjeti ponovno pročitati.
- Ako želite dodatne informacije ili savjet, obratite se ljekarniku.
- Ako se znakovi vaše bolesti pogoršaju ili ne poboljšaju za 7 dana, posavjetujte se s liječnikom.
- Ako neke od nuspojava postanu ozbiljne ili ako primijetite nuspojave koje ovdje nisu navedene, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Uputa sadržava

1. Što je Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g i za što se koristi
2. Prije nego počnete koristiti lijek Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g
3. Kako koristiti lijek Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g
6. Dodatne informacije

1. Što je Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g i za što se koristi

Lijek Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g spada u ginekološke antimikrobne lijekove. Sadržava ljekoviti sastojak klotrimazol, koji je derivat imidazola sa širokim spektrom protugljivičnoga djelovanja.

Lijek Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g upotrebljava se u bolesnica u dobi od 12. godine života nadalje:

- za liječenje infekcija spolnih organa (vaginitisa) koje uzrokuju gljivice (iz roda kvasnica *Candida*). Znakovi i simptomi takve infekcije: bijeli, sirasti iscjadak. Na vanjskom spolnom organu obično se javljaju svrbež, crvenilo, otečenost i ranice koje peku. Može se također javiti bol pri mokrenju.

Na temelju precizne dijagnoze koju odredi liječnik lijek Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g upotrebljava se također:

- za liječenje infekcija spolnih organa koje izazove parazit *Trichomonas vaginalis* u kombinaciji s drugim peroralnim lijekovima koje propiše liječnik. Znakovi i simptomi takve infekcije: obilan zelenožućkast iscjadak, blaga upala vanjskoga spolnog organa, bol pri mokrenju i bolan spolni odnos;

- za liječenje infekcija koje se javljaju nakon prethodne infekcije, obično zbog invazije gljivica ili bakterija otpornih na primijenjeni lijek (tzv. superinfekcije).

Lijek Canesten 3 krema za rođnicu 20 mg/g upotrebljava se i za liječenje infekcija stidnih usana i predjela oko njih (kandidni vulvitis) te za liječenje upale glavića i kožice muškog uda (kandidni balanitis) koji uzrokuju kvasnice iz roda *Candida*. U muškaraca se infekcija očituje kao sitan bijeli osip, svrbež te blaga upala glavića i kožice spolnog uda.

Gljivične infekcije spolnih organa mogu se pojaviti zbog poremećene prirodne ravnoteže mikroorganizama na sluznicama spolnih organa, a mogu ih izazvati:

- uporaba nekih lijekova (npr. antibiotici, peroralna kontracepcijska sredstva – tablete),
- neke bolesti i stanja (npr. šećerna bolest, menstruacija, trudnoća),
- stres, uporaba agresivnih sredstava za pranje za intimnu njegu i ispiranje rodnice, uporaba donjeg rublja od umjetnih tkanina koje nije dovoljno prozračno.

2. Prije nego počnete koristiti lijek Canesten 3 krema za rođnicu 20 mg/g

Ukoliko imate vrućicu (temperatura 38°C ili više), bol u donjem dijelu abdomena, bol u ledima, neugodan miris iscjetka iz rodnice, mučninu, krvarenje iz rodnice i / ili bol u ramenu obratite se svom liječniku.

Nemojte koristiti lijek Canesten 3 krema za rođnicu 20 mg/g:

- ako ste alergični (preosjetljivi) na klotrimazol ili bilo koji sastojak lijeka Canesten 3 krema za rođnicu 20 mg/g; u tom slučaju prije uporabe lijeka posavjetujte se s liječnikom;
- za vrijeme menstruacije jer možda lijek neće pravilno djelovati.

Budite oprezni s lijekom Canesten 3 krema za rođnicu 20 mg/g:

- ako upotrebljavate kontracepcijska sredstva od lateksa (npr. dijafragmu ili kondom) jer lijek Canesten 3 krema za rođnicu 20 mg/g može smanjiti njihovu učinkovitost;
- ako se približava vrijeme kad ćete dobiti menstruaciju; liječenje lijekom Canesten 3 krema za rođnicu 20 mg/g mora biti završeno prije početka menstruacije.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom Canesten 3 krema za rođnicu 20 mg/g

Istovremena uporaba lijeka Canesten 3 krema za rođnicu 20 mg/g i oralnog takrolimusa (FK-506; imunosupresiv) može dovesti do povećane razine takrolimusa u krvi.

Obavijestite svojega liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, pa i onda ako ste ga dobili bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća

Uporaba lijeka Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g u prva tri mjeseca trudnoće dopuštena je samo ako vam je tako savjetovao liječnik. Pri uporabi lijeka Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g u prva tri mjeseca trudnoće potreban je oprez. U trudnoći ne preporučujemo uporabu aplikatora, već savjetujemo uporabu lijeka Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g bez aplikatora.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pri uporabi lijeka Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g nije primijećen utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako koristiti lijek Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g

Pri uporabi lijeka Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g strogo se pridržavajte uputa za pravilnu uporabu, osim ako vam je liječnik propisao drukčije. Ako se ne budete pridržavali uputa, lijek neće pravilno djelovati.

Lijek je namijenjen odraslim bolesnicama i djevojkama u dobi od 12. godine života nadalje.

Doziranje i trajanje liječenja:

Lijek Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g namijenjen je za vaginalnu primjenu (primjenu u rodnici).

Za liječenje rodnice istisnite po jedno punjenje aplikatora (približno 5 g) što dublje u rodnici tri uzastopne večeri. Najbolje je da pritom ležite na leđima i savijete noge. Pri svakoj uporabi treba uzeti novi aplikator za jednokratnu uporabu.

Za liječenje vanjskih spolnih organa (također i kod muškaraca) nanesite tanak sloj kreme od 2 do 3 puta na dan na vanjske spolne organe (do čmara u žena te na glavić i kožicu u muškaraca) te je utrljajte. Liječenje lijekom Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g obično traje od 1 do 2 tjedna.


Simptomi koje uzrokuje gljivična infekcija rodnice obično se poboljšaju u roku od četiri dana od početka liječenja. Ako znaci infekcije posve ne nestanu, ako se stanje pogorša ili se infekcija ponovi, obratite se liječniku.

Ukoliko su kod vašeg partnera prisutni simptomi infekcije (npr. svrbež, upala) on se također mora podvrgnuti liječenju.


Uputa za pravilnu uporabu

Primjena kreme za rodnicu pomoću aplikatora


1. Otvorite tubu i na nju pričvrstite aplikator.



2. Opreznim stiskanjem tube punite aplikator toliko dugo dok klip ne dođe do kraja.



3. Skinite aplikator s tube, gurnite što dublje u rodnicu (najbolje je da pritom ležite na leđima) i pritiskanjem ga ispraznite.



4. Bacite prazan aplikator.

Ako uzmete više lijeka Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g nego što ste trebali
Nema izvještaja o slučajevima predoziranja lijekom Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g. Ako ste nenamjerno upotrijebili preveliku dozu kreme za rodnicu, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g

Ako ste uvečer zaboravili primijeniti dozu kreme za rodnici, upotrijebite je sljedeće jutro, odnosno čim se sjetite. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu lijeka Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati lijek Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g

Ako želite posve izlječiti gljivičnu infekciju i spriječiti njezino ponavljanje, ne smijete prijevremeno završiti liječenje ili odmah kad nestanu simptomi infekcije. Ako se za to ipak odlučite, velika je vjerojatnost da će se bolest ponoviti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Canesten krema za rodnici, obratite se svom lječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g može izazvati nuspojave.

Na mjestu primjene mogu se javiti ljuštenje sluznice, svrbež, osip, otok, nelagoda, pečenje, iritacija i bol. Moguće su također reakcije preosjetljivosti po cijelome tijelu, koje su različite jačine. Te reakcije mogu utjecati na kožu (svrbež, crvenilo), disanje (otežano disanje), protok krvi (npr. nizak krvni tlak ili ošamućenost) te na probavni sustav (mučnina, proljev). Može se javiti i bol u abdomenu.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti lječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati lijek Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g

Lijek Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Lijek valja čuvati pri temperaturi do 25°C.

Rok valjanosti i način čuvanja u primjeni: 3 mjeseca nakon prvog otvaranja.

Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Canesten 3 krema za rodnici 20 mg/g sadrži

Djelatna je tvar klotrimazol. Jedan gram kreme sadrži 20 mg klotrimazola.

Pomoćne su tvari benzilni alkohol, cetilpalmitat, cetilni i stearilni alkohol, oktildodekanol, polisorbat 60, sorbitanstearat, pročišćena voda.

Kako Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g izgleda i sadržaj pakovanja

Jedna kutija s lijekom Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g sadrži 20 g kreme za rodnicu u aluminijskoj tubi s membranom i PE zatvaračem na navoj i 3 aplikatora. Krema za rodnicu bijela je i bez mirisa.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka u RH

Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Kern Pharma S.L., 08228 Terrassa (Barcelona), Španjolska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Datum revizije upute:

Studeni, 2012.

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet u BiH:

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet u BiH: