

UPUTA O LIJEKU

Peptoran MAX 150 mg filmom obložene tablete

ranitidin

Pažljivo pročitajte ovu uputu, jer sadrži važne informacije.

Iako se lijek ne izdaje na liječnički recept, Peptoran MAX filmom obložene tablete morate pažljivo koristiti kako bi liječenje bilo što djelotvornije.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je morati ponovno pročitati.

Za dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.

Ako se simptomi pogoršavaju ili poboljšanje ne nastupi u roku od 3-4 dana, javite se liječniku.

O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

SADRŽAJ UPUTE

- 1. Što su Peptoran MAX filmom obložene tablete i za što se koriste**
- 2. Prije nego počnete uzimati Peptoran MAX filmom obložene tablete**
- 3. Kako uzimati Peptoran MAX filmom obložene tablete**
- 4. Moguće nuspojave**
- 5. Kako čuvati Peptoran MAX filmom obložene tablete**
- 6. Dodatne informacije**

1. ŠTO SU PEPTORAN MAX FILMOM OBLOŽENE TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE

Ranitidin, djelatna tvar Peptoran MAX filmom obloženih tableta, pripada skupini lijekova koji se nazivaju antagonistima H₂-receptora, a koji smanjuju izlučivanje želučane kiseline.

Želudac normalno izlučuje želučanu kiselinu koja sudjeluje u probavi hrane. Uslijed različitih uzroka može se pretjerano povećati količina izlučene kiseline, što izaziva žareću bol u predjelu želuca (dispepsija, hiperaciditet). Ujedno, kiseli se želučani sadržaj može vraćati u jednjak, što se osjeća kao žgaravica (žareća bol u žličici, iza prsne kosti ili prema vratu).

Peptoran MAX filmom obložene tablete smanjuju prekomjerno izlučivanje želučane kiseline i time uklanjaju uzrok tegoba. Ujedno, smanjuju bazalno dnevno i noćno izlučivanje želučane kiseline te izlučivanje koje potiče hrana i neke druge tvari.

Peptoran MAX filmom obložene tablete utječu na izlučivanje kiseline tijekom 12 sati što osigurava njihov dugotrajan terapijski učinak.

Peptoran MAX filmom obložene tablete možete uzimati:

- ako imate žgaravicu (i ako se ista javlja tijekom noći),
- ukoliko imate tegobe uslijed prevelikog lučenja želučane kiseline (bol i nelagoda u želucu, podrigivanje, nadutost),
- za sprečavanje žgaravice i drugih neugodnih simptoma koje uzrokuje uzimanje hrane i pića.

Ranitidin Europharma MAX filmom obložene tablete su namijenjene osobama starijim od 16 godina.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI PEPTORAN MAX FILMOM OBLOŽENE TABLETE

Nemojte uzimati Peptoran MAX filmom obložene tablete:

- ako ste preosjetljivi (alergični) na ranitidin ili na bilo koji sastojak lijeka
- ako uzimate i druge lijekove za smanjivanje lučenja želučane kiseline, osim ako Vam je liječnik tako propisao.

Upozorenje

Odmah se javite liječniku ukoliko:

- teško gutate,
- povraćate krv ili imate crnu stolicu,
- neočekivano mršavite,
- ako ste slabokrvni.

Terapijski odgovor na liječenje ranitidinom ne isključuje mogućnost težih bolesti probavnog sustava.

Bolesnik se mora javiti liječniku ukoliko se tegobe ne ublaže nakon 7 dana uzimanja Peptoran MAX filmom obloženih tableta i potpuno ne iščeznu unutar dva tjedna ili ako se ponove.

Savjetujte se sa svojim liječnikom prije uzimanja Peptoran MAX filmom obloženih tableta ukoliko:

- Vam je već ustanovljeno oštećenje želuca ili dvanaesnika,

- imate žgaravicu dulje od 3 mjeseca,
- imate težu bolest jetre ili bubrega,
- ste trudni ili namjeravate zatrudnjati,
- trebate elektrostimulator srca ili imate pretjerano usporeni puls,
- imate jako rijetku bolest - porfiriju,
- imate žgaravicu i teško dišete,
- imate bol u prsima,
- pored žgaravice imate i vrtoglavicu, omaglicu i znojite se,
- ako ste srednjih godina ili stariji i ako su se tegobe radi kojih želite uzimati Peptoran MAX filmom obložene tablete pojavile prvi put ili su se promijenile,
- imate neku drugu kroničnu bolest ili uzimate druge lijekove.

Preporuka

Liječenje će biti uspješnije ako izbjegavate alkoholna pića i kavu, masnoće, čokoladu, orahe, začine i drugu hranu ili pića koja Vam uzrokuju tegobe. Ukoliko je potrebno, smanjite tjelesnu težinu. Kada ležite podignite uzglavlje, no izbjegavajte ležanje odmah nakon jela, najbolje neka razmak između jela i počinka bude tri do četiri sata. Ujedno, preporučujemo Vam da prestanete pušiti i da ne nosite usku odjeću.

Uzimanje hrane i pića s Peptoran MAX filmom obloženim tabletama

Lijek možete uzimati uz hranu ili bez nje. Tijekom liječenja ranitidinom savjetujemo Vam da ne pijete alkohol.

Trudnoća i dojenje

Prije nego uzmete bilo koji lijek, savjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

- Ukoliko ste trudni, dojite ili namjeravate zatrudnjati, možete uzimati Peptoran MAX filmom obložene tablete samo iznimno i to samo u osobito nužnim slučajevima po odluci liječnika.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Peptoran MAX filmom obložene tablete ne utječu na smanjenje psihofizičkih sposobnosti. Katkada se mogu pojaviti nuspojave kao pospanost, omaglica i vrtoglavica, te Vam u tom slučaju ne preporučamo upravljanje strojevima ili motornim vozilima.

Uzimanje drugih lijekova s Peptoran MAX filmom obloženim tabletama

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući i lijekove koji se mogu dobiti bez recepta i biljne lijekove, iz razloga što Peptoran MAX filmom obložene tablete mogu utjecati na djelovanje određenih drugih lijekova, kao što i ti drugi lijekovi mogu utjecati na njegovo djelovanje.

Posebno morate reći liječniku ili ljekarniku ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

- nesteroidne protuupalne lijekove za bol i upalu
- lidokain - lokalni anestetik
- propranolol, prokainamid ili n-acetilprokainamid - za srčane probleme
- diazepam - za tjeskobu
- fenitoin - za epilepsiju
- teofilin - za poteškoće s disanjem (astmu)
- varfarin - za razrjeđivanje krvi
- glipizid - za snižavanje razina šećera (glukoze) u krvi
- atazanavir ili delaviridin - za liječenje infekcije HIV-om
- triazolam - za nesanicu
- gefitnib - za rak pluća
- ketokonazol - protugljivični lijek koji se ponekad primjenjuje u liječenju gljivične infekcije vagine (vaginalna kandidijaza).

Budući da je midazolam lijek koji možete dobiti neposredno prije operacije, obavijestite liječnika da uzimate Peptoran MAX filmom obložene tablete prije operacije u slučaju da Vam želi dati midazolam.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od prije navedenog na Vas, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego što počnete uzimati Peptoran MAX filmom obložene tablete.

3. KAKO UZIMATI PEPTORAN MAX FILMOM OBLOŽENE TABLETE

Odrasli i mladi stariji od 16 godina mogu uzimati:

- za ublažavanje tegoba jednu tabletu

- za sprečavanje žgaravice i drugih neugodnih simptoma, koje uzrokuje uzimanje hrane ili pića, jednu tabletu pola sata do jedan sat prije jela ili pića.

U 24 sata smijete uzeti najviše dvije Peptoran MAX filmom obložene tablete (tj. 300 mg ranitidina).

Mladi i djeca koja su mlađa od 16 godina neka ne uzimaju lijek u samostalnom liječenju.

Ukoliko se Vaše tegobe ne ublaže nakon 7 dana uzimanja Peptoran MAX filmom obloženih tableta i potpuno ne nestanu nakon dva tjedna ili se ponove, morate se javiti svom liječniku.

Peptoran MAX filmom obložene tablete možete uzimati bez dogovora s liječnikom najviše 14 dana.

Tablete progutajte cijele s tekućinom.

Ako uzmete više Peptoran MAX filmom obloženih tableta nego što ste trebali

Odmah se savjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Malo je vjerojatno da bi uzimanje većeg broja tableta uzrokovalo trovanje. Prevelike doze mogu uzrokovati prolazne nuspojave, slične onima koje se javе tijekom uobičajene uporabe. U tom slučaju se koriste uobičajeni postupci za odstranjivanje još neapsorbiranog lijeka iz probavnog sustava. Ranitidin se iz tijela odstranjuje uz pomoć hemodijalize.

Ako ste zaboravili uzeti Peptoran MAX filmom obložene tablete

Ukoliko je prošlo malo vremena od termina propisane doze, uzmite tabletu te nastavite terapiju uobičajenim rasporedom. No, ako se sjetite da ste propustili dozu svega nekoliko sati prije nove doze, uzmite samo novu, a propuštenu izostavite. Nikad ne smijete uzimati dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili propuštenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Peptoran MAX filmom obloženih tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi i Peptoran MAX filmom obložene tablete mogu izazvati nuspojave.

Peptoran MAX filmom obložene tablete se općenito dobro podnose. Ukoliko se pojave, nuspojave su uglavnom vrlo rijetke i blage.

Rijetko se kod nekih ljudi mogu javiti alergijske reakcije te prolazne promjene nalaza jetrene funkcije. Opisani su vrlo rijetki slučajevi poremećaja krvne slike, glavobolje, vrtoglavice, smetenosti, depresije, halucinacija, usporenog srčanog rada, prolazne upale jetre, ispadanja kose, bolova u mišićima, te anafilaktičnog šoka.

U slučaju reakcije preosjetljivosti (alergija) može Vam se dogoditi:

- oticanje ruku, nogu, gležnjeva, obraza, usnica, usta ili ždrijela, što može dovesti do tegoba pri gutanju ili disanju,
- osip, koprivnjača,
- nesvjestica,
- žuto obojenje očiju i kože - žutica.

Ako Vam se dogodi bilo koje od gore navedenog, odmah prestanite uzimati Peptoran MAX filmom obložene tablete i o tome neodgodivo obavijestite svog liječnika ili odmah nazovite najbližu bolnicu. To su teške nuspojave koje ukazuju na jako ozbiljnu alergijsku reakciju.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI PEPTORAN MAX FILMOM OBLOŽENE TABLETE PEPTORAN MAX FILMOM OBLOŽENE TABLETE MORATE ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE.

Čuvati pri temperaturi do 25 °C.

Peptoran MAX filmom obložene tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što Peptoran MAX filmom obložene tablete sadrže:

- Djelatna tvar Peptoran MAX filmom obloženih tableta je ranitidin.
- Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg ranitidina u obliku ranitidinklorida.
- Peptoran MAX filmom obložene tablete također sadrže i sljedeće pomoćne tvari: mikrokristalična celuloza, natrijev škroboglikolat, vrste A, koloidni bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat, poli(vinilni alkohol), hidrolizirani, titanijev dioksid (E171), talk, lecitin, ksantanska guma.

Peptoran MAX 150 mg filmom obložene tablete dostupne su u pakovanju od 10 (1x10) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet



PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

Naziv i adresa proizvođača lijeka



PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni

Datum revizije upute

Kolovoz, 2012.