

UPUTA O LIJEKU

Pantexol 5% mast *dekspantenol*

Molim vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete koristiti ovaj lijek.

- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.
- Ako imate još pitanja, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
- Ovaj lijek dostupan je bez recepta za liječenje blažih bolesti za koje nije potrebna liječnička pomoć.

Uputa sadrži:

1. Što je Pantexol mast i za što se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Pantexol mast
3. Kako koristiti Pantexol mast
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Pantexol mast
6. Dodatne informacije

1. Što je Pantexol mast i za što se koristi

Dekspantenol pripada u skupinu cikatrizanata, za lokalnu primjenu.

Lokalno primjenjen dekspantenol koristi se kod:

- mehaničkih oštećenja kože poput ogrebotina, hiperkeratoza (prekomjerno orožnjavanje kože).
- manjih oštećenja ili nakon kirurških zahvata i opekline, s ciljem poticanja epitelizacije kože i/ili povećanja njene vlažnosti i olakšanja njege.
- za njegu izrazito suhe kože kao neutralni izvor masnoće.

Povoljan učinak pokazuje na smanjenje svrbeža i poboljšanje zarastanja blažih dermatoza.

U djece se može primjenjivati kod ogrebotina i blažih kožnih nadražaja (uzrokovanih suncem, ultraljubičastim ili rendgenskim zračenjem).

2. Prije nego počnete koristiti Pantexol mast

Nemojte koristiti Pantexol mast

- ako ste alergični na dekspantenol ili druge sastojke masti.

Budite oprezni s Pantexol masti

Posavjetujte se s liječnikom ako imate neku od kroničnih bolesti, metabolički poremećaj, ako ste alergični ili uzimate još neke lijekove.

Mast je namjenjena isključivo za vanjsku uporabu, a budući da uzrokuje nadražaj oka valja izbjegavati kontakt s očima. Ako dođe do pojave lokalnog kožnog nadražaja, trebate privremeno prekinuti primjenu masti.

Uzimanje drugih lijekova s Pantexol masti

Prije početka korištenja masti, potrebno je obavijestiti svoga liječnika ili ljekarnika ako koristite neke druge lijekove. Također i one lijekove koji vam nisu propisani na liječnički recept.

Interakcije se ne opisuju, budući da se istodobno ne primjenjuju drugi lijekovi na oboljelo mjesto.

Trudnoća i dojenje

Ne postoje podaci o štetnim učincima lokalne primjene dekspantenola tijekom trudnoće i dojenja.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Pantexol mast ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3. Kako koristiti Pantexol mast

Poštujte navedene upute!

Pantexol mast primjenjuje se lokalno na oboljelo područje kože, 1-2 puta na dan, a po potrebi može i češće.

Oboljelo područje kože (ako je upaljeno) prethodno trebate isprati blagim antiseptikom koji ne nadražuje kožu ili mlakom vodom. Zatim, nanesite mast u tankom sloju koji se lagano utrljava u zahvaćena kožna područja.

Ako imate osjećaj da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika.

Ako uzmete više masti nego što ste trebali
Nisu zabilježene tegobe kod prekomjernog korištenja masti.

4. Moguće nuspojave

*Kao i svi ostali lijekovi i **Pantexol mast** može dovesti do nuspojava.*

Moguće su lakše alergijske reakcije.

U slučaju pojave alergijske reakcije potrebno je prekinuti korištenje masti.

O svakoj nuspojavi potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Pantexol mast

Mast treba čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25°C, tubu čuvati čvrsto zatvorenu.

Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti označenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Pantexol mast sadrži

1 g masti sadržava 50 mg dekspantenola.

Pomoćne tvari: Phenonip (fenoksietanol, metilparahidroksibenzoat, butilparahidroksibenzoat, izo-butilparahidroksibenzoat, etilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat), lanolin, vosak bijeli, vazelin bijeli, simetikon, Lanette SX (cetilni i stearilni alkohol, natrijev laurilsulfat, natrijev cetostearilsulfat), Protegin W (vazelin bijeli, ozokerite vosak, ricinusovo ulje hidrogenirano, glicerol monoizostearat, oleata kiselina), propilenglikol, butilhidroksianizol, butilhidroksitoluen, dekametilkiklopentasiloksan, magnezijev sulfat heptahidrat, voda pročišćena.

Sadržaj pakovanja

25 g masti u Al tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Datum revizije upute

Siječanj 2014.