

## Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

### Angal Limun 5 mg + 1 mg pastile

*klorheksidindiklorid, lidokainklorid*

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 4 dana primjene lijeka.

#### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što je Angal Limun i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Angal Limun
3. Kako uzimati Angal Limun
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Angal Limun
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### **1. Što je Angal Limun i za što se koristi**

Angal Limun 5 mg + 1 mg pastile djeluju lokalno u ustima i ždrijelu. Djeluju antiseptički (razara mikroorganizme) i lokalno analgetički (ublažava bolove):

- kod blažih infekcija u usnoj šupljini i ždrijelu.

Bakterijska infekcija s vrućicom zahtjeva dodatne mjere liječenja.

Angal Limun ne sadrži šećere te ga mogu primjenjivati i bolesnici sa šećernom bolesti.

#### **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Angal Limun**

##### **Nemojte uzimati Angal Limun:**

- ako ste preosjetljivi na djelatne tvari ili na bilo koju pomoćnu tvar lijeka ili na lokalne anestetike amidnoga tipa kao što je lidokain
- ako ste dijete mlađe od 6 godina.

##### **Upozorenja i mjere opreza**

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja Angal Limun pastila:

- ako ste skloni reakcijama preosjetljivosti (alergijske reakcije)
- Angal Limun ne smije se uzimati dulje vrijeme, neprekidno ili prečesto. Ograničite primjenu ovog lijeka na nužno ublažavanje boli i iritacija. Ako Vam se stanje ne poboljša ili se čak pogorša nakon 3 do 4 dana primjene lijeka, potrebno je savjetovati se s liječnikom

Obavijestite svog liječnika ako se jedno od gore navedenih upozorenja odnosi na Vas ili je to bio slučaj u prošlosti.

### **Drugi lijekovi i Angal Limun**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Nemojte uzimati Angal Limun istovremeno s drugim antisepticima i anestheticima.

Nemojte uzimati pastile Angal Limun istodobno s lijekovima koji smanjuju djelovanje enzima kolinesteraze (npr. neostigmin, distigmin, piridostigmin) i druge lijekove za liječenje miastenije gravis (autoimuna bolest koja oslabljuje mišiće).

### **Angal Limun s hranom i pićem**

Najmanje 30 minuta nakon primjene lijeka ne bi trebali konzumirati hranu, piće niti prati zube.

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Prije primjene bilo kojeg lijeka posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste trudni ili dojite, nemojte uzimati Angal Limun, osim na preporuku svog liječnika.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Nema posebnih upozorenja.

### **Važna informacija o nekim sastojcima lijeka**

**Angal Limun sadrži sorbitol.** Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije primjene ovog lijeka posavjetujte se sa svojim liječnikom. Sorbitol može imati blagi laksativni učinak (proljevi). Kalorijska vrijednost je 2.6 kcal/g sorbitola, a jedna pastila sadrži 1,2 g sorbitola.

**Angal Limun sadrži aspartam.** Aspartam sadrži fenilalanin te može biti štetan u osoba s fenilketonurijom (metabolički poremećaj kojeg karakterizira povećana razina fenilalanina u krvi).

## **3. Kako uzimati Angal Limun**

Angal Limun uvijek uzimajte točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Ako niste sigurni kako trebate uzimati lijek, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ovaj lijek se ne smije uzimati dulje vrijeme. Posavjetujte se s liječnikom ako se simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 3 do 4 dana.

### **Doziranje**

#### **Odrasli:**

6 do 10 pastila na dan. Otopite pastilu polako u ustima.

#### **Djeca starija od 6 godina:**

3 do 5 pastila na dan. Otopite pastilu polako u ustima.

### **Ako uzmete više Angal Limun pastila nego što ste trebali**

Ako ste uzeli više pastila Angal Limun nego što ste trebali, odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.

Ovaj lijek sadrži samo dio toksične doze. Ako se odgovarajuće uzima, rizik od predoziranja je vrlo malen.

Simptomi predoziranja su: uznemirenost, zujanje u ušima, otežano disanje, poremećaj srčanog ritma, smanjena kontrola refleksa gutanja.

U slučaju uzimanja previsokih doza (više od 20 pastila na dan) mogu se javiti smetnje pri gutanju (smanjena kontrola refleksa gutanja).

**Ako ste zaboravili uzeti Angal Limun**

Nisu potrebe posebne mjere opreza.

**Ako prestanete uzimati Angal Limun**

Nisu potrebe posebne mjere opreza.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Angal Limun pastila, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

#### 4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi i Angal Limun može imati nuspojave, iako se one ne moraju pojaviti u svakoga.

Učestalost nuspojava može biti: vrlo često (u više od 1 na 10 liječenih bolesnika), često (u 1 do 10 na 100 liječenih bolesnika), manje često (u 1 do 10 na 1000 liječenih bolesnika), rijetko (u 1 do 10 na 10000 liječenih bolesnika), vrlo rijetko (u manje od 1 na 10000 liječenih bolesnika), nepoznato (nije poznato koliko se često nuspojava pojavljuje).

*Česte nuspojave (u 1 do 10 na 100 liječenih bolesnika):*

Mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, kožne reakcije preosjetljivosti

*Rijetke nuspojave (u 1 do 10 na 10000 liječenih bolesnika):*

Osip i svrbež nakon primjene lijeka, teške reakcije preosjetljivosti sa znakovima kao što su ljuskasti osip, svrbež, oticanje jezika ili grla, otežano disanje, proljev, vrtoglavica zbog naglog pada krvnog tlaka.

*Nuspojave nepoznate učestalosti:*

pospanost, nesvjestica, dezorijentiranost, zbuđenost (uključujući konfuzno izražavanje), vrtoglavica, psihoza, nervoza, šum u ušima, prekomjerni osjećaj sreće (euforija), mutan vid ili dvoslike, trnci, ukočenost, grčevi, otežano gutanje, rane u ustima, prolazni poremećaj osjeta okusa ili osjećaj pečenja jezika, trzanje ili drhtanje mišića (tremor), osjećaj topline ili hladnoće u ustima, pojačana osjetljivost kože na sunčevu svjetlost ili druge reakcije na koži ili zubima, otežano disanje, brzo i plitko disanje koje postaje sve teže i brže te uzrokuje promjenu boje kože u plavu, nagli izostanak disanja, astma uzrokovana izloženošću ljekovitim tvarima na poslu, osjećaj slabosti i nedostatka energije, krvne promjene na koje upućuju znakovi kao što su glavobolja, vrtoglavica, umor, otežano disanje i plava boja kože.

Kod dugotrajne i neprekidne primjene klorheksidina na cijeloj površini usne šupljine zubi se privremeno mogu obojiti tamnije. To se može otkloniti.

**Ako primijetite bilo koju od dolje navedenih nuspojava, prestanite uzimati Angal Limun i hitno potražite medicinsku pomoć:**

- oticanje ruku, nogu, gležnjeva, lica, usana, usta ili jezika što može uzrokovati otežano gutanje ili disanje,
- kožni osip,
- koprivnjača (urtikarija),
- gubitak svijesti.

Ove nuspojave su ozbiljne, a ukazuju na ozbiljne reakcije preosjetljivosti na lijek. U slučaju njihove pojave potrebne su mjere hitne medicinske pomoći.

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u [Dodatku V](#).

## **5. Kako čuvati Angal Limun**

Lijek treba čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek treba čuvati na temperaturi ispod 25 °C u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti, navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Angal Limun sadrži**

Djelatne tvari: klorheksidindiklorid i lidokainklorid.

Jedna pastila sadrži 5 mg klorheksidindiklorida i 1 mg lidokainklorida.

Pomoćne tvari: sorbitol (E420), magnezijev stearat, aspartam (E951), aroma limuna, acesulfamkalij

### **Kako Angal Limun izgleda i sadržaj pakiranja**

Angal Limun je bijela ili gotovo bijela okrugla pastila okusa limuna.

24 pastile u Al/PVC/PCTFE blisteru, u kutiji.

### **Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet**

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

### **Ime i adresa proizvođača lijeka**

Laboratoria Qualiphar N.V./S.A., Rijksweg 9, 2880 Bornem, Belgija

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

**Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2015.**