

UPUTA O LIJEKU

LUPOCET® 500 mg tablete *paracetamolum*

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu.

Uputu nemojte baciti. Kasnije ćete je možda trebati ponovo pročitati.

Ako trebate dodatne obavijesti, zatražite ih od svog liječnika ili ljekarnika.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi možete pročitati sljedeće:

1. Što je LUPOCET i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati LUPOCET
3. Kako uzimati LUPOCET
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati LUPOCET
6. Dodatne informacije

1. ŠTO JE LUPOCET I ZA ŠTO SE KORISTI

LUPOCET je lijek koji sadrži paracetamol i izdaje bez recepta. Koristi se za snižavanje povišene tjelesne temperature i za ublažavanje boli.

LUPOCET tablete snižavaju povišenu tjelesnu temperaturu i ublažavaju bolove uslijed obične prehlade ili gripe.

LUPOCET tablete prikladne su u liječenju glavobolje (uključujući migrensku i tenzijsku glavobolju), zubobolje, neuralgije (bol izazvana promjenama na živcima), bolova u leđima, reumatskih i mišićnih bolova, blažeg oblika artritisa, bolne mjesečnice i grlobolje.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LUPOCET

Nemojte uzimati LUPOCET tablete ako ste preosjetljivi paracetamol ili neki od pomoćnih sastojaka lijeka.

LUPOCET tablete se ne smiju primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Budite oprezni s LUPOCET tabletama:

- ako imate problema s bubrezima i/ili jetrom
- ako imate oštećenu jetru zbog pretjerane konzumacije alkoholnih pića
- ako istodobno uzimate druge lijekove koji sadrže paracetamol (odmah prekinite njihovu primjenu jer se ne smiju koristiti zajedno s LUPOCET tabletama, vidi Uzimanje drugih lijekova s LUPOCET tabletama).

Obavijestite svog liječnika ako bol, zbog čega uzimate ovaj lijek, traje dulje vremena (npr. dugotrajna, neprekidna glavobolja).

A L¹¹ M P
20 -05- 2010
ODOBRENO

Obavijestite liječnika ako tijekom duljeg razdoblja morate uzimati LUPOCET (npr. zbog ublažavanja boli pri blažim oblicima artritisa).

U slučaju predoziranja potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć, čak i ako nemate nikakve simptome (vidi **Ako uzmete više LUPOCET tableta nego što ste trebali**). Naime, postoji rizik za naknadnu pojavu teškog oštećenja jetre.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Uzimanje drugih lijekova s LUPOCET tabletama

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ukoliko ste zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog liječnika da uzimate LUPOCET tablete, kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Obavijestite liječnika ili ljekarnika o drugim lijekovima koje uzimate jer neki lijekovi mogu ometati djelovanje drugih.

Tijekom primjene LUPOCET tableta **nemojte primjenjivati** neki drugi lijek koji sadržava paracetamol.

Ako uzimate neke od sljedećih lijekova, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije primjene LUPOCET tableta:

- metoklopramid ili domperidon (lijekovi protiv mučnine i povraćanja)
- kolestiramin (lijek za snižavanje kolesterola u krvi, za ublažavanje svrbeža i proljeva u nekim bolestima probavnog sustava)
- antikoagulans (lijek koji sprječava zgrušavanje krvi)
- antiepileptik (lijek za liječenje epilepsije ili padavice)
- barbiturat (lijeka za smirenje, i za liječenje epilepsije ili padavice)
- rifampicin (lijek za liječenje bakterijske infekcije)
- biljni pripravak na bazi gospine trave.

Uzimanje hrane i pića s LUPOCET tabletama

LUPOCET tablete možete uzimati neovisno o obroku.


Ne preporučuje se konzumacija alkoholnih pića tijekom terapije LUPOCET tabletama.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego počnete koristiti bilo koji lijek. Ako ste trudni ili dojite, možete uzimati LUPOCET uz preporuku liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

LUPOCET tablete ne utječu na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.



3. KAKO UZIMATI LUPOCET

Pridržavajte se preporučenog doziranja.

Preporučene doze u odraslih i djece ne smiju se uzimati u razmacima manjima od 4 sata niti više od četiri doze tijekom 24 sata.

Odrasli (uključujući osobe starije od 65 godina) i djeca starija od 12 godina

Uzimajte jednu do dvije tablete 3 do 4 puta dnevno, već prema potrebi. Ne uzimajte više od 8 tableta unutar 24 sata.

U odraslih ne preporučuje se primjena dulje od deset dana bez savjeta liječnika.

Djeca od 6-12 godina

Preporučuje se primjena polovice ili cijele tablete 3 do 4 puta dnevno, već prema potrebi.

LUPOCET tableta ima razdjelni urez koji omogućava lomljenje tablete na dva dijela pri čemu se osigurava da jedna polovica tablete sadrži 250 mg. Ne primjenjujte više od 4 tableta unutar 24 sata.

U djece ne preporučuje se primjena dulje od tri dana bez savjeta liječnika.

Ne preporučuje se primjena u djece mlađe od 6 godina.

Ako ste zaboravili uzeti LUPOCET

Ako ste zaboravili uzeti svoju dozu lijeka, odmah uzmite propuštenu dozu, osim ako nije već vrijeme za sljedeću dozu. Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ako uzmete više LUPOCET tableta nego što ste trebali

Odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom LUPOCET tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi LUPOCET može izazvati nuspojave.

Uz terapijsku dozu lijeka općenito su rijetke nuspojave.

Procjena pojavljivanja nuspojava temelji se na sljedećim parametrima učestalosti:

vrlo često: $\geq 10\%$

često: $\geq 1\% - <10\%$

manje često: $\geq 0,1\% - <1\%$

rijetko: $\geq 0,01\% - <0,1\%$

vrlo rijetko: $< 0,01\%$, uključujući i pojedinačne slučajeve.

Poremećaji imunološkog sustava

Rijetko: Alergijske reakcije.

A L¹¹ M P
20-05-2010
ODOBRENO

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Rijetko: Kožni osip, koprivnjača.

Poremećaji jetre i žuči

Rijetko: Oštećenje jetre.

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

Rijetko: Odstupanja u laboratorijskim pokazateljima bubrežne funkcije (porast kreatinina u krvi)

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Zabilježeni su poremećaji u stvaranju krvnih stanica, uključujući manjak krvnih pločica (trombociti) i bijelih krvnih stanica (leukociti), što se može odraziti kao neuobičajena krvarenja ili učestale infekcije.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI LUPOCET

LUPOCET tablete čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

LUPOCET tablete ne smijete upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo naš okoliš.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što LUPOCET tablete sadrže

Djelatna tvar je paracetamol.

Jedna tableta sadržava 500 mg paracetamola.

Pomoćne tvari su: celuloza, mikrokristalična; povidon; karmelozanatrij, umrežena; talk; magnezijev stearat.

Kako LUPOCET tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

Lupocet tableta je okrugla, bijela, ravna, ukošenih rubova s razdjelnom crtom na jednoj strani.

10 (1x10) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.


20 (2x10) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja/proizvođača lijeka

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica, Hrvatska



Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima.

Datum revizije upute

Travanj 2010.

