

UPUTA O LIJEKU

Brunoq 10 mg filmom obložene tablete

Brunoq 20 mg filmom obložene tablete

lerkanidipin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
- Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1. Što su Brunoq filmom obložene tablete i za što se koriste
2. Prije nego počnete uzimati Brunoq filmom obložene tablete
3. Kako uzimati Brunoq filmom obložene tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Brunoq filmom obložene tablete
6. Dodatne informacije

1. ŠTO SU BRUNOQ FILMOM OBLOŽENE TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE

Brunoq filmom obložene tablete sadrže djelatnu tvar lerkanidipin (u obliku lerkanidipinklorida), a pripadaju skupini lijekova koje nazivamo blokatori ili antagonisti kalcijevih kanala.

Brunoq filmom obložene tablete primjenjuju se za liječenje visokog krvnog tlaka, također poznatog kao hipertenzija, u odraslih osoba starijih od 18 godina (ne preporuča se za djecu u dobi ispod 18 godina).

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI BRUNOQ FILMOM OBLOŽENE TABLETE

Nemojte uzimati Brunoq filmom obložene tablete:

- ako ste **alergični** (preosjetljivi) na lerkanidipin ili na bilo koju pomoćnu tvar lijeka (popis pomoćnih tvari nalazi se u dijelu 6. Dodatne informacije)

- ako ste imali **alergijsku reakciju** na lijekove srodne Brunoq tabletama (poput amlodipina, nikardipina, felodipina, isradipina, nifedipina ili lacidipina)
- ako bolujete od neke od **sljedećih srčanih bolesti**:
 - neliječeno zatajenje srca
 - opstrukcija protoka krvi iz srca
 - nestabilna angina pectoris (angina u mirovanju ili angina koja se progresivno pojačava)
 - ako ste u posljednjih mjesec dana preboljeli srčani udar
- ako imate **tešku bolest jetre ili bubrega**
- ako uzimate lijekove koji inhibiraju izoenzim CYP3A4:
 - lijekove protiv gljivičnih bolesti (kao što je ketokonazol ili itrakonazol)
 - makrolidne antibiotike (npr. eritromicin ili troleandomicin)
 - antivirusne lijekove (npr. ritonavir)
- ako uzimate lijek ciklosporin (koji se koristi nakon transplantacije radi sprječavanja odbacivanja organa)
- s grejpom ili sokom od grejpa
- ako ste trudni, želite ostati trudni ili ste u fertilnoj dobi, a ne rabite kontracepciju, te ako dojite (za dodatne informacije vidi dio "Trudnoća i dojenje").

Budite posebno oprezni s Brunoq filmom obloženim tabletama:

Prije nego što počnete uzimati Brunoq tablete, javite se svom liječniku:

- ako bolujete od određenih bolesti srca s disfunkcijom lijeve klijetke ili imate poremećaj srčanog ritma poput sindroma bolesnog sinus čvora (a nemate elektrostimulator srca (*pacemaker*))
- ako bolujete od angine pectoris. Lerkanidipin može u vrlo rijetkim slučajevima povećati učestalost napadaja, koji mogu trajati dulje i biti teži. U izoliranim je slučajevima zabilježen infarkt miokarda.
- ako imate blagih ili umjerenih problema s jetrom ili bubrezima.

Uzimanje drugih lijekova s Brunoq filmom obloženim tabletama

Obavijestite svojega liječnika:

- ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući i lijekove koji se izdaju bez recepta

- ako uzimate **beta-blokatore**, npr. metoprolol, **diuretike** (tablete za izlučivanje vode) ili **ACE-inhibitore** (lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka)
- ako uzimate **cimetidin** u dozi od više od 800 mg na dan (lijek za čir, probavne smetnje ili žgaravicu)
- ako uzimate **digoksin** (lijek za liječenje srčanih bolesti)
- ako uzimate **midazolam** (lijek za nesanicu)
- ako uzimate **rifampicin** (lijek za liječenje tuberkuloze)
- ako uzimate **astemizol ili terfenadin** (lijekove za alergije)
- ako uzimate **amiodaron ili kinidin** (lijekove za liječenje ubrzanog rada srca)
- ako uzimate **fenitoin ili karbamazepin** (lijekove za epilepsiju). Vaš će liječnik kontrolirati Vaš krvni tlak češće nego uobičajeno.
- ako uzimate **simvastatin** (lijek za snižavanje kolesterola). Brunoq filmom obložene tablete treba uzimati ujutro, a simvastatin uvečer.

Uzimanje hrane i pića s Brunoq filmom obloženim tabletama

Ne smijete **konzumirati alkohol, jesti grejp ili piti sok od grejpa** jer to može pojačati učinak Brunoq filmom obloženih tableta.

Trudnoća i dojenje

Nemojte uzimati Brunoq filmom obložene tablete ako ste trudni ili dojite, ako namjeravate ostati trudni ili ako ne koristite kontracepciju. Ako uzimate Brunoq filmom obložene tablete i mislite da ste trudni, obratite se svom liječniku.

Upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Brunoq filmom obložene tablete zanemarivo utječu na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Ipak, treba ih primjenjivati s oprezom jer mogu uzrokovati omaglicu, slabost i umor. Nemojte upravljati vozilima ili strojevima dok niste sigurni kakav utjecaj Brunoq filmom obložene tablete imaju na Vas.

Ostala upozorenja

Važne informacije o nekim sastojcima Brunoq filmom obloženih tableta

Brunoq filmom obložene tablete sadrže laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, obratite se svom liječniku prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

Brunoq 10 mg filmom obložene tablete sadrže boju tartrazine aluminium lake (E102) koja može uzrokovati alergijske reakcije.

Brunoq 20 mg filmom obložene tablete sadrže boju allura red AC aluminium lake (E129) koja može uzrokovati alergijske reakcije.

3. KAKO UZIMATI BRUNOQ FILMOM OBLOŽENE TABLETE

Uvijek uzimajte Brunoq filmom obložene tablete točno prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Uobičajena doza je jedna Brunoq 10 mg filmom obložena tableta na dan, u isto vrijeme svakog dana, po mogućnosti ujutro, najmanje 15 minuta prije doručka jer obrok bogat masnoćama značajno povećava razinu lijeka u krvi.

Liječnik Vam može savjetovati da, ako je potrebno, povećate dozu na jednu Brunoq 20 mg filmom obloženu tabletu na dan.

Tabletu je najbolje progutati cijelu uz malo vode.

Starije osobe: Nije potrebno prilagođavanje doze. Međutim, treba postupiti s posebnim oprezom kod započinjanja liječenja.

Bolesnici s blagim do umjerenim bolestima jetre ili bubrega: Potreban je poseban oprez na početku liječenja, a osobito pri povećanju dnevne doze na 20 mg.

Djeca: Brunoq filmom obložene tablete ne smiju uzimati djeca i adolescenti u dobi ispod 18 godina.

Ako ste uzeli više Brunoq filmom obloženih tableta nego što trebate.

Nemojte prekoračiti propisanu dozu.

Ako ste uzeli dozu veću od propisane ili u slučaju predoziranja, odmah zatražite savjet liječnika i, ako je moguće, ponesite sa sobom tablete i/ili spremnik (kutiju).

Prekoračenje propisane doze može dovesti do prekomjernog sniženja krvnog tlaka, kao i nepravilnih ili ubrzanih otkucaja srca. Moguće je i povraćanje ili nesvjestica.

Ako ste zaboravili uzeti Brunoq filmom obloženu tabletu

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, jednostavno preskočite tu dozu i nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili tabletu koju ste propustili.

Ako prestanete uzimati Brunoq filmom obložene tablete

Ako prestanete uzimati Brunoq filmom obložene tablete, krvni tlak Vam se može ponovno povisiti. Molimo da se obratite svom liječniku prije nego što prestanete uzimati ovaj lijek.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Brunoq filmom obložene tablete mogu izazvati nuspojave iako se ne moraju pojaviti u svakoga.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne. Ako primijetite neke od sljedećih nuspojava, odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Rijetke nuspojave (pojavljuju se u manje od 1 od 1000 bolesnika):

- angina pektoris (bolovi u prsima zbog nedovoljnog dotoka krvi u srce)

Vrlo rijetke nuspojave (pojavljuju se u manje od 1 od 10 000 bolesnika):

- bolovi u prsima, pad krvnog tlaka, nesvjestica i alergijske reakcije (simptomi uključuju svrbež, osip, urtikariju)

Ako bolujete od angine pektoris, uzimate lijekove iz skupine u koju pripadaju i Brunoq filmom obložene tablete, može se povećati učestalost, trajanje ili jačina napadaja. Zabilježeni su izolirani slučajevi srčanog udara.

Ostale moguće nuspojave:

Manje česte (pojavljuju se u manje od 1 od 100 bolesnika):

- glavobolja, omaglica
- ubrzan rad srca, palpitacije (osjećaj lupanja ili ubrzanog rada srca), oticanje gležnjeva
- naglo crvenilo lica, vrata ili gornjeg dijela prsišta.

Rijetke (pojavljuju se u manje od 1 od 1000 bolesnika):

- izrazita pospanost
- žgaravica, mučnina, proljev, bolovi u želucu, povraćanje
- kožni osip
- bolovi u mišićima
- mokrenje u većoj količini
- umor.

Vrlo rijetke (pojavljuju se u manje od 1 od 10 000 bolesnika):

- oticanje desni
- češće mokrenje
- promjene funkcije jetre (otkriva se krvnim pretragama).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI BRUNOQ FILMOM OBLOŽENE TABLETE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece!

Brunoq filmom obložene tablete ne smiju se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Istek roka valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek čuvajte u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što sadrže Brunoq filmom obložene tablete

Djelatna tvar je lerkanidipinklorid.

Brunoq 10 mg filmom obložena tableta sadrži 10 mg lerkanidipinklorida, što odgovara količini od 9,4 mg lerkanidipina.

Brunoq 20 mg filmom obložena tableta sadrži 20 mg lerkanidipinklorida, što odgovara količini od 18,8 mg lerkanidipina.

Pomoćne tvari:

Jezgra tablete: laktoza hidrat; natrijev škroboglikolat, vrst A (krumpir); celuloza, mikrokristalična; povidon i magnezijev stearat.

Ovojnica tablete:

Tableta od 10 mg - Opadry 03F32418 yellow koji sadrži hipromelozu (E464); titanijev dioksid (E171); boju tartrazine aluminium lake (E102); makrogol 6000; talk i željezov oksid, žuti (E172).

Tableta od 20 mg - Opadry 03F34650 pink koji sadrži hipromelozu (E464); titanijev dioksid (E171); boju allura red AC aluminium lake (E129); makrogol 6000, talk i boju indigo carmine aluminium lake (E132).

Kako Brunoq filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

Brunoq 10 mg filmom obložene tablete su žute do tamno žute boje, okrugle, konveksne, filmom obložene tablete s utisnutom oznakom „10“ na jednoj strani te s razdjelnom crtom na drugoj strani tablete.

Brunoq 20 mg filmom obložene tablete su svijetlo ružičaste do ružičaste boje, okrugle, konveksne, filmom obložene tablete s utisnutom oznakom „20“ na jednoj strani te s razdjelnom crtom na drugoj strani tablete.

Tableta se može podijeliti na jednake polovice.

Brunoq 10 mg i 20 mg filmom obložene tablete dostupne su u pakovanju od:

- 28 (4x7) filmom obloženih tableta u bijelom neprozirnom blisteru (PVC/PVdC//Al), u kutiji
- 30 (3x10) filmom obloženih tableta u bijelom neprozirnom blisteru (PVC/PVdC//Al), u kutiji
- 56 (8x7) filmom obloženih tableta u bijelom neprozirnom blisteru (PVC/PVdC//Al), u kutiji

- 60 (6x10) filmom obloženih tableta u bijelom neprozirnom blisteru (PVC/PVdC//Al), u kutiji

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka



PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka



PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Datum revizije upute

/-