

UPUTA O LIJEKU

MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina

ksilometazolin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke.

Ovaj lijek dostupan je bez liječničkog recepta. Ipak morate ga uzimati oprezno kako biste postigli najbolji učinak.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
- Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Obavezno kontaktirajte liječnika ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 7 dana.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1. **Što je MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina i za što se koristi**
2. **Prije nego počnete uzimati MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu**
3. **Kako uzimati MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu**
4. **Moguće nuspojave**
5. **Kako čuvati MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu**
6. **Dodatne informacije**

1. ŠTO JE MAXIRINO 0,5 MG/ML SPREJ ZA NOS, OTOPINA I ZA ŠTO SE KORISTI

MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina sadrži djelatnu tvar ksilometazolin, koji, primijenjen lokalno, smanjuje otečenost sluznice nosa. Na taj način ublažava simptome začepljenog nosa.

MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina primjenjuje se za privremeno simptomatsko liječenje začepljenosti nosa uzrokovane upalom sluznice nosa (rinitisom) ili upalom sluznice sinusa (sinusitisom).

MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina primjenjuje se za liječenje djece u dobi između 2 i 10 godina starosti.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI MAXIRINO 0,5 MG/ML SPREJ ZA NOS, OTOPINU

Nemojte uzimati MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu:

- ako ste preosjetljivi (alergični) na ksilometazolin ili neki drugi sastojak lijeka (vidjeti dio 6).

- ako ste nedavno bili podvrgnuti kirurškom zahvatu na mozgu ili leđnoj moždini.
- ako imate suhi rinitis (oblik kroničnog rinitisa koji uzrokuje suhu upalu nosne sluznice sa stvaranjem krasta).

MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina ne smije se davati dojenčadi i djeci mlađoj od 2 godine.

Budite posebno oprezni s MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinom

Upitajte liječnika za savjet:

- ako uzimate određene lijekove za depresiju koji se zovu inhibitori monoaminoksidaze (inhibitore MAO) ili neke druge lijekove koji mogu povisiti krvni tlak,
- ako imate koronarnu srčanu bolest ili visoki krvni tlak,
- ako imate tumor srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom),
- ako imate poremećaj metabolizma, npr. pojačanu funkciju štitne žlijezde (hipertireozu) ili šećernu bolest,
- ako imate povećanu prostatu,
- ako imate porfiriju (poremećaj metabolizma koji djeluje na kožu i/ili živčani sustav),
- ako imate povišeni očni tlak, a posebno glaukom uskog kuta. Mora se izbjegavati direktni kontakt s očima.

Dugotrajna primjena lijeka (dulje od 7 dana) može dovesti do kroničnog oticanja nosne sluznice i posljedično do gubitka (atrofije) nosne sluznice.

Ako se nešto od prije navedenog odnosi na Vas ili ako niste sigurni, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Uzimanje drugih lijekova s MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez recepta.

Istovremena primjena MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopine i određenih lijekova za depresiju (inhibitora MAO tralilcipromin tipa ili tricikličkih antidepresiva), kao i lijekova za sniženje visokog krvnog tlaka (antihipertenziva), može dovesti do porasta krvnog tlaka.

Trudnoća i dojenje

Savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

- Budući da ima malo podataka o sigurnosti primjene MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopine tijekom trudnoće i dojenja, lijek smijete primjenjivati samo na preporuku liječnika i samo nakon pažljive procjene rizika i koristi.
- Budući da predoziranje može djelovati na dotok krvi do fetusa/ploda ili dovesti do smanjenog stvaranja mlijeka, tijekom trudnoće i dojenja ne smije se prijeći preporučena doza.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne bi trebao utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. KAKO UZIMATI MAXIRINO 0,5 MG/ML SPREJ ZA NOS, OTOPINU

MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu uvijek uzimajte točno prema informacijama sadržanim u ovoj Uputi o lijeku.

Ako niste sigurni kako uzimati lijek, pitajte liječnika ili ljekarnika za savjet.

Uobičajena doza za djecu u dobi između 2 i 10 godina je 1 doza spreja u svaku nosnicu prema potrebi, ali **najviše** 3 puta dnevno.

Način primjene

- Skinite zaštitnu kapicu.



- Prije prve primjene ili nakon prekida liječenja duljeg od 15 dana - nekoliko puta pritisnite potisnik spreja sve dok ne dobijete jednolično raspršenu maglicu. Sprej je sada spremан za daljnju uporabu.
- Držite bočicu uspravno. Stavite vrh raspršivača u nosnicu i jednom pritisnite potisnik spreja. U trenutku raspršivanja lagano udahnite kroz nos.
- Nakon primjene, čistom papirnatom maramicom pažljivo obrišite vrh raspršivača i ponovo stavite zaštitnu kapicu.

Preporuča se da prije primjene lijeka temeljito ispušete nos.

Poželjno je da zadnju dnevnu dozu lijeka primijenite uvečer prije spavanja.

Iz higijenskih razloga i kako bi se izbjegle infekcije, istu boćicu spreja smije upotrebljavati samo jedna osoba.

Trajanje primjene

MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu ne smijete primjenjivati dulje od 7 dana, osim ako to nije odredio Vaš liječnik.

Prije ponovne primjene lijeka nužan je razmak od nekoliko dana.

U bolesnika s kroničnom upalom sluznice nosa lijek se smije primjenjivati samo pod liječničkim nadzorom zbog rizika od atrofije (istrošenosti) nosne sluznice.

Ako smatrate da MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina djeluje preslabo ili prejako, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako uzmete više MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopine nego što ste trebali

U slučaju predoziranja djece ili odraslih morate se odmah javiti liječniku jer je potreban nadzor i liječenje u bolnici.

Mogu se javiti sljedeći simptomi predoziranja:

- proširene ili sužene očne zjenice,
- mučnina i povraćanje,
- bljedilo, plavo obojena koža i usne,
- povišena tjelesna temperatura, znojenje ili pad tjelesne temperature,
- problemi sa srčanom cirkulacijom, poput presporog, prebrzog ili nepravilnog rada srca, porasta ili pada krvnog tlaka,
- prestanak disanja (apneja),
- letargija, omamlijenost i koma,
- tjeskoba, uzbuđenost, halucinacije, grčevi mišića i napadaji (konvulzije).

Nakon predoziranja, a posebno u djece, često mogu uslijediti konvulzije i koma, usporen rad srca, prestanak disanja (apneja) i porast krvnog tlaka, nakon kojega može doći do pada krvnog tlaka.

Ako ste zaboravili uzeti MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos

Ako ste propustili dozu, uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme i nastavite uzimati lijek. Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadjili onu koju ste zaboravili.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom MaxiRino 0,5 mg/ml spreja za nos, otopine obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina može izazvati nuspojave iako se neće javiti u svakoga.

Moguće su sljedeće nuspojave:

Česte (javljaju se u manje od jedne na 10, no u više od jedne na 100 osoba):

- blaži simptomi privremene nadraženosti poput osjećaja probadanja ili suhoće sluznice nosa i/ili grla
- kihanje

Manje česte (javljaju se u manje od jedne na 100, no u više od jedne na 1 000 osoba):

- reakcije preosjetljivosti (kožni osip, svrbež, oticanje kože i sluznica)
- pojačani osjećaj začepljenosti nosa (nakon smirivanja početnih simptoma)
- krvarenje iz nosa

Rijetke (javljaju se u manje od jedne na 1 000, no u više od jedne na 10 000 osoba):

- osjećaj lutanja srca (palpitacije)
- ubrzani rad srca
- povišeni krvni tlak
- mučnina

Vrlo rijetke (javljaju se u manje od jedne na 10 000 osoba)

- nervoza (nemir)
- nesanica
- pospanost/omamlijenost (uglavnom u djece)
- glavobolja

- omaglica
- halucinacije (uglavnom u djece)
- grčevi mišića, napadaji (konvulzije; uglavnom u djece)
- nepravilan rad srca
- iznenadni prestanak disanja (apneja) u djece i novorođenčadi

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI MAXIRINO 0,5 mg/ml SPREJ ZA NOS, OTOPINU

MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Nakon prvog otvaranja boćice lijek se mora upotrijebiti u roku od godine dana.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina sadrži

- Djelatna tvar je ksilometozolinklorid. Jedan ml spreja za nos, otopine sadrži 0,5 mg ksilometazolinklorida. Jedna doza spreja (0,09 ml spreja za nos, otopine) sadrži 0,045 mg ksilometazolinklorida.
- Pomoćne tvari: citratna kiselina hidrat; natrijev citrat; glicerol, 85 postotni; voda za injekcije.

Kako MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina izgleda i sadržaj pakovanja

MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina je bistra, gotovo bezbojna otopina.

MaxiRino 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina dostupan je u pakovanju od 10 ml otopine (najmanje 90 doza spreja) u staklenoj boćici, zatvorenoj odmjernim (0,09 ml) sustavom za raspršivanje, nastavkom za nos i zaštitnom kapicom, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:



PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka:



PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni.

Datum revizije upute

/-