

UPUTA O LIJEKU

Caffetin COLDmax 1000 mg + 12,2 mg prašak za oralnu otopinu paracetamol/fenilefrin

Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu budući da sadrži važne informacije za Vas.

Lijek je dostupan bez recepta. Međutim, Caffetin COLDmax trebate uzimati pažljivo kako biste postigli najbolje rezultate.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete željeti ponovno je pročitati.
- Ukoliko trebate dodatnih informacija ili savjeta, molimo obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ako se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 5 dana, morate se obratiti liječniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1. Što je Caffetin COLDmax i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Caffetin COLDmax
3. Kako uzimati Caffetin COLDmax
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Caffetin COLDmax
6. Dodatne informacije

1. ŠTO JE CAFFETIN COLDMAX I ZA ŠTO SE KORISTI

Caffetin COLDmax je kombinirani lijek, sadržava dvije djelatne tvari: paracetamol i fenilefrin. Paracetamol je poznat analgetik (lijek protiv bolova, uključujući glavobolje), a također djeluje i kao antipiretik (lijek za snižavanje povišene tjelesne temperature). Fenilefrin smanjuje začepljenost nosa čime olakšava prohodnost nosne šupljine i na taj način olakšava disanje.

Caffetin COLDmax se koristi za ublažavanje uobičajenih simptoma prehlade i gripe (glavobolja, bol u mišićima, grlobolja, začepljenost nosa, povišena tjelesna temperatura, groznica).

2. PRIJE NEGO ZAPOČNETE UZIMATI CAFFETIN COLDMAX

Nemojte uzimati Caffetin COLDmax

- ako ste ikada imali reakciju preosjetljivosti (otežano disanje, oticanje lica i usta, osip kože, curenje nosa) na ovaj lijek ili bilo koji od sastojaka ovog lijeka;
- ako ste ikada imali tešku hipertenziju (povišeni krvni tlak), koronarnu arterijsku bolest (bolest arterija srca) ili tešku bolest srca;
- ako imate prekomjernu aktivnost štitnjače;
- ako uzimate ili ste u protekla dva tjedna uzimali lijekove koji se zovu MAO inhibitori (za liječenje depresije);
- ako ste trudni ili dojite.

Tijekom primjene Caffetin COLDmaxa **ne smijete uzimati** drugi lijek koji sadržava paracetamol zbog opasnosti od predoziranja.

Budite oprezni s Caffetin COLDmaxom

- ako imate blagu do umjerenu hipertenziju (povišeni krvni tlak) ili bolest srca;

- ako imate šećernu bolest, stanje povezano uz povišene razine šećera u krvi;
- ako imate pretjerano aktivnu štitnjaču (hipertiroidizam);
- ako imate povišeni očni tlak (glaukom);
- ako imate povećanu prostatu;
- ako imate bolest jetre ili bubrega;
- ako imate Raynaudovu bolest, stanje uzrokovano lošom cirkulacijom prstiju na rukama i nogama.

Ne uzimajte ovaj lijek dulje od 5 dana uzastopno. Ukoliko ne dođe do poboljšanja simptoma ili se simptomi pogoršaju, potražite savjet liječnika.

Caffetin COLDmax se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina.

Uzimanje drugih lijekova s Caffetin COLDmaxom

Obavijestite svog liječnika o lijekovima koje ste nedavno uzimali, koje uzimate ili ih namjeravate uzimati, uključujući i one koje nabavljate bez recepta.

Istodobna primjena Caffetin COLDmaxa s nekim lijekovima može dovesti do interakcija. To se može dogoditi kada uzimate:

- ostale lijekove koji sadržavaju paracetamol;
- kolestiramin (za regulaciju kolesterola u krvi);
- određeni lijekovi protiv mučnine i povraćanja (metoklopramid i domperidon);
- tablete za razrjeđivanje krvi, kao što je varfarin i ostali kumarini (paracetamol može pojačati djelovanje lijekova protiv zgrušavanja krvi);
- digoksin i ostali glikozidi digitalisa (lijekove za liječenje određenih bolesti srca);
- beta-blokatore (lijekove za liječenje povišenog krvnog tlaka) ili vazodilatatore lijekove koji se također koriste za liječenje povišenog krvnog tlaka kao i za liječenje bolova u nogama zbog bolesti perifernih krvnih žila – Raynaudova bolest);
- određenu vrstu lijekova za liječenje depresije (tricikličke antidepressive), druge dekongestive ili barbiturate (koriste se u liječenju epilepsije ili ako imate problema sa spavanjem).

Uzimanje hrane i pića s Caffetin COLDmaxom

Za vrijeme uzimanja Caffetin COLDmaxa ne bi se smjela uzimati pića koja sadržavaju alkohol (npr. vino, pivo). Kada se uzima s alkoholom ovaj lijek može uzrokovati oštećenje jetre.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog liječnika za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka!

Caffetin COLDmax se ne smije koristiti za vrijeme trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Do sada nije bilo prijava o negativnom utjecaju Caffetin COLDmaxa na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Važne informacije vezane uz učinak nekih pomoćnih tvari

Svaka vrećica Caffetin COLDmaxa sadržava približno 2,6 g saharoze. To je potrebno uzeti u obzir u bolesnika sa šećernom bolesti. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Svaka vrećica Caffetin COLDmaxa sadržava i sorbitol (iz arome limun - mentol). Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Svaka vrećica Caffetin COLDmaxa sadržava izvor fenilalanina (aspartam). Može biti štetan u osoba s fenilketonurijom.

Svaka vrećica Caffetin COLDmaxa sadrži 141,15 mg natrija. O tome treba voditi računa u bolesnika s ograničenjem unosa natrija.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Caffetin COLDmaxa obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

3. KAKO UZIMATI CAFFETIN COLDMAX

Uvijek uzimajte Caffetin COLDmax točno kako Vam je propisao Vaš liječnik ili prema uputama koje su navedene u uputi o lijeku. Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Odrasli i djeca starija od 12 godina:

Jedna vrećica je jedna doza.

Sadržaj jedne vrećice potrebno je otopiti u šalici tople vode uz miješanje.

Doza se može ponovno primijeniti nakon 4-6 sati.

Ne smiju se primijeniti više od 4 vrećice kroz 24 sata.

Ne smije se primjenjivati u djece mlađe od 12 godina bez liječničkog savjeta.

Nije potrebna prilagodba doze u starijih bolesnika.

Priprema otopine

Otopite sadržaj vrećice u šalici (250 ml) vruće vode, koja nije kipuća. Ukoliko je potrebno zasladite prema želji i popijte.

Pripremljena otopina je bezbojna, neznatno opalescentna, bez čestica ili taloga, s mirisom limuna i mentola.

Nemojte davati Caffetin COLD max djeci mlađoj od 12 godina.

Ako ste uzeli više Caffetin COLDmaxa nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli više od preporučene doze potražite odmah savjet liječnika ili ljekarnika, čak i ako se dobro osjećate, zbog rizika ozbiljnog odgođenog oštećenja jetre.

Ako ste zaboravili uzeti Caffetin COLDmax

Ovaj se lijek može uzimati po potrebi, ovisno o simptomima. Ne uzimajte odjednom dvije vrećice kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Caffetina COLDmaxa obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi Caffetin COLDmax može uzrokovati nuspojave.

Moguće nuspojave su:

- Alergijske reakcije (kao što su kožni osipi);
- Poremećaji krvi, kao što su trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica zbog čega se može javiti pojačana sklonost krvarenju ili pojavljivanju modrica), pancitopenija (smanjenje broja svih krvnih stanica), leukopenija (smanjenje broja bijelih krvnih stanica), agranulocitoza ili neutropenija (smanjenje broja određenih vrsta bijelih krvnih stanica);
- Povišeni krvni tlak, praćen glavoboljom;

- Povraćanje;
- Palpitacije (osjećaj lupanja srca);
- Akutna upala gušterače (nakon uzimanja doza većih od preporučenih);
- Poteškoće prilikom mokrenja (samo u muškaraca).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika!

5. ČUVANJE CAFFETIN COLDMAXA

Caffetin COLDmax morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Caffetin COLDmax morate čuvati u originalnom pakovanju.

Caffetin COLDmax se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte svoga ljekarnika kako ukloniti lijekove koji Vam više ne trebaju. Ove će mjere pomoći u zaštiti okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što Caffetin COLDmax sadrži

- Djelatne tvari su: paracetamol i fenilefrinklorid.
Jedna vrećica sadržava 1000 mg paracetamola i 12,2 mg fenilefrinklorida (što odgovara 10 mg fenilefrina).
- Pomoćne tvar su: saharoza; askorbatna kiselina; bezvodna citratna kiselina; natrijev citrat; aspartam (E951); saharinnatrij; bezvodni koloidni silicijev dioksidi; aroma limun - mentol (sadrži sorbitol (E420)).

Kako Caffetin COLDmax izgleda i sadržaj pakovanja

Svaka Caffetin COLDmax vrećica sadržava bijeli sipki prašak, bez čestica i velikih agregata, s mirisom limuna i mentola.

Kartonska kutija sadržava 10 vrećica i uputu o lijeku.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Alkaloid d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226 F

Zagreb, Hrvatska

tel. +385 1 63 11 920

fax. +385 1 63 11 922

e-mail: alkaloid@alkaloid.hr

Proizvođač odgovoran za puštanje serije lijeka u promet

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

tel.: 386 1 300 42 90

fax: 386 1 300 42 91

email: info@alkaloid.si

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni.

Datum revizije upute:

Prosinac 2015.