

UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA

Daleron 500 mg tablete paracetamol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke.

Ovaj lijek dostupan je bez liječničkog recepta. Ipak, morate ga uzimati oprezno kako biste postigli najbolji učinak.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Obavezno kontaktirajte liječnika ako se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 5 dana.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1. Što je Daleron i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Daleron
3. Kako uzimati Daleron
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Daleron
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. ŠTO JE DALERON I ZA ŠTO SE KORISTI

Daleron tablete sadrže paracetamol koji koči sintezu prostaglandina u središnjem živčanom sustavu te tako snižava povišenu tjelesnu temperaturu i ublažava bol. Njegovo je analgetsko i antipiretsko djelovanje u usporedbi s acetilsalicilnom kiselinom jednako, a protuupalno (antiflogističko) slabije. Paracetamol ne podražuje želučanu sluznicu, te je stoga primjeren i za bolesnike sa želučanim tegobama i vrijedom ili ulkusom na dvanaesniku. Pogodan je i za bolesnike koji su preosjetljivi na acetilsalicilnu kiselinu.

Daleron tablete su primjerene:

- za olakšavanje blage do umjerene boli (glavobolja, zubobolja, bolovi kod menstruacije, mišićni i reumatski bolovi);
- za ublažavanje boli nakon ozljeda, liječničkih i stomatoloških zahvata;
- za ublažavanje boli u mišićima i zglobovima pri prehladi i gripi;
- za snižavanje povišene tjelesne temperature koja prati različite bakterijske i virusne infekcije.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI DALERON

Nemojte uzimati Daleron

- ako ste alergični (preosjetljivi) na paracetamol ili bilo koji drugi sastojak lijeka Daleron.
- ako imate teže smetnje u radu bubrega i jetara.

Budite posebno oprezni s Daleronom

Daleron tablete ne smijete uzimati istodobno s drugim lijekovima koji sadrže paracetamol.

Osobe s blagim do umjereno smanjenim radom bubrega i jetre smiju uzimati Daleron tablete samo pod liječničkim nadzorom.

Preporučene doze ne smijete prekoračiti.

Uzimate li paracetamol, ne smijete piti alkohol.

Daleron tablete nemojte uzimati dulje vrijeme (više od 5 dana) bez savjetovanja s liječnikom. Ukoliko se stanje ne poboljša ili se čak pogorša, posavjetujte se s liječnikom.

Opres pri primjeni je potreban u oslabjelih i iscrpljenih osoba te u alkoholičara.

Lijek nije primjeren za djecu mlađu od 6 godina budući da sadržava prevelike doze paracetamola.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Upozorite liječnika ako uzimate lijekove koji sadržavaju metoklopramid, domperidon, kolestiramin ili varfarin.

Daleron tablete nemojte uzimati istodobno s barbituratima, antiepilepticima, rifampicinom i kloramfenikolom.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Neškodljivost primjene paracetamola tijekom trudnoće i dojenja nije pouzdano potvrđena. Trudnice i dojilje mogu lijek uzeti samo nakon prethodnog savjetovanja s liječnikom i što kraće vrijeme, po mogućnosti samo pojedinačne doze.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da bi lijek utjecao na sposobnosti za upravljanje vozilima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Dalerona

Daleron sadrži formaldehid koji može uzrokovati želučane tegobe i proljev.

3. KAKO UZIMATI DALERON

Uvijek uzmite Daleron točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i djeca starija od 12 godina uzimaju 1 do 2 tablete najviše 4 puta na dan. Razmak između pojedinih doza mora biti barem 4 sata. U 24 sata smijete uzeti najviše 8 tableta.

Primjena u djece

Djeca u dobi od 6 do 12 godina uzimaju ½ tablete do 1 tabletu najviše 4 puta na dan s razmacima od najmanje 4 sata. Najveća dnevna doza je 4 tablete.

Ako uzmete više Dalerona nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli preveliku količinu lijeka odmah se posavjetujte s liječnikom i onda ako se osjećate dobro; naime, znakovi otrovanja mogu se pojaviti tek kroz nekoliko dana.

Prevelike doze paracetamola mogu, osobito u bolesnika s bolestima bubrega i jetre, uzrokovati mučninu, povraćanje i teško oštećenje funkcije jetre.

Ako ste zaboravili uzeti Daleron

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Uzmite Daleron tablete protiv bolova i vrućice samo kada je to potrebno.

Ako prestanete uzimati Daleron

Kada Vam više nije potreban, lijek možete prestati uzimati bez posljedica.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, lijek Daleron može uzrokovati nuspojave.

Nuspojave se mogu javiti određenom učestalošću, što je definirano u nastavku:

Vrlo česte	pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika
Česte	pojavljuju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika

Manje česte	pojavljaju se kod 1 do 10 na 1000 bolesnika
Rijetke	pojavljaju se kod 1 do 10 na 10000 bolesnika
Vrlo rijetke	pojavljaju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika
Nije poznato	učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Vrlo rijetke

- smanjen broj trombocita (trombocitopenija), smanjen broj bijelih krvnih stanica (leukopenija)
- povraćanje, proljev
- žutica, upala gušterače i povećana aktivnost jetrenih enzima

Rijetke

- kožne reakcije preosjetljivosti (osip, koprivnjača, svrbež)
- umor
- mučnina

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI DALERON

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Daleron se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Daleron sadrži

- Djelatna tvar je paracetamol. Svaka tableta sadrži 500 mg paracetamola.
- Pomoćne tvari su: kukuruzni škrob; povidon; talk (E553b); silicijev dioksid, koloidni, bezvodni (E551); magnezijev stearat (E572); formaldehid kazein i kalijev sorbat (E202).

Kako Daleron izgleda i sadržaj pakiranja

Tablete su bijele, okrugle, blago bikonveksne s razdjelnom crtom na jednoj strani.

Tableta se može razdijeliti na jednake polovice.

Daleron je dostupan u blisterima po 6 tableta, a svaka kutija sadrži 12 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Uputa je zadnji puta odobrena u listopadu 2013.