

Uputa o lijeku

CEFUROKSIM JGL 250 mg filmom obložene tablete CEFUROKSIM JGL 500 mg filmom obložene tablete *cefuroksimaksetil*

Molimo vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete koristiti lijek.

- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.
- Ako imate dodatna pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj lijek propisan je vama osobno i nemojte ga davati drugim osobama. Može im naškoditi čak i ako su njihovi simptomi isti kao vaši.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika, uključujući i nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi.

Uputa sadrži:

1. Što su Cefuroksim JGL filmom obložene tablete i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Cefuroksim JGL filmom obložene tablete
3. Kako uzimati Cefuroksim JGL filmom obložene tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Cefuroksim JGL filmom obložene tablete
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Cefuroksim JGL filmom obložene tablete i za što se koriste

Cefuroksim JGL filmom obložene tablete sadrže djelatnu tvar cefuroksim, koji je antibiotik iz skupine cefalosporina. Koristi se u djece i odraslih.

Cefuroksim JGL se koristi za liječenje infekcija:

- glava
- sinusa
- srednjeg uha
- donjeg dišnog sustava (bronhitis)
- mokraćnog sustava
- kože i mekih tkiva

Također, Cefuroksim JGL se koristi i za liječenje ranog stadija lajmske bolesti (infekcije uzrokovane krpeljima).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Cefuroksim JGL filmom obložene tablete

Nemojte uzimati Cefuroksim JGL filmom obložene tablete

- ako ste alergični (preosjetljivi) na cefuroksim, na druge cefalosporine ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (vidjeti dio 6.)
- ako ste ikada imali ozbiljnu alergijsku reakciju (reakciju preosjetljivosti) na bilo koji beta-laktamski antibiotik (penicilini, monobaktami, karbapenemi)

Ako se bilo što od navedenog odnosi na vas, savjetujte se s liječnikom prije primjene Cefuroksim JGL filmom obloženih tableteta.

Budite oprezni s Cefuroksim JGL filmom obloženim tabletama

Ne preporučuje se primjena lijeka kod djece mlađe od 3 mjeseca, s obzirom da sigurnost i učinkovitost za navedenu dobnu skupinu nisu poznati.

Tijekom uzimanja lijeka potrebno je pratiti simptome kao što su alergijske reakcije, gljivične infekcije (primjerice kandida) i ozbiljan proljev (pseudomembranozni kolitis). Time će se smanjiti rizik od značajnijih problema.

Budite posebno oprezni:

- ako ste ranije imali tešku alergijsku reakciju (reakciju preosjetljivosti) na penicilin ili neki drugi antibiotik
- ako ste alergični (preosjetljivi) na penicilin ili neki drugi antibiotik
- ako ste dobili proljev tijekom korištenja ovog lijeka
- ako trebate testirati razinu šećera u urinu
- ako ste trudni ili pokušavate zatrudnjeti
- ako dojite
- ako ste dobili visoku temperaturu tijekom korištenja ovog lijeka (kod liječenja lajmske bolesti).

Pretrage

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja lijeka:

- ako trebate napraviti pretrage za određivanje šećera u krvi; Cefuroksim JGL može uzrokovati lažno pozitivan Coombsov test.

Uzimanje drugih lijekova s Cefuroksim JGL filmom obloženim tabletama

Neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Cefuroksim JGL filmom obloženih tableta i obrnuto.

Recite svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove. Ovo se odnosi i na one koje ste kupili bez recepta, kao i biljne ljekovite pripravke.

Interakcije s drugim lijekovima malo su vjerojatne, ali obavijestite liječnika ako uzimate:

- lijekove koji smanjuju kiselost u želucu, jer mogu smanjiti učinak Cefuroksim JGL-a.
- oralne kontraceptive, jer Cefuroksim JGL može smanjiti njihov učinak. Tijekom primjene Cefuroksim JGL filmom obloženih tableta, trebali biste koristiti dodatnu kontracepciju.
- probenecid (lijek za liječenje gihta), jer primijenjen zajedno s Cefuroksim JGL-om može izazvati povišene razine cefuroksima u krvi.
- oralne antikoagulanse (lijekove za sprječavanje zgrušavanja krvi).

Uzimanje hrane i pića s Cefuroksim JGL filmom obloženim tabletama

Cefuroksim JGL filmom obložene tablete preporučuje se uzeti nakon obroka. Tablete se ne smiju žvakati, mrviti ili lomiti jer se na taj način smanjuje njihova učinkovitost.

Trudnoća i dojenje

Tijekom trudnoće ne preporuča se uzimati Cefuroksim JGL filmom obložene tablete, osim u slučaju da liječnik procijeni da je neophodno. Cefuroksim se izlučuje u majčino mlijeko, pa

ukoliko dojite, ne preporuča se uzimati Cefuroksim JGL filmom obložene tablete, osim ako liječnik procijeni da je neophodno.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Za vrijeme uzimanja Cefuroksim JGL filmom obloženih tableta, možete osjetiti vrtoglavicu. Ukoliko se to dogodi, nemojte upravljati vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati Cefuroksim JGL filmom obložene tablete

Slijedite navedene upute, osim ako vam liječnik nije dao druge upute.

Ne zaboravite uzeti lijek. Liječnik će vas uputiti kako i koliko dugo trebate uzimati Cefuroksim JGL filmom obložene tablete. Nemojte prekinuti liječenje prije vremena.

Odrasli i djeca tjelesne težine veće od 40 kg

Cefuroksim JGL filmom obložene tablete potrebno je progutati cijele, s malo tekućine. Tablete se ne smiju lomiti. Tablete uzmite nakon obroka. Uobičajeno trajanje liječenja je 7 dana.

Infekcije grla i sinusa	250 mg dva puta na dan
Upala srednjeg uha	500 mg dva puta na dan
Infekcije donjeg dišnog sustava (bronhitis)	500 mg dva puta na dan
Infekcije mokraćnih puteva	250 mg dva puta na dan
Infekcije kože i mekih tkiva	250 mg dva puta na dan
Rana faza lajmske bolesti	500 mg dva puta na dan tijekom 14 dana

Djeca

Uobičajena doza za djecu je 10-15 mg/kg tjelesne težine dva puta na dan, ovisno o ozbiljnosti i vrsti infekcije.

Stariji bolesnici

Primjenjuje se doza kao i za odrasle, osim u slučaju poremećaja funkcije bubrega, kada je potrebna prilagodba doze.

Bolesnici s poremećajem funkcije bubrega

Ukoliko imate problema s bubrežima, liječnik će vam možda smanjiti dozu lijeka.

Ako uzmete više Cefuroksim JGL filmom obloženih tableta nego što ste trebali

U slučaju predoziranja, može doći do konvulzija (grčeva). Uzmete li više Cefuroksim JGL filmom obloženih tableta nego što vam je preporučio liječnik, odmah se javite svom liječniku. Tablete ponesite sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Cefuroksim JGL filmom obložene tablete

Ako ste zaboravili uzeti dozu Cefuroksim JGL filmom obloženih tableta, uzmite propuštenu dozu čim prije i nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu!

Ako prestanete uzimati Cefuroksim JGL filmom obložene tablete

Nemojte prekidati liječenje ako imate osjećaj da vam je bolje, jer lijek još možda nije uništio sve bakterije i stanje vam se može pogoršati.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Cefuroksim JGL filmom obloženih tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi ostali lijekovi i Cefuroksim JGL filmom obložene tablete mogu izazvati nuspojave, iako ih ne dobiju svi.

Ukoliko se neka od sljedećih nuspojava dogodi, prestanite uzimati Cefuroksim JGL filmom obložene tablete i javite se svom liječniku ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu jer možete trebati hitnu liječničku pomoć:

- alergijska reakcija (oticanje lica, jezika i grkljana, stezanje u prsim, kožni osip). Ta reakcija vrlo je rijetka, a može biti opasna. Ukoliko se pojavi, odmah se obratite liječniku.
- kožni osip s pojavom mjeđura i/ili ljuštenja kože
- gljivične infekcije (kandida)
- obilni proljev sa pojavom krvi i sluzi, jaki bolovi u trbuhi, vrućica.
- visoka temperatura, zimica, glavobolja, bolovi u mišićima i kožni osip (znakovi Jarish-Herxheimerove reakcije)

Ostale moguće nuspojave

Česte (pojavljuju se u 1 na 10 bolesnika)

- gljivična infekcija (kandidijaza)
- povećan broj bijelih krvnih stanica (eozinofilija)
- glavobolja, omaglica
- mučnina, proljev, bol u trbuhi
- prolazno povećanje vrijednosti jetrenih enzima u krvi

Manje česte (pojavljuju se u 1 na 100 bolesnika)

- pozitivan Coombsov test (kod pretraga krvi), smanjen broj bijelih krvnih stanica i krvnih pločica
- povraćanje
- kožni osip

Nuspojave nepoznate učestalosti

- težak proljev
- alergijske reakcije
- vrućica
- hemolitička anemija
- žutica, upalna bolest jetre (hepatitis)
- koprivnjača, svrbež, teške kožne reakcije (multiformni eritem, Steven-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza), angioneurotski edem (otok kože ili sluznice).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Cefuroksim JGL filmom obložene tablete

Cefuroksim JGL filmom obložene tablete morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cefuroksim JGL filmom obložene tablete sadrže

1 filmom obložena tableta sadrži 250 mg, odnosno 500 mg cefuroksima u obliku cefuroksimaksetila.

Pomoćne tvari: celuloza, mikrokristalična; škrob, prethodno geliran; karmelozanatrij, umrežena; natrijev laurilsulfat; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; hidrogenizirano biljno ulje (tip I).

Ovojnica: Opadry Blue (hipromeloza 6cP (E464), titanijev dioksid (E171), propilenglikol (E1520), Brilliant Blue FCF Aluminum Lake (E133), Indigo Carmine Aluminum Lake (E132)).

Kako Cefuroksim JGL filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

CEFUROKSIM JGL 250 mg filmom obložene tablete

Svjetloplave filmom obložene tablete u obliku kapsule, s oznakom "250" s jedne strane, te "P125" s druge strane. 10 (1x10) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

CEFUROKSIM JGL 500 mg filmom obložene tablete

Svjetloplave filmom obložene tablete u obliku kapsule, s oznakom "500" s jedne strane, te "P126" s druge strane. 10 (1x10) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Naziv i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Naziv i adresa proizvođača lijeka

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Datum revizije upute

Veljača, 2015.