

UPUTA O LIJEKU

Fungilac 50 mg/ml ljekoviti lak za nokte Amorolfin

Molimo vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete koristiti ovaj lijek.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju ponovno trebati pročitati.
- Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj lijek propisan je vama osobno i nemojte ga davati drugim osobama. Može im naškoditi čak i ako su njihovi simptomi isti kao vaši.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ova uputa sadrži:

1. Što je Fungilac i za što se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Fungilac
3. Kako koristiti Fungilac
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Fungilac
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Fungilac i za što se koristi

Fungilac je ljekoviti lak za nokte koji se primjenjuje za liječenje gljivičnih infekcija noktiju. Sadrži djelatnu tvar amorolfin (u obliku amorolfinklorida), koji pripada skupini lijekova pod nazivom antimikotici. Amorolfin uništava široki spektar gljivica koje uzrokuju infekcije nokta.

2. Prije nego počnete koristiti Fungilac

Nemojte uzimati Fungilac:

- ako ste alergični (preosjetljivi) na amorolfin ili bilo koji drugi sastojak lijeka
- ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite

Budite oprezni s primjenom Fungilaca

Izbjegavajte kontakt laka s očima, ušima i sluznicama. Nemojte udisati lijek.

Uzimanje drugih lijekova s Fungilacom

Nema dostupnih podataka koji uključuju istodobno liječenje s drugim lokalno primjenjenim lijekovima.

Za vrijeme liječenja, treba izbjegavati lakiranje noktiju ili korištenje umjetnih noktiju.

Trudnoća i dojenje

Odmah obavijestite svoga liječnika ako ste trudni ili sumnjate na trudnoću.

Fungilac treba izbjegavati tijekom trudnoće i dojenja.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima
Fungilac lak za nokte nema utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3. Kako koristiti Fungilac

Slijedite navedene upute, osim ako vam liječnik nije dao druge upute.
Ne smijete sami mijenjati doziranje ili prekinuti liječenje bez savjetovanja s liječnikom.

Lak za nokte trebete nanijeti na zahvaćeni nokat jednom tjedno.
U nekim slučajevima nanošenje dva puta na tjedan može biti korisno.

Primijenite lak za nokte na sljedeći način:

1. Prije prve primjene Fungilaca, neophodno je zahvaćeno područje nokta (osobito površinu nokta) koliko god je moguće izrašpati. Površinu nokta treba potom očistiti i odmastiti pomoću komadića vate natopljenog alkoholom.
Prije ponovne aplikacije lijeka, ako je potrebno, zahvaćeni nokat treba ponovno izrašpati te nakon toga očistiti s vatom za čišćenje da bi odstranili preostali lak.

Oprez:

Rašpica za nokte koja se koristi na zahvaćenim noktima ne smije se primjenjivati na zdravim noktima.

2. S aplikatorom za višekratno nanošenje, Fungilac se primjenjuje na cijelu površinu zahvaćenog nokta i ostavi se da se osuši. Nakon korištenja, treba očistiti aplikator s vatom natopljenom alkoholom. Bočica treba biti čvrsto zatvorena.

Prije svakog nanošenja lijeka na nokat, aplikator treba uroniti duboko u bočicu, bez odstranjivanja laka naslanjajući aplikator na vrat bočice.

Oprez: Ukoliko koristite razrjeđivač ili druga organska otapala, trebete nositi nepropusne rukavice u svrhu zaštite laka nanešenog na noktima.

Liječenje treba provoditi bez prekidanja do regeneracije nokta, odnosno izlječenja zahvaćenog područja. Potrebna učestalost i duljina liječenja bitno ovise o intenzitetu i lokalizaciji infekcije. Obično liječenje traje šest mjeseci za nokte na rukama i devet do dvanaest mjeseci za nokte na nogama. Procjena liječenja se preporučuje u intervalu od približno tri mjeseca.

Ukoliko imate istodobno bolest koja se zove tinea pedis trebete koristiti i odgovarajuću kremu protiv gljivica.

Starije osobe

Nema specifičnih preporuka o doziranju u odraslih bolesnika.

Djeca

Nema specifičnih preporuka o doziranju za djecu zbog manjka kliničkog iskustva.

Ako Fungilac dođe u kontakt s vašim očima ili ušima

Ukoliko Fungilac dođe u kontakt s vašim očima ili ušima, odmah isperite vodom te odmah obavijestite svog liječnika ili ljekarnika, ili posjetite najbližu zdravstvenu ustanovu.

Ako progutate Fungilac

Ukoliko slučajno progutate Fungilac, odmah obavijestite svog liječnika ili ljekarnika, ili posjetite najbližu zdravstvenu ustanovu.

Ako propustite koristiti Fungilac

Ne uzimajte dvostruku dozu ukoliko ste zaboravili uzeti prijašnju dozu.

Ako ste zaboravili nanijeti lak u običajeno vrijeme, nanosite ga odmah čim se sjetite i slijedite uobičajeni režim doziranja.

Ako prestanete koristiti Fungilac

Ne preporučuje se prestanak korištenja laka prije nego se posavjetujete sa svojim liječnikom jer vam se infekcija može opet javiti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom kada prestati koristiti Fungilac.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi ostali lijekovi, i Fungilac može izazvati nuspojave.

Nuspojave su rijetke.

Rijetke nuspojave (javljaju se u 1 do 10 na 10 000 bolesnika)

- poremećaj nokta
- poremećaj boje nokta
- puknuti nokat
- lomljiv nokat

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika)

- osjećaj peckanja kože

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka)

- alergijska reakcija kože (kontaktni dermatitis)

O svakoj nuspojavi potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Fungilac

Fungilac morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Rok valjanosti otisnut je na pakiranju.

Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti.

Nema posebnih uvjeta čuvanja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Fungilac sadrži

1 ml otopine sadrži 50 mg amorolfina u obliku amorolfinklorida.

Pomoćne tvari: etanol, bezvodni; amonio-metakrilat kopolimer, vrst A; etilacetat; butilacetat; triacetin.

Sadržaj pakiranja

2,5 ml otopine u smeđoj staklenoj bočici s plastičnim poklopcem, 1 bočica u kutiji. U kutiji se dodatno nalazi 10 plastičnih špatula uloženi u zajednički spremnik.

Ime i adresa proizvođača lijeka i nositelja odobrenja

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Datum revizije upute

Siječanj 2014.